

ФИЗИОЛОГІЯ

и  и

НАУКА

О ЕСТЕСТВѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОМЪ,

Сочиненная на Латинскомъ языкѣ
съ пріобщеніемъ четырехъ Картинъ
Врачебныя Науки Профессоромъ,
общества Королевскаго Геш-
тингскихъ знаній и дру-
гихъ членомъ,

Д. Ивановъ Фридрихомъ Блуменбахомъ;

А на Россійской языкѣ переведена

М. Д. и П.

По жю Борсучомъ Мойсеевичемъ.

МОСКВА, 1896.

Въ Университетской Типографіи
у Ридигера и Клаудія.

О Д О Б Р Е Н І Е.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовъ, я читалъ еію книгу, подъ заглавіемъ: **Физіологія или Наука о Естествѣ Человѣческомъ**, и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ; по тому она и напечатана быть можетъ. —
Логики и Метафизики Профессоръ и печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ Ценсоръ,

Андрей Брянцевъ.



254034-44



ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ОБЕРЪ-КАМЕРГЕРУ
ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМУ ТАЙНОМУ
СОВѢТНИКУ,
ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
КУРАТОРУ,

*Орденѣ св. Апостола Андрея, св. Алек-
сандра Невскаго, св. Равноапостоль-
наго Князя Владимира Іѣ сте-
пени, Польскаго бѣлаго орла и св.
Анны Кавалеру,*

ИВАНУ ИВАНОВИЧУ
ШУВАЛОВУ

ВЪ ЗНАКЪ

безпредѣльной благодарности и совер-
шеннѣйшаго Высокопочитанія.

Вселокорнѣйшее приношеніе

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Физіологія или Наука о Естествѣ Человѣческомъ составляетъ то неколебимое основаніе, на которомъ утверждено все Врачебное Знаніе.

Галенъ говоритъ, „что пошъ шокмо можешъ поспигашь вели-
„костъ болѣзни, кто больше объ-
„ялъ здоровое состояніе шѣла,
„въ изслѣдываніи коего вся Наука
о Естествѣ Человѣческомъ заклю-
чается.

По сему несомнѣнная истинна,
что таковыя творенія для по-
знанія природы Человѣческой со-
вершенно необходимы. Вѣдая сіе
и зная подлинно, что тако-
выхъ сочиненій на Россійскомъ
языкѣ не много имѣется, упраж-
няющихся же во Врачебномъ Ис-
кусствѣ юношей великое множе-
(ство

ство находяшся, принялъ я на
мѣреніе, съ Лашинскаго на Россій-
скій языкъ переложишь сіи изыс-
нѣйшія о Естествѣ Человѣче-
скомъ наставленія Г. Блаумен-
баха, уповаю, что онѣ будутъ
приносишь плодъ въ врачебномъ
кругѣ, какъ по тому, что онѣ
сообразно умозрѣнію нынѣшняго
времени написаны, и многими
новыми примѣчаніями украше-
ны, такъ и по тому, что онѣ по
опредѣленію Государственной Ме-
дицинской Коллегіи избраны для
преподаванія по нимъ чтеній въ
Медикохирургическихъ школахъ.
Великое получу я награжденіе за
труды свои, когда достигну
той цѣли, для которой я пере-
велъ сіе, справедливосшь и вни-
маніе заслуживающее, сочиненіе.

ПОКАЗАНИЕ ОТДѢЛЕНІЙ.

Стран.

ОТДѢЛЕНІЕ I. О живомъ теловѣтескомъ тѣлѣ вообще.	-	-	1
— II. О влагахъ теловѣтескаго тѣла вообще, и во первыхъ о крови въ особенностях.	-	-	3
— III. О твердыхъ частяхъ теловѣтескаго тѣла вообще, и особливо о клетчатой плевѣ.	-	-	20
— IV. О жизненныхъ силахъ вообще, и особливо о сжимаемости.			34
— V. О здравіи и влестствѣ теловѣтескомъ.	-	-	43
— VI. О кругообращеніи крови вообще.			51
— VII. О бѣющихся жилахъ.	-	-	58
— VIII. О крововозвратныхъ жилахъ.			66
— IX. О сердцѣ.	-	-	70
— X. О силахъ, кругообращающихъ кровь.	-	-	92
— XI. О дыханіи, и его главнѣйшемъ употребленіи.	-	-	108
— XII. О голосѣ и рѣчи.	-	-	127
— XIII. О теплотѣ животныхъ.	-	-	138
— XIV. О испаринѣ.	-	-	148
— XV. О чувствительныхъ и чувствительныхъ жилахъ.	-	-	167
— XVI. О дѣйствіяхъ чувствительныхъ жилъ вообще.	-	-	185

ГЛАВА XVII. О вѣшнихъ чувствахъ
вообще, и въ особенности о ося-
заніи. - - - 193

— XVIII. О вкусѣ. - - 198

— XIX. О обоняніи. - - 202

— XX. О слухѣ. - - 209

— XXI. О видѣніи. - - 215

— XXII. О внутреннихъ чувствахъ
и прочихъ способностяхъ ду-
шевныхъ. - - 235

— XXIII. О произвольныхъ дѣй-
ствіяхъ теловѣческаго тѣла. - 242

— XXIV. О движеніи мышцъ. - 248

— XXV. О снѣ. - - 265

— XXVI. О лицѣ и вождельніи
оныя. - - 272

— XXVII. О жеваніи и глотаніи. 280

— XXVIII. О вареніи желудка. - 290

— XXIX. О сокѣ или жидкости
поджелудочной языкообразной
желѣзы. - - 300

— XXX. О желти. - - 304

— XXXI. О дѣйстви селезенки. - 319

— XXXII. О дѣйстви сальника. 325

— XXXIII. О дѣйстви кишекъ. - 330

— XXXIV. О дѣйстви всасыва-
тельныхъ сосудовъ. - - 346

— XXXV. О кроветвореніи. - 362

— XXXVI. О питаніи. - - 366

ГЛАВА XXXVII. О отдѣленіи.	-	374
— XXXVIII. О уринѣ.	-	385
— XXXIX. О разлитіи половъ во- обще.	-	394
— XL. О родотворныхъ дѣйствіяхъ мужескаго пола.	-	398
— XLI. О родотворныхъ дѣйствіяхъ женскаго пола вообще.	-	420
— XLII. О мѣсячномъ кровотече- ніи.	-	431
— XLIII. О молокѣ.	-	438
— XLIV. О зачатіи и беременно- сти.	-	446
— XLV. О образовательной силѣ.		471
— XLVI. О родахъ и ихъ слѣд- ствіяхъ.	-	482
— XLVII. О разлитіи рожденнаго и раждаемаго теловѣка.	-	490
— XLVIII. О умноженіи, совершен- ствѣ и умаленіи теловѣка.	-	501

КЪ сказанному мною въ § 579 о
всегдашнемъ пребываніи онаго, догадкамъ
еще подлежащаго пупочнаго пузырька, въ
нѣжнѣйшихъ человѣческихъ яичкахъ нахо-
дящагося, можно присовокупить сугубое
напоминаніе, то есть: что нѣжнѣйшую и
къ поврежденію удобнѣйшую частицу сію
не другимъ образомъ, какъ въ самомъ свѣ-

жемъ выкидышкѣ примѣшпшъ можно, и что она споль малая, и оный сосудъ, помощію котораго соединяется она съ пуповиною, споль тонкій бываетъ, что къ изслѣдыванію ея потребны самое внимательнѣйшее разсматриваніе и самый осторожный поступокъ и вооруженный глазъ, что я самъ на сихъ дняхъ извѣдалъ, вскрывши произящное выкинутое яичко, величиною едва съ голубиное яйцо бывшее, и нашедши въ немъ нѣжнѣйшаго почти съ муравья великаго зародыша, во внутренности коего (яичка) при первомъ взглядѣ не могъ я примѣшпшъ никакихъ слѣдовъ пупочнаго пузырька.

Но когда началъ подробнѣе изслѣдывашъ внутренность онаго; то по небольшомъ отдѣленіи внутренней сорочки отъ верхней, точно нашелъ его между плевами помянутыхъ сорочекъ, который хотя былъ сполько малъ, что едва горчичное сѣмячко превышалъ величиною своею; однако жъ былъ очень явственнѣй, пасокою своею наполненнѣй, и удобопримѣлиною тоненькою нитью соединеннѣй съ боку съ крапкою и тонкою пуповиною.



ОТДѢЛЕНІЕ I.

О живомъ теловѣтескомъ тѣлѣ вообще.
de corpore humano vivo in universum.

§. 1. Три вещи въ живомъ человѣческомъ тѣлѣ, дѣйствія коего изъясняетъ Физіологія (Physiologia), при-мѣчать должно, (*) по естѣ :

1) Твердыя части или сосуды (*solida s. continentia*) ;

2) Жидкости или влаги (*fluida*), въ оныхъ содержимыя, и наконецъ

3) Жизненные силы (*vires vitales*) ,
коими наипаче твердыя части къ вос-
пріятію удареній, влагами производи-
А мыхъ ,

(*) Подобнымъ образомъ Сочинитель книги, обыкновенно между Гиппократовыми считае-мой, *Epidemic. VI. sect. 8. §. 19.* давно изъяснился, говоря : Тѣ вещи со вниманіемъ разсматривать должно, кои или сами въ себѣ что либо содержатъ, или сами содержащія внутри, или наконецъ со стремленіемъ въ насъ обращающія. Каковое славное изреченіе подало случай Аврааму Казу Боергаву написать знаменитое сочиненіе, подъ заглавіемъ : *Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consentiens. LB. 1745. 8.*

мыхъ, и взаимному отраженію и круго-
обращенію, оныхъ, такъ какъ и къ со-
вершенію другихъ дѣйствій побуждаются,
и кои кажутся даже въ самыхъ по-
крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ влагахъ на-
ходящихся и вообще какъ бы существо-
членоустроеннаго шѣла (*corpus organicum*)
составляющіе.

§. 2. Всѣ же оныя вещи хотя суть
совершенно различны между собою, по
какой причинѣ различно здѣсь и из-
лагаются; однако въ живомъ шѣлѣ,
изслѣдываніемъ коего все Естествословіе
занимается, столь шѣсно соединены ме-
жду собою, что едва какую либо, или и
вовсе никакой изъ нихъ представить не
можно, которая бы не имѣла отноше-
нія къ другой.

Сіе по тому, что даже самыя чи-
стыя и прозрачныя шѣла нашего влаги
всегда избыточествуютъ землянымъ на-
чаломъ; да и твердыя части, кромѣ того,
что первоначально опъ жидкихъ происхо-
дятъ, хотя съ противной стороны весьма
сухими намъ представляются; однако
всегда содержатъ въ себѣ нѣкоторую мо-
кроту (*phlegma*); наконецъ едва возмож-
но снискать въ шѣлѣ такое волокноце,
ко-

которое бы, ежели не ошибаюсь, вовсе лишено было жизненных силъ.

§. 3. Предваривши сие, я буду говорить порознь о всѣхъ прехъ вещахъ сихъ, и во первыхъ о жидкихъ, такъ какъ такихъ началахъ, кои и большую (*) и главнѣйшую часть тѣла нашего составляютъ.



ОТДѢЛЕНІЕ II.

О влагахъ теловѣческаго тѣла вообще, и во первыхъ о крови въ особенности (de sanguine).

§. 4. Кажется, что всѣ жидкости или влаги, обрѣтающіяся въ тѣлѣ нашемъ, можно прилично раздѣлить на три главныя отдѣленія. Ибо изъ нихъ иная есть либо 1) сырая и несовершенно переработанная влага, куды первоначально относится, на первыхъ еще путяхъ находящійся, въ кровь преобразуемый, питательный сокъ; по немъ влаги, чрезъ скважины поверхности тѣла нашего внутрь проникающія и съ пи-

А 2.

та-

(*) CHR. Andr. Koch de proportione solidorum ad Fluida in c. h. Gest. 1737. 4.

питательнымъ сокомъ соединяющіяся; либо 2) самая кровь; либо наконецъ, 3) отдѣлившаяся отъ крови какая либо жидкость: хотя бы впрочемъ была она опредѣлена для извѣстныхъ употреблений тѣлесныхъ, или была совсѣмъ грубая и непошребная матерія.

§. 5. О первой и послѣдней я буду говорить въ другомъ мѣстѣ, когда дойдемъ до извѣсненія питательнаго сока, отдѣленія разныхъ влагъ и соковъ изъ крови и другихъ естественныхъ дѣйствій; куды вообще по справедливости всѣ относятся влаги: а теперь начну извѣсняться во первыхъ о крови, какъ такомъ первомъ и главномъ жизненномъ источникѣ, изъ котораго всѣ тѣла нашего влаги воспріемлютъ свое происхожденіе. Ибо какъ питательный, выше сего упомянутый, сокъ дѣйствіемъ природы превращается въ кровь, такъ и всѣ другія влаги отъ оныхъ отдѣляются и обрѣтаются въ тѣлѣ. Которая кровь, исключая не многія части, каковыя на примѣръ суть: кожица (epidermis), паушинная плева (tunica arachnoidea) и зародышевая внутренняя оболочка, сорочкою обыкновенно называемая (amnion), и на конецъ стекловидное, зу-
бы

бы облекающее, существо, во всемъ составѣ шѣла нашего существующее.

§. 6. Есть же кровь не что иное, какъ жидкость особливаго рода, всеобщаго известнаго цвѣта, больше или меньше живаго, которая при осязаніи оказывается клейкою и теплою, и которая по справедливости между таинствами природы щипается. Сіе потому, что никакимъ художествомъ и никакимъ искусствомъ не можно составить другой влаги, которая была бы подобна крови.

§. 7. Влага сія или кровь, будучи выпущена изъ живаго человека и принята сосудомъ, по большей части слѣдующія оказываетъ явленія (*):

И во первыхъ когда она еще тепла; то испускаетъ изъ себя паръ, который, еслии его поймаешь поставленнымъ надъ оною колпакомъ, подобно росѣ собирается въ капли водянаго свойства, почти такого, какое имѣетъ обыкновенная ключевая вода, исключая то, что паръ оный имѣетъ еще нѣкоторый смрадный запахъ, отмѣннаго свойства, который

А 3

за-

(*) Jo. Mart. Butt. de spontanea sanguinis separatione. Edinb. 1760. 8. recens. in cl. Sandifort thesaur. Vol. II.

запахъ въ мясоядныхъ животныхъ тяжелѣе бываетъ, и который по справедливости животнымъ называть можно, подобнымъ запаху, исходящему изъ теплыхъ ссакъ, или грудной, либо брюшной пупшоты самаго свѣжаго вскрышаго шрупа. Сея водяныя влаги много также находится и въ другихъ, ниже упоминаемыхъ, частяхъ кровяныхъ.

§. 8. По семъ мало помалу проспывая въ сосудѣ, раздѣляется на двѣ насти, то есть: сперва ссѣдается и сгущается, изъ поверхности котораго сгущенія въ скоромъ времени со всѣхъ сторонъвыступаютъ нѣкоторая водяность изжелта красноватая, которую обыкновенно называють сукровицею или водяностію крови, (*serum sanguinis*), которая нѣмъ больше выходитъ изъ ссѣдающей и сгущающей крови, шѣмъ меньше становится составъ упомянушаго сгущенія, которое обыкновенно называють слишкомъ или кускомъ кровянымъ, (*crassamentum*); также взглядомъ нѣкотораго сходства въ цвѣшѣ и плошности, ножемъ разрѣзываемой, кровяною печенью или закипомъ крови (*placenta*), либо остропомъ (*infula*), по причинѣ, что онъ пла-

ваетъ

ваетъ въ сукровицѣ, кою онъ подобно острову со всѣхъ сторонъ окружается.

§. 9. Самый же онъ кровавый кусокъ легкимъ образомъ, то есть, сотрясеніемъ и бѣеніемъ пружика, или часто повторяемымъ смываніемъ водою опять раздѣляется на двѣ составныя части, то есть: на собственную кровь или лучше сказать запекшійся кровавый кусокъ (сгусток), всему кровавому составу пурпуровый цвѣтъ доставляющій, и который чрезъ перемываніе отдѣляется отъ пасоки (lymph), другой то есть составной гораздо твердѣйшей и плотнѣйшей части крови, которую по причинѣ ея твердоспи называютъ основаніемъ сгущенія крови; съ которымъ чисе сѣвшааяся и запекшаяся кровь имѣетъ большее соединеніе, нежели сукровица (serum); сіе довольно ясно открывается даже изъ того, что отъ него багрянность кровавая безъ насилія и понудительнаго поступка сама собою не отдѣляется. Самая же пасока, чѣмъ болѣе отдѣляется отъ крови и лишается оная, тѣмъ болѣе и болѣе блѣднѣе становится, что продолжается до тѣхъ поръ, пока на концѣ учинится бѣлою и довольно вязкою и клейкою.

§. 10. И сѣи - то суть главнѣйшія чешыре части крови, кои ее составляютъ! — то есть: водяной промзглый маръ (aquosus latex), сукровица (serum), багряный кровяной кусокъ (cruor) и пасока (lympha), кои по какихъ поръ имѣютъ свою природную теплоту, по тѣхъ поръ все купно одинакую влагу составляютъ.

Изъ частей сихъ о трехъ послѣднихъ не много обстоятельнѣе поговорить за нужное почитаю. Ибо та жидкость водяная, о которой выше упомянуто, ничего такого не имѣетъ особеннаго, что требовало бы большаго изслѣдованія тѣмъ паче, что она не есть свойственна крови, такъ какъ не есть свойственъ находящійся и вѣдряющійся въ оной и прочихъ влагахъ тѣлесныхъ неупругій воздухъ, о которомъ ниже сего упомянуто будетъ.

§. 11. Сукровица кровяная (serum) есть густоватая и вязкая влага, состоящая изъ прочихъ жидкостей и влагъ большую клейкость и вязкость всему кровяному составу доставляющая: вообще же сравниваютъ оную съ яичнымъ бѣлкомъ (*); потому что

(*) C. GU. Pörner experimenta de albumine ovorum et feri sanguinis convenientia. Lips. 1754. 4.

что она, будучи подверженна теплотѣ 150 градусовъ по Фаренгейтову тепло-мѣру, превращается въ густое, удобо-разсѣкаемое, сваренному яишному бѣлку подобное, шѣло: чему нѣчто подобное, хотя впрочемъ и не такъ скоро, но развѣ по прошествіи 20 часовъ, случить-ся можетъ, говоритъ славный Москашъ (*), когда примѣшать къ ней негашеной извести. А ежели ее вы-парить и высушить, и по томъ оста-вить одну въ покоѣ; то она превра-щается въ прозрачное, Аравійской ка-меди, взлядомъ наружнаго ея вида по всему почти подобное существо, ко-торое мало по малу на подобіе яишнаго бѣлка разсѣдается на безчисленные вин-тообразнаго и совсѣмъ опмѣннаго начер-танія шрешины (*forma spiralis*).

§. 12. кромѣ прочихъ свойствъ сукро-вицы кажется еще особливаго примѣ-чанія заслуживаетъ то, что я учине-ніемъ подобныхъ Пристлеевымъ (**) опы-товъ не однократно примѣшилъ, то

А 5

есть:

(*) V. EJ. nuove osservanz. ed esperienze sul sangue etc. in scelta di opus. interessanti. Me- diol. Vol. XVI. pag. 102 sq.

(**) Philos. transact. Vol. LXVI. P. I. pag. 244 sq.

есть: что воздухъ, въ которомъ спавишся сосудъ, наполненный кровію, чрезъ посредство сукровицы на багряный кусокъ запекшейся крови такъ дѣйствуетъ, что цвѣтъ онаго весьма много перемѣняется; напротивъ того потъ же самый воздухъ гораздо меньше дѣйствуетъ и никакой почти перемѣны не производитъ въ упомянутомъ кускѣ кровяномъ, еслили вмѣсто сукровицы налить на его другой какой либо жидкости, *на пр.* воды, масла, или по крайней мѣрѣ другой: самаго же человѣческаго тѣла влаги, *на пр.* слюны или ссакъ, и такъ далѣе.

§. 13. Багряный кусокъ запекшейся крови (сигор) соспавляетъ другую самую замѣчательную часть крови, какъ въ разсужденіи ея цвѣта и вида, такъ и въ разсужденіи началъ, кои дѣйствіемъ огня изъ оныя извлекаются, и кажется, что часть сія принадлежитъ къ самымъ совершеннымъ, самую природою пріутопвляемымъ, тѣлеснымъ влагамъ, которыя какъ въ нѣжнѣйшемъ зародышѣ прежде чепырехъ недѣль послѣ его зачатія, такъ и въ цыпленкахъ прежде сорока часовъ ихъ насиживанія почти не бываетъ примѣтно, и которая послѣ сильныхъ

ныхъ кровопеченій всѣхъ прочихъ кровяныхъ частей труднѣе возраждается.

§. 14. Она состоитъ изъ шариковъ, всѣхъ прежде Левенгекомъ примѣченныхъ, коихъ всегдашнее и постоянное въ свѣжей крови начертаніе и одинакая величина, чего, исключая одно молоко, въ коемъ нѣчто подобное примѣчается, ни въ какой влагѣ шѣлесной не примѣтно, безъ сомнѣнія показывающъ, что они составляютъ самую существенную часть крови, отъ всѣхъ, выше упомянутыхъ, ея началъ отличную, хотя впрочемъ ихъ видъ есть гораздо простѣе, нежели о томъ думали славные мужи. Почему я ни о вымышленномъ Левенгекомъ шестеричномъ ихъ составѣ, ниже о томъ упоминаю, что я ни кольцеобразнаго въ нихъ начертанія, какое приписывалъ имъ Г. Торре (*), ни пузырьковъ,

(*) Jo. Mar. Della Torre nuove osservanz. intorno la storia nat. Neap. 1768. pag. 95 sq. Tab. IV.

Ej. nuove osservaz microscop. ibid. 1776. 4. pag. 83 sq. Tab. XIV. fig. 2. 7.

Что начертаніе оное кровяныхъ шариковъ было дѣйствительнымъ призракомъ, сіе узналъ изъ опытовъ, посредствомъ

ковъ, черными ядрами наполненныхъ, какіе въ нихъ поставляешъ Гевзонъ (*), не примѣшилъ, но, ежели я хорошо смотрѣлъ, собственными видѣлъ глазами, что они имѣютъ одинъ кругловатый видъ и походятъ на застывшую густую маперію. Чтожъ принадлежитъ до сочевицеобразнаго, разными будшо наблюденіями въ нихъ открытаго, вида; по хотя я сего и не отвергаю, однакоже, поелику самъ такого вида въ нихъ не примѣшилъ, утвердить того за подлинно не смѣю.

Прежде сего спрашиваемо было, могутъ ли кровяные шарики перемѣнять видъ свой въ то время, когда должно имъ проходить сквозь самыя малые сосуды? въ чемъ я вѣрю опынѣйшему мужу Рейхелю (**), что по естъ шарики оныя перемѣняютъ яйцеобразный

(ova-

самыхъ Торрѣвыхъ шариковъ учиненныхъ Х. Г. Кесплинъ. V. Ej. fascic. animadvers. Stutg. 1780. 4. pag. 12 fq.

(*) Philos. transact. Vol. LXIII. P. II. p. 303 fq. Tab. XII.

(**) S. Chr. Reichel de sanguine eiusque motu experimenta. Lips. 1767. 4. pag. 27 fig. III. g. g.

(*ovalis*) видъ свой, когда входятъ въ тѣсныя изъ пространныхъ сосуды, и послѣ опять получаютъ шаровидный образъ, когда изъ тѣсныхъ проходовъ въ пространные возвращаются, хотя впрочемъ и сего самому мнѣ не случилось примѣнить. Круглый же такой видъ шариковъ кровяныхъ усматривается развѣ въ живомъ человѣкѣ или по крайней мѣрѣ въ недавно выпущенной изъ жилы крови, который со временемъ пропадаетъ такъ, что самые шарики кажутся распадаются и какъ бы разплываются.

§. 15. Что касается до опредѣленія величины кровяныхъ шариковъ, то въ ономъ не согласны Физіологи (толкователи человѣческаго естества). Галесъ говоритъ, что каждый шарикъ имѣетъ поперешникъ равенъ $\frac{1}{3240}$ части унціи; напротивъ того утверждаетъ Сенакъ, что поперешникъ кровяныхъ шариковъ есть равенъ почти $\frac{1}{3136}$ части унціи; другіе другимъ образомъ величину ихъ опредѣляютъ.

§. 16. Красный цвѣтъ оныхъ, или лучше сказать, всея крови отъ ихъ самыхъ производитъ должно. Живость краснаго цвѣта различными перемѣняется образы. Такъ на пр. въ худопишаемыхъ или хворыхъ жготныхъ и шѣхъ,

кои

кои прешерпѣли сильныя кровотеченія, кровь бываетъ блѣднѣе; та кровь, которая въ бѣющихся жилахъ содержи- ся, или атмосферическому, а осо- бливо дефлогистированному, лишенному то есть горючаго вещества, воздуху под- вергается, бываетъ цвѣтнѣе предъ той, которая въ крововозвратныхъ обра- щается жилахъ, или въ неподвижномъ и неупругомъ либо горючемъ воздухѣ поставляется (*in aëre fixo sine phlogistico collocatur*).

§. 17. Причины, умножающія и уве- личивающія багряность крови суть каж- дому явственны. Но откуда бы первѣй- шее къ воспріятію и удержанію багря- ности оныя разположеніе производить надлежало, постигнуть трудно и почти не возможно. Галлеръ полагалъ оную въ желѣзной ржавчинѣ или сафранѣ, по той единственно причинѣ, что въ крови находится больше желѣза, нежели въ костяхъ и прочихъ частяхъ тѣ- ла, хотя въпрочемъ количество онаго есть очень малое, и въ опредѣленіи ко- порога весьма несогласны сочинители, такъ на пр. Менгинъ содержаніе онаго ко всему кровяному составу поставлялъ какъ 1 : къ 110; а Радесъ какъ 1 : въ

427. или какъ 1 : къ 503 и такъ далѣе.

При чемъ однакожъ должно замѣшшть то, что желѣзо оное не иначе открываеиця въ крови, какъ послѣ пережженія оныя; ибо я извѣдалъ, что ежели кровь токмо слегка высушшть; то ни по превращеніи оныя въ самый мѣлкій порошокъ, ни по смѣшеніи оныя съ живымъ серебромъ (mercurius), такъ какъ самимъ подвижнымъ металломъ, никакихъ слѣдовъ желѣза въ оной не оказывается, что подтверждается однимъ тѣмъ, что магнитъ изъ вышеупомянушаго кровянаго порошка никакихъ частицъ къ себѣ не притягиваетъ.

§. 18. Остаеиця на конецъ приняшь въ разсужденіе послѣднюю изъ главнѣйшихъ частей, кровь составляющихъ: то есть пасоку (lymphā), которую иные основаніемъ ссѣдающейя крови, иные клейкою, иные густою, липкою и вязкою частию крови, иные на конецъ волокнистымъ или мяснымъ существомъ крови называютъ.

Сію часть крови почиали нѣкогда за одно съ сукровицею, хотя впрочемъ пасока отъ сукровицы вовсе различествуетъ, тѣмъ паче, что она отъ

холоднаго воздуха сгущается, отъ примѣшенія же къ ней негашеной извести не скидывается по подобію сукровицы, какъ о семъ упомянуто въ §. 11. но пребываетъ жидкою, и, когда сгустившися по какимъ либо обстоятельствомъ, отъ примѣшенія къ ней извести опять жидѣетъ и въ прежнее приходитъ состояніе.

§. 19. Способы, какими насока можетъ отдѣляться отъ запекшейся красной крови, показаны въ 9 §. Впрочемъ и другими средствами, а наипаче естьли взбивать прутникомъ свѣжую кровь, удобно можно отдѣлить ее отъ прочаго состава крови, и превратить въ видъ перепонки, по имени изобрѣтателя своего Руишьевою именуемой (*) (*membrana Ruyschiana*).

Сходство, находящееся между такою искусствомъ составленною, перепонкою и нѣкоторыми достопамятными явленіями, а наипаче въ воспалительныхъ болѣзняхъ примѣчаемыми, ясно доказываетъ, что происхожденіе ихъ производить должно отъ сгущенія, описываемой здѣсь, насоки.

Сюды

(*) Ruysch. thesaur. anat. VII. pag. 11. Tab. III. fig. 6.

cf thesaur. 1. pag. 14. sq. Tab. II. fig E.

Сюды также принадлежатъ , не ка-
саясь другихъ множайшихъ явленій , какъ
такъ называемая воспаленіе въ бокахъ
означающая корка , на поверхности крови,
выпущенной изъ жилы, учиняющаяся ,
такъ и другія ей подобныя не есте-
ственные перепонки , копорыя обыкно-
венно изъ воспаленныхъ внутренностей
выступающею насокою образуются и оныя
облекающъ ; также нѣкоимъ образомъ
относится сюды и самая опадыва-
ющая Гуншорова оболочка , (*decidua fi-
ve caduca Hunteri*), копорая изъ влаги, во
впадину любовожденіемъ разгорячившей-
ся и плодъ понесшей матки изъ спѣнъ
оныя выступающей, составляется; далѣ
къ сему источнику относятся и пѣ
кашечныя плевы, посредствомъ коихъ
легкія отъ воспаленія, въ нихъ воспо-
слѣдовавшаго, не рѣдко срастаются съ
подреберною плевою , равно какъ и пѣ,
кои послѣ сильныхъ и тяжкихъ излія-
ній крови во впадину брюха зараждают-
ся въ оной. Наконецъ сюды принадле-
жатъ еще и пѣ перепонки , кои ,
какъ я собственными видѣлъ гла-
зами , выпавшій изъ матки въ брю-
хо и окаменѣвшій плодъ по долгомъ
пробываніи въ ономъ весьма крѣпко со-

единяющъ (*) съ сопредѣльными ему внутренностями. Да и самые носовые и сердечные полипы и другія кровяныя сращенія сюда причислять должно.

§. 20. Всѣ здѣсь изчисленныя и другія, въ разныхъ мѣстахъ упоминаемыя, явленія ясно подтверждаютъ великое достоинство и преимущество пасоки въ строеніи животныхъ. Ибо естли кровь имѣетъ какое либо жизненное начало; то кажется весьма вѣроятнымъ, что оное состоитъ въ описываемой здѣсь пасокѣ.

§. 21. Уже выше сего упомянуто (§. 10), что въ крови кромѣ показанныхъ здѣсь главнѣйшихъ частей оныя, находятся еще и другія, съ нею смѣшанныя, начала.

Куды иначе принадлежитъ воздухъ, который, какъ вообще утверждающъ, составляетъ $\frac{1}{3}$ часть всего количества кровянаго, который однакожъ находится въ крови живаго и здороваго человека не свободнымъ и упругимъ, но лишеннымъ своей упругія силы и шакъ тѣсно съ кровію соединеннымъ, что съ

(*) V. Commentar. Soc. Scient. Goetting. Tom. VIII.

съ трудомъ его опѣ оныя опредѣлить можно. И я изъ собственныхъ опытовъ примѣнилъ, что даже самая малѣйшая частица атмосферическаго весьма чистаго воздуха, будучи впущена по правиламъ такъ называемой вливательной Хирургіи собакъ въ шейную крововозвратную жилу (*vena jugularis*), весьма сильныя производитъ припадки, какіе суть: шепетаніе сердца, глубокій сонъ и судорги; а естли хоша не много большее количество впустишь того же самаго воздуха, то причиняетъ смерть (*).

§. 22. Изчисленные оныя первоначальныя части крови относительно до взаимнаго ихъ содержанія весьма много различествуютъ между собою какъ въ сужденіи возраста, такъ и содержанія жизни и другихъ не меньшей важности обстоятельствъ, которыя каждого чело-вѣка особое составляютъ здравіе.

§. 23. Что жъ касается до количества крови относительно ко всей машинѣ телесной, то его точно опредѣлить не можно. Галлеръ въ взросломъ чело-

В 2.

вѣкѣ

(*) Pluribus de iis experimentis egi in medicina. Biblioth. Vol. I. pag. 177 sq.

вѣкъ поставляетъ количество оныя отъ 30 до 36 фунтовъ, а другіе сообщаютъ другое количество крови полагающъ.



ОТДѢЛЕНІЕ III.

О твердыхъ частяхъ теловѣческаго тѣла вообще, и особливо о клетчатой массѣ (*teil cellulosa*).

§. 24. Твердые части (*) тѣла воспріимлютъ происхожденіе свое отъ самыхъ жидкихъ частей такъ, что, въ первомъ еще начертаніи, дрожащей нѣкоторой сгустившейся матеріи подобнаго зародыша каждая мало по малу на своемъ мѣстѣ твердою произражаея, имѣя въ разсужденіи взаимнообразнаго (**), между собою соединенія безконечное различіе, и учиняясь изъ самыхъ мягкихъ и нѣжнѣйшихъ началъ, какое на пр. есть мягкое мозговое существо, самыми твердыми частями, каковая есть спекловидная корка, вѣн-

(*) Hier. Dav. Gaubii Spec. exhibens ideam generalem solidarum c. h. partium. LB. 1725. 4.

(**) Abr. Kaau Boerhaave de cohaesione solidorum in corpore animali. in Nov. comm. Acad. Petropolit. Tom. IV. pag. 343 sq.

вѣнцы губные облекающая (*Cortex vitreus corone dentium*).

§. 25. Во всѣхъ сихъ твердыхъ частяхъ шѣла земляное начало, такъ какъ основаніе оныхъ, въ большемъ или меньшемъ находящся количествѣ, которое начало или просто сказать земля есть известнаго свойства, нечужда впрочемъ и другихъ началъ, но соединена съ нѣкоторыми кислотами, а особливо съ фосфорическою и отъ части съ сахарною. Къ большому же оныхъ соединенію кромѣ самаго ихъ совокупленія, какъ не упругій, имѣ сосущественный воздухъ (aër fixus), коего количество (*), какъ открывается изъ опытовъ славнаго Галеса, тѣмъ большее бываетъ, чемъ твердѣе и плотнѣе бываютъ шѣ части шѣла,

Б 3

въ

(*) Свойства сего воздуха еще не довольно извѣстны. То однако жъ извѣстно, что онъ принадлежитъ къ тому клею, посредствомъ котораго начала всѣхъ шѣлъ въ природѣ соединяются такъ, что почти ни металлъ, ни кость, ни камень, ни черепокъ, ни соль не могутъ быть распущены, чтобы изъ нихъ не выходилъ освободившійся воздухъ. Слова сій. сунѣ Г. Галлера de corp. hum. functionib. Vol III. P. 271.

въ коихъ онъ вѣдренъ, такъ и клей, обыкновенно животнымъ называемый, подобный тому, что изъ твердыхъ частей животныхъ извѣстнымъ доспается образомъ. Происхожденіе же онаго въ шѣлѣ кажется удобно изъяснить можно изъ того, что сказано выше о клейкомъ и вязкомъ существѣ крови.

Но что касается до желѣзнаго начала, которому вообще великія приписываютъ преимущества, въ споспѣшествованіи къ утвержденію соединенія частей шѣла; то я сіе едва пріемлю, смотря на чрезвычайно малое его количество въ шѣлѣ; ибо самыхъ даже твердыхъ частей шѣла, на пр. костей, цѣлые два фунта едва содержатъ въ себѣ $\frac{1}{2}$ часть грана желѣза.

§. 26. Большее количество твердыхъ частей шѣла нашего имѣетъ волокнистое строеніе, изъ нитей больше или меньше прямо проведенныхъ состоящее. Что легко видѣть можно въ костяхъ, а наипаче зародышевыхъ, также мышцахъ и сухихъ и безкровныхъ жилахъ, связкахъ и нѣкоторыхъ перепонкахъ, на пр. въ твердой и жесткой, мозіъ облегчающихъ, плевахъ и прог.

§. 27. Другія напрошивъ того часпи имѣющъ другой совѣмъ опъ выше упомянушаго строенія. опмѣнный составъ такъ, что почти никакихъ волоконъ въ нихъ примѣшпъ не можно, каковый по Гречески *παρσχηρα*, а по Россійски мягкимъ, грибоваснымъ существомъ или переплещеніемъ (*parenchyma*) называется, которое дано опъ природы всѣмъ какую либо жидкость опдѣляющимъ внутренностямъ, и которое инаго естъ состоянія въ почкахъ, а инаго въ печени и такъ далѣе.

§. 28. Между всѣми же сими родами составовъ, волокнистое ли они имѣющъ строеніе, или мягкое и грибовастое переплещеніе, находится нѣкоторая общая, клѣшчешю обыкновенно (*cellulosa*) называемая, перепонка, которую по справедливости между первыми и самыми главными, машину шѣла нашего составляющими, частями считатьъ должно (*).

§. 29. Ибо премногіа части шѣла нашего при всей твердости своей совѣмъ почти изъ такой клѣшчешю состоятъ перепонки, куды во первыхъ принадле-

(*) Dav. Chr. Schobinger (praes. Hallero) de telaе cellulosaе in fabrica c. h. dignitate. Goett. 1743. 4.

лежатъ многія оболочки и хрящи, такъ какъ такія существа, кои посредствомъ долгаго намачиванія въ водѣ опять можно разрѣшивъ на клѣпчатую плеву. Съ иными частями клѣпчатая сія плева споль тѣсно соединена, что другимъ частямъ, изъ коихъ состоятъ первыя, служитъ пріятелищемъ и основаніемъ. На пр. твердыя кости прежде, нежели окрѣпнули, состояли также изъ хрящей, которые сами состояли изъ клѣпчатой плотной плевы, которая потомъ, напоившись костепворнымъ сокомъ, расстянулась и преврети́лась въ хрящъ. Наконецъ сказать должно, что ни одной почти твердой части тѣла нашего не находится такой, гдѣ бы не обрѣталась клѣпчатая плева, исключая стекловидную, вѣнцы зубныя покрывающую, корку, въ коей я, положивши ее въ довольно крѣпкую кислоту, никакихъ слѣдовъ клѣпчатой плевы примѣшивъ не могъ.

§. 30. Далѣе клѣпчатая плева, обрѣшаясь между сопредѣльными ей частями, а особливо мышцами, служитъ имъ вмѣсто оградаы. Другимъ напротивъ того, возлѣ которыхъ то естъ она находится, служитъ вмѣсто подпоры: куда наипаче принадлежатъ сосуды, кровь

и пасоку несущія и чувствительныя жилы; вообще же клѣпчатая плева составляетъ такую нѣкоторую общую связь, помощію которой всѣ и каждая порознь части шѣла съ сопредѣльными себѣ соединяются.

б. 31. Откуда происходитъ двойное заключеніе, 1) что клѣпчатая плева составляетъ основаніе и швердь всей машины шѣла нашего шакъ, что ежели бы опіяшь мысленно все то вещество, которое кромѣ клѣпчатой плевы находится въ шѣлѣ нашемъ, а оставить во всемъ положеніи своемъ и цѣлости одну клѣпчатую плеву; то при всемъ томъ остался бы образъ всего шѣла и начертаніе его частей.

2) Что помощію самого онаго клѣпчатого основанія находится взаимная связь между всѣми частями шѣла и соблюдается открытый нѣкоторый проходъ изъ однихъ частей въ другія, хотя бы были онѣ по самой природѣ между собою различны, или одна отъ другой въ весьма дальномъ разстояніи находились, что шредо замѣнить должно, какъ для рѣшенія пустыхъ споровъ о непрерывныхъ протяженіяхъ и взаимныхъ соединеніяхъ перепонокъ,

такъ и для извѣсненія премногихъ явленій, въ болѣзняхъ повсечасно примѣчаемыхъ.

§. 32. Какъ клѣшечная она плевая премногимъ твердымъ частямъ плѣва даетъ бытіе и основаніе, такъ кажется и сама она получаетъ, какъ и получашь должна, происхожденіе и начало свое отъ одной изъ соснавныхъ частей крови: то есть, пасоки (lymph). Ибо примѣшавъ я, что изъ воспаленныхъ легкихъ выступаетъ пасока и превращается точно въ такую, какая здѣсь описывается, плевую, которая скоро по томъ, составляя какъ бы настоящую перепонку, соединяетъ легкія съ подреберною плевою.

§. 33. Довольно сего о свойствѣ, важности и достоинствѣ клѣшечной плевы. Надобно нѣчто предложить еще и о ея различіяхъ и во первыхъ о томъ, что она не вездѣ одинакую имѣетъ крепость.

Ибо ежели сравнить человѣковъ съ животными; то окажется, что клѣшечная плева въ первыхъ есть гораздо мягче и нѣжнѣе, нежели въ послѣднихъ; и ежели я не ошибаюсь, то кажется, что сія самая мягкость человеческой клѣшечной плевы составляетъ великія преимущества

чело-

человѣка, когда онѣ помощію такой мягкости и нѣжности клѣпчатой, въ шѣлѣ его находящейся, плевы, какъ нѣкоторыя самопончайшія побужденія ощущать, такъ и другія дѣйствія съ большимъ предѣ прочими животными совершенствомъ и поспѣшностію опдравлять въ состояніи.

Впрочемъ великое находится различіе клѣпчатой плевы относительно до ея большей или меньшей крѣпости даже и въ самыхъ людяхъ, какъ въ разсужденіи по есть возраста и пола, такъ и въ разсужденіи рода жизни, стороны и другихъ обстоятельствъ.

На концѣ бываетъ различная крѣпость клѣпчатой плевы и въ разсужденіи различныхъ шѣлесныхъ мѣстъ, гдѣ она обрѣщается: такъ на лр. бываетъ она мягче и слабѣе въ бровяхъ и конечной плоти (*in palpebris et præputio*), крѣпче же и дебелѣе близь ушей и другихъ симъ подобныхъ частей шѣла.

§. 34. Далѣе клѣпчатая плева кромѣ выше упомянутого, о которомъ вообще говорено было въ §§. 29 и 30, употребленія имѣетъ еще и другія, по есть; что клѣпочки оныя опредѣле-

ны къ воспріятію и содержанію разнаго рода жидкостей.

Наипаче воспріемлющъ онъ потъ водяной паръ или ту изъ крови исходящую влажностъ, которая всѣ почти части шѣла орошаетъ и учиняетъ ихъ мягкими и гибкими, и копорую ямочки клѣшечной плевы подобно греческой губкѣ въ себя (*) вбирающъ.

§. 35.

(*) Ежели сея клѣшечныя плевы шончайшія промежутки, кои жидкости наподобіе греческой губы въ себя вбирающъ, угодно назватъ сосудами; то я охотно соглашаюсь на то, что утверждалъ Г. Гуншеръ (*medical observ. and Inquiries Vol. II pag. 27 sq.*), якобы плева сія подобно прочимъ частямъ шѣла состоитъ изъ сосудовъ. Ежели же мысли Г. Гуншера были шѣ, якобы вся плева сія состоитъ изъ цилиндрическихъ крововозвратныхъ жилокъ, кои анатомически говорящіе обыкновенно разумѣютъ подъ именемъ сосудовъ; то я, учинивши опыты посредствомъ увеличительныхъ стеколъ, при учиненіи коихъ всякимъ образомъ оберегался я отъ оптическихъ призраковъ, коныры бы могли обмануть меня подъ видомъ сосудовъ, съ Гуншеромъ совсѣмъ другаго мнѣнія.

§. 35. Кромѣ сего клѣшчатая нѣко-
 торыхъ частей шѣла нашего плева слу-
 житъ къ воспріятію и другихъ нѣко-
 торыхъ влагъ. — Такъ на примѣръ оболочка,
 стекловидное шѣло глаза составляющая,
 содержитъ въ себѣ того же имени, поестъ
 стекловидную влагу (*humor vitreus*): а та,
 которая мозжечную перепонку въ костяхъ
 образуетъ, (которую вообще, хотя впро-
 чемъ и не со всѣмъ справедливо, внутрен-
 нюю надкостною плевою называютъ (*periosteum internum*) содержитъ въ себѣ ко-
 стный мозгъ (*medulla*): большая же на
 конецъ часть клѣшчатой плевы, между
 мягкими частями находящаяся, содер-
 житъ въ себѣ жиръ.

§. 36. И здѣсь - то кажется должно
 упомянуть о шряковой оной истинѣ,
 относящейся до клѣшчатой плевы: по
 есть ,

1) Что находятся въ шѣлѣ такія
 части, коихъ клѣшчатая плева хотя
 есть и весьма мягка и нѣжна, однако
 въ здоровомъ человѣкѣ никогда не на-
 полняется жиромъ; каковая на пр. есть
 та плева, которая обрѣтается въ
 глазныхъ вѣкахъ и въ шѣхъ частяхъ,
 кои мужескій дѣшгородный членъ состав-
 ляющъ и прочая.

2) Что жиръ во многихъ частяхъ тѣла не всегда въ одинакомъ количествѣ обрѣщается, и кажется, что онъ содержится въ тѣхъ клѣпочкахъ или пещерахъ (*), кои опредѣлены для воспріятія и содержанія въ себѣ сукровичной, выше упомянутой, влаги.

3) На концѣ, что жиръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ всегда, если не ошибаюсь, въ опредѣленныхъ нахо-дишся пріятелищахъ, какъ для об-щихъ, такъ и особенныхъ употребле-ній, куды на пр. можно отнести шомъ жиръ или шукъ, который составляетъ бугорокъ на лобковой кости у женщины, и который, какъ я видѣлъ, особенную нѣ-которую, со всѣхъ сторонъ окруженную, представлялъ глыбу (gleba) (**).

ф. 37. Теперь можно нѣчто сказать и о самомъ жирѣ (***), когда къ по-
му

(*) *Aliter sentiente Gu. Hunterum. V. L. c. p. 33. f.*

(**) Еще явственнѣе видѣлъ я въ шрупѣ самки обезьяны, Собакогрызѣ называемой (*Simia Simulolagus*), у которой, послѣ замо-роженія ея на спужѣ, глыбу оную жира на лунѣ находящагося, цѣлую выколу-пить можно было.

(***) *Gu. Hav. Jansen pinguedinis animalis confi-deratio physiologica et pathologica. LB. 1784. 8.*

му мѣсто сіе кажется быть способнымъ.

Жиръ есть не что иное, какъ масло, бытымъ изъ расптѣннѣй, то есть доспаваемымъ, масломъ почти со всѣмъ подобное (*); имѣющее вкусъ нѣжный, но не издающее никакого запаха и при томъ воды легче; которое состоитъ изъ горючаго вещества, помощію кислоты особеннаго рода съ мокрою соединеннаго (**).

§. 38. Жиръ поздно рождается въ находящемся въ употребленіи младенцѣ такъ, что прежде пяти мѣсяца послѣ его зачатія едва можно разпознать какіе нибудь вѣрные слѣды онаго.

Жиръ смотря по различію мѣстъ, гдѣ онъ находится, не всегда одинаковъ

В 4

гу.

(*) Joach. Died. Brandis comm. (praemio regio ornata) de oleorum unguinosorum natura. Goett. 1785. 4. pag. 13. sq.

(**) Dav. H. Knapе (praes. Segnero) de acido pinguedinis animalis. Ibid. 1754. 4.

Laur. Crell. v. d. chemisches Journal. 1778. P. I. pag. 102 sq.

Joach. Jac. Rhades de ferro sanguinis humaniisque liquidis animalium. Goett. 1753. 4. cap. IV. de adipe humano.

густоты бываетъ. Такъ на пр. жиръ, въ глазныхъ ямахъ находящійся, есть рѣдокъ и жидокъ; на противъ того жиръ, окружающій почки, есть густъ и твердъ на подобіе сала.

§. 39. Объ отдѣленіи онаго происходили споры, по есъ: какимъ образомъ онъ отдѣляется отъ крови? Помощію ли нѣкоторыхъ особенныхъ железокъ, какъ думалъ Вилгельмъ Гунтеръ, или токмо чрезъ одно раздѣленіе оболочекъ, боевыя жилы составляющихъ, выпрѣвается и собирается въ своемъ мѣстѣ (per diapedesin)? Последнее мнѣніе прочихъ доказательствъ кажется по одному тому быть правдоподобнѣе, что жиръ не однократно найденъ былъ противъ природы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ естествен-но его не бываетъ; что кажется удобнѣе изъяснить можно изъ попорченнаго сосудовъ строенія, нежели изъ железъ, противъ всѣхъ правилъ природы вновь возрожденныхъ: такъ на пр. въ самомъ даже глазномъ шарѣ не однократно найденъ былъ жиръ; подобный также шукъ исполняетъ то мѣсто въ мошонкѣ, изъ котораго вырѣзано ядро, да и нѣшъ почки ни одной впадины въ тѣлѣ, гдѣ бы когда нибудь не найдено было на-
по-

подобіе жиру затвердѣвшей опухоли (Heathoma).

Вообще же всѣ тѣ железы, коимъ нѣкоторые знаменитые мужи старались приписывать отдѣленіе шука, относятся къ однимъ утомчательнымъ, а не дѣйствительнымъ существамъ.

Но какъ бы то ни было, однако за подлинно извѣстно то, что какъ отдѣленіе и совершеніе жира, такъ и всасываніе онаго въ кровь скоро совершаемо бытъ можешъ.

§. 40. Польза жира есть много-различна.

Онъ содѣлываетъ твердыя части мягкими и способными къ движенію. Онъ опрѣваетъ спужу и дѣйствіе оныя на тѣло умалешъ. На конецъ вездѣ равномерно разширяя кожу, облекающую тѣло, доставляетъ ему изрядство и красоту.

О другихъ особенныхъ жира употребленіяхъ, *на пр.* костнаго мозга и прочая; я уже не упоминаю.

Впрочемъ кажется, что жиръ почти ни мало не способствуетъ къ питанію тѣла здороваго человѣка (*).

В 5

ОТ-

(*) Вѣроятное подлинно есть мнѣніе П. Лёнема (Tr. anat. de la Chenille, qui ronge le bois

ОТДѢЛЕНІЕ IV.

О жизненныхъ силахъ вообще, и въ особенноти о сжимаемости (*de contractilitate*).

§. 41. Въ шрудный пушь вступаю я, и шрудный начинаю урокъ, предпринимаю говорить о твердыхъ, жизнию одаренныхъ, частяхъ (*), и излагаю жизненные силы, коими части тѣла нашего какъ бы одушевляюся, и коими учиняюся способными какъ къ воспріятію нѣкоторыхъ побужденій, такъ и къ совершенію дѣйствій, отсюда происходящихъ (*).

§. 42.

Bois de Saule. pag. 428. 483 sq. et praef. pag. XIII.), что безкровныя насѣкомыя главнѣйшее пипаніе или пищу свою получаютъ изъ того жира, коимъ они изобилуютъ.

(*) Guak. Forsten Verschuir or. de recentiorum Medicorum, imprimis Belgarum, meritis, in phaenomenis et effectibus principii, quod vitam animale constituit, indagandis. Groning. 1781. 4.

Matth. van Geuns de eo, quod vitam constituit in corpore animali. Groning. 1758. 4. recus. in Sandiforti thesaur. Vol. II.

§. 42. Приспупая же говорить о твердыхъ живыхъ, жизнию то есть одаренныхъ, частяхъ шѣла, во первыхъ долженъ я ограничить предѣлы оныхъ, когда довольно извѣстно, что я не говорю здѣсь какъ о шѣхъ силахъ, которыя человѣческому шѣлу съ прочими въ природѣ существующими шѣлами суть общія, каковая на примѣръ есть упругость, (дѣйствія коея въ строеніи животныхъ суть многоразличны (*)); такъ равно и о шѣхъ, кои приличествуютъ одной токмо душѣ, хотя впрочемъ я довольно увѣренъ въ томъ, что ничего того опровергать не станешь, сколь великое могущество имѣетъ душа надъ шѣлесными силами! но рѣчь моя идетъ единственно о шѣхъ, кои во многихъ родахъ матеріи, орудное шѣло нашей составляющей, обрѣтаются, и кои, еслии не ошибаюсь, къ слѣдующимъ видамъ отнести можно.

§. 43.

Jo. Theod. van der Kemp. de vita et vivificatione materiae humanum corpus constituentis. Edinb. 1782. 8.

(*) Jo. Henr. Schulze de elasticitatis effectibus in machina humana. Hal. 1738. 4. recens. in Halleri collect. anar. Vol. III.

§. 43. Первый по естѣ и общій видѣ упомянутыхъ жизненныхъ силъ; который всѣхъ прочихъ основаніемъ называть можно, есть сжимательность (*contractilitas*), по естѣ простое къ жиманію и сокращенію спремленіе. Сія сила, по крайней мѣрѣ какъ я думаю, находится во всей клѣпчатой плѣвѣ, и слѣдственно она столько же разпростирается по шѣлу, какъ и клѣпчатая плева. Почему не несправедливо такая сила силою клѣпчатой плевы (*vis cellulosa*) называется.

§. 44. Другой видѣ жизненныхъ шѣлесныхъ силъ называется Галлеровою раздражительностію (*irritabilitas Halleriana*), которая приличествуетъ однимъ шокмо волокнамъ или мышечнымъ нитямъ, и которую по сей самой причинѣ мышечною силою называть должно (*vis muscularis*). Сила сія оказывается особливымъ нѣкоторымъ образомъ, по естѣ впредь и вспять послѣдующимъ и какъ бы дрожащимъ движеніемъ, которое различается отъ простаго сжиманія даже шѣмъ, что отъ всякаго прикосновенія какого либо шѣла возбуждается.

§. 45. Третья сила есть чувствительность (*sensibilitas*), которая приличествуетъ

спвуетъ одному только чувствѣнножилъ-
ному мозжечку вкупѣ со всеобщимъ чув-
ствилищемъ, и копорая сила давно названа
чувствительною силою (*vis pervea*), ко-
порая есть причиною, что естли ка-
кія либо части шѣла, силою оною ода-
ренныя, будущъ раздражены дѣйстви-
емъ надъ ними какихъ либо побужденій,
то отъ того возникають чувствованія
и въ общемъ чувствилищѣ или мозгѣ (*in
sensorio communi*).

§. 46. Всѣ сїи три силы можно на-
звать *общимъ илемею жизненныхъ силъ*:
когда онѣ либо всѣмъ вообще, либо мно-
жайшимъ изъ частей, машину шѣла на-
шего составляющихъ, больше или меньше
приличествуютъ, копорыя части древнїе
назвали однородными или стихійными
(*partes similes*).

§. 47. Кромѣ сихъ силъ неслжитъ
упомануть еще и о четвертой, то есть
о жизни такъ называемой собствен-
ной, подъ именемъ копорыя разумѣю я
шѣ силы, копорыя приличествуютъ осо-
блвымъ нѣкопорымъ частямъ шѣла, бу-
дучи предопредѣлены къ отправленію так-
же нѣкопорыхъ особлвыхъ дѣствій, и
копорыхъ ни къ какому отдѣленію выше-
упоманутыхъ силъ отнести не можно.

По

По чему не лезъ погрѣшить противъ правилъ здраваго разсудка, естли сказать, что тѣ части тѣла, которыя отъ прочихъ частей различествуютъ какъ строеніемъ своимъ, такъ составомъ и оппавленіемъ особливыхъ дѣйствій, особливыми также силами къ оппавленію особенныхъ дѣйствій оныхъ отъ самой природы одарены.

Чтожъ касается до опыта, то изъ прилѣжныхъ природы наблюденій открывається, что подлинно находящся въ тѣлѣ нашемъ такія части, а наипаче внутренности, которыя производятъ такія особливыя дѣйствія и движенія, что ни отъ которой изъ общихъ вышеупомянутыхъ силъ производить ихъ не можно, но кажется должно полагать причиною оныхъ нѣкоторую особенную, имъ однимъ свойственную, жизнь.

Примѣрно доказываютъ сіе движеніе радужнаго кружечка въ глазѣ; воздыманіе сосковъ грудей женскихъ; движеніе брыжей машочныхъ трубъ, Фаллопіевыми называемыхъ, дѣйствіе послѣда или дѣтскаго мѣста и матки надъ младенцемъ и родами; нисхожденіе ядеръ изъ паховъ у младенцовъ и, естли не ошиба-

баюсь, всѣ отдѣленія влагѣ и соковѣ въ плѣтѣ.

§. 48. На концѣ остается упомянуть еще о производительномъ сжимленіи, или лучше сказать, образовательной силѣ (*nisus formativus s. vis plastica*), о которой такъ какъ о дѣйствующей причинѣ всего произрожденія, взятаго то есть въ пространномъ смыслѣ, подъ которымъ какъ питаніе плѣта, такъ и возстановленіе или возрожденіе поврежденныхъ частей онаго, какъ бы нѣкоторыя образпріятія виды заключающіяся, судить должно; поелику сила сія совершаетъ, что вещество родотворное ли оно, или питательное, будучи принято предопредѣленными ему мѣстами и достигнувши до надлежащей зрѣлости, воспринимаетъ надлежащій видъ или образъ, превращаясь въ такія части, кои вскорѣ по томъ выше показанныя воспринимашъ силы, то есть либо сжимательность, либо раздражительность, либо на концѣ собственную и однимъ только имъ приличную жизнь.

§. 49. Пространнѣе объ образовательной сей силѣ будетъ предложено тогда, когда дойдетъ рѣчь до рожденія; о раздражительности, когда будетъ извѣс-
емо

емо мышечное движеніе; о чувствительности, когда дойдетъ дѣло до изложенія дѣйствій чувствительныхъ жилъ; а о собственной жизни вездѣ говорено будетъ, гдѣ покомъ того попребуетъ случай.

Чтожъ до сжимательности, то можно еще здѣсь нѣчто въ особенностяхъ объ оной предложить.

§. 50. Я сказалъ, что сжимательность во всемъ находится шѣла, по тому что и клѣпчатая плева вездѣ въ ономъ обрѣшается.

Слѣдовательно сжимательность во первыхъ въ шѣхъ частяхъ шѣла больше находится, кои изъ одной почви состоятъ клѣпчатой плевы, каковыя части по справедливости суть оболочки или перепонки. Ибо никто того опровергать не станетъ, что оболочки имѣютъ свойство сжиматься и сокращаться, естли только приметъ въ разсужденіе сжимательность одной внутренней мышечной плевы (dartos), либо спазмы или сжиманія кожи или брюшины (peritonium), которая одна въ состояніи сдавить кишки и причинить смерть, какъ - то неоднократно примѣчено было.

Далѣе сжимательность находится и во внутренностяхъ, а особливо шѣхъ,
 кои

кои состоятъ изъ клѣпчешой плевы; куды принадлежатъ легкія, коихъ что внѣшняя плева, сославъ ихъ облекающая, есть весьма сжимательна, какъ то въ недавномъ времени утверждалъ Варніеръ, сіе я, раздробляя мертвыя пѣла, собственнымъ извѣдалъ опытомъ.

А что сжимательность находится даже и въ самыхъ костяхъ, сіе подтверждаютъ какъ ямки, кои по вынутіи либо по выпаденіи зубовъ явнымъ образомъ сжимаются и спягиваются, такъ и болѣзненная мертвенность костей (песгоис), изъ примѣра копорыя открывається, что по описаніи помершвѣлой кости новая опять кость, копорою она прежде окружаема была, мало по малу почти до естественной толстоты и вида кости спягивается.

Но какъ я сказалъ (§. 29), что стекловатое зубовъ существо не имѣетъ клѣпчешой плевы; такъ равно вѣроятнымъ кажется быть то, что зубы, не имѣющъ и описываемыя здѣсь сжимательности, что я заключаю изъ того, что когда снѣетъ зубъ или по какому либо случаю вѣчная поверхность онаго сопрется; то оставшаяся часть онаго никогда не спягивается такъ, какъ спя-



гиваются зубныя луночки, но безпре-
спанно зѣяетъ.

§. 51. Самую же оную клѣпчешой
плевы стягиваться способность над-
лежитъ относитъ къ первымъ и главнѣй-
шимъ крѣпости и здравія подпорамъ, и ка-
жется, что въ ней состоитъ крѣпость или
тонъ тѣла, о которомъ столь изящно пи-
салъ Шпаль, мужъ подлинно оспраго
ума! сие по тому, что клѣпчешая пле-
ва, въ здоровомъ человѣкѣ водяную, выше
сего упомянутую, жидкость крови на-
подобіе морской губки въ себя вбираетъ,
по томъ помощію сжимательности сво-
ей прогоняетъ въ пасочные сосуды; на
противъ того въ болѣзненномъ состоя-
ніи человѣка, лишившись крѣпости сво-
ей, способности то есть распягиваться и
сжиматься, наполняется проникшею въ
нее и въ ней оспанавливающеюся водою,
и бываетъ причиною отековъ и другихъ
симъ подобныхъ тѣлесныхъ припадковъ.

§. 52. На конецъ изъ присутствія
сжимательности, по всему тѣлу распро-
стертой, какъ впечатеніе ея въ прочія жи-
зненные силы, такъ и великое могуще-
ство къ составленію особеннаго каждому
человѣку здравія и сложенія изъ без-
численныхъ образовъ и степеней оныя
въ

въ разныхъ людяхъ довольно ясно открываются.



ОТДѢЛЕНІЕ V.

О здравіи и естествѣ теловѣтескомъ
(*de sanitatē et natura humana*).

§. 53. Три оныя вещи (§. 1), изложеніемъ которыхъ по сихъ мѣстѣ я занимался, въ живомъ человѣческомъ шѣлѣ непрерывно однѣ дѣйствуютъ надъ другими и взаимнообразно однѣ противодействуютъ другимъ. Жидкости по естѣ или влаги дѣйствуютъ на швердья части или сосуды, такъ какъ нѣкоторыя побужденія, а сосуды по силѣ жизненности своей какъ воспріемаютъ побужденія и производятъ дѣйствія, опшуда происходящія, такъ и самыя оныя побужденія взаимно отражаютъ. И сїи образы дѣйствія и противодействія въ здоровомъ человѣкѣ одно другому равномерно соопшвѣтствуютъ, всегда одинакое сохраняя равновѣсіе (*aquilibrum*).

§. 54. Кромѣ сего заслуживаетъ еще вниманія подлинно удивленія достойное частей шѣла нашего въ самомъ дальномъ разстояніи находящихя шовзаимное согласіе (*consensus*), которое по ис-

шиннѣ не изъ одного источника производить должно (*).

Ибо иное согласіе происходитъ отъ чувствительныхъ жилъ и удивительныхъ сплетеній и узловъ оныхъ (*ad nervorum ganglia gedit*), помощію которыхъ дѣйствія побужденій, будучи сообщены общему чувствилищу или мозгу, (*sensorium commune*), могутъ дѣйствовать опшуда надъ самыми опдаленными частями.

Иное происходитъ отъ обоого рода сосудовъ, кровеносныхъ то есть и пасочныхъ.

Иное зависитъ отъ нѣкотораго сходства въ строеніи частей и происходящаго опшуда взаимнаго согласія, симпатіею обыкновенно называемаго, такъ что о клѣпчешой плевѣ я уже и не упоминаю, которая поелику общую связь всѣхъ частей составляетъ; для того не можетъ не споспѣшествовать и при томъ большею частію къ совершенію и соблюденію согласія и связи въ частяхъ нѣла.

§. 55.

(*) V. de diversis istis sympthiae fontibus Dan. Laughans de consensu partium c. h. Goett. 1749. 4.

§. 55. На конецъ относится сюды и оное величайшее таинство природы, то есть соединеніе души съ тѣломъ, и многоразличное могущество и дѣйствіе другъ надъ другомъ, о которомъ поелику въ другомъ мѣстѣ пространнѣе говорено бысть имѣетъ; для того за довольное почелъ я кратко упомянуть о томъ, что кромѣ очевидной силы воли надъ многими мышцами, находятся еще и другія способности и могущества, кои безъ всякаго споспѣшествованія воли нашей оказываютъ силы своего дѣйствія надъ тѣломъ.

Такъ на пр. принадлежатъ сюды слѣпыя и слухскія побужденія, каковое на пр. есть то, которое возпламеняетъ въ нихъ жаръ любовный.

Далѣе великое имѣютъ вліяніе и дѣйствіе надъ тѣломъ и внутреннія чувства, а особливо воображеніе и тѣ производимыя онымъ душевныя спраски, кои весьма много дѣйствуютъ надъ тѣломъ, посредствомъ которыхъ даже съ благороднѣйшими и вышшими способностями душевными находится согласіе и взаимнообразное впечатеніе (*influxus mutuus*).

§. 56. Отъ многоразличнаго сего жидкихъ и твердыхъ частей тѣла;

также отъ взаимнообразнаго отношенія жизненныхъ силъ (§. 53), согласія частей (§. 54) и тѣснѣйшаго совокупленія души съ тѣломъ происходитъ жизнь и цвѣтешъ здравіе, кои однакожъ не одинакіе имѣютъ предѣлы, но безконечно различествуютъ между собою.

§. 57. Таковыя различныя степени жизни между двухъ содержащихся крайностей, изъ коихъ первая называется самою большею (*vita maxima*), а послѣдняя самою меньшею жизнію (*vita minima*).

Самая большая жизнь называется *ша*; когда въ цвѣтущихъ лѣтахъ дѣйствія тѣлесныя достигаютъ самаго большаго совершенства, которое Греки *акрѣ* называютъ; каковое соспояніе жизни можно безошибочно назвать аплетическимъ или самымъ крѣпкимъ.

Напротивъ того самою малѣйшею жизнію именуется *ша*, когда тѣлесныя движенія, хотя впрочемъ совершенно и съ природою равно какъ и съ прочими обстоятельствомъ сообразно, однакожъ гораздо медленнѣе совершаются, каковая на пр. жизнь есть младенца въ матерней утробѣ, которая есть тѣмъ меньше, чѣмъ нѣжнѣе и ближе къ своему зачатію бываетъ младенецъ; такимъ образомъ

вообще жизнь есть меньшая въ спящемъ, нежели въ бодрствующемъ человѣкѣ; спящій человѣкъ имѣетъ меньшую жизнь, нежели человѣкъ мужественныхъ и цвѣтущихъ лѣтъ и такъ далѣе.

§. 58 Не меньшее также различіе находится и въ здоровіи, потому что всякой человѣкъ особенную и ему покло одному свойственную имѣетъ жизнь (*); ибо и сами шѣ, коихъ мы самыми здоровыми называемъ, судя по различному состоянію крови, разности тона или крѣпости шѣла и прочихъ жизненныхъ силъ, премного различествуютъ между собою, такъ что иной изъ нихъ отъ однихъ и шѣхъ же побужденій и дѣйствій надъ его тѣломъ совсѣмъ опмѣнную въ себѣ чувствуетъ перемѣну, нежели другой и прочая. А можетъ быть, что каждой человѣкъ особеннымъ нѣкимъ, хотя впрочемъ и неудобопоспигаемымъ, одаренъ есть свойствомъ такъ, что онъ не въ состояніи по силѣ привычки сносить шѣхъ вещей, кои впрочемъ суть безвредны; напрошивъ того удобно можеть

(*) Cu. Fr. Ad. Gerresheim de sanitate cuivis homini propria LB. 1764. 4.

желѣ прешерпѣвать, а иногда и усиленно желать шѣхъ, кои другимъ чрезвычайными и необыкновенными кажутся.

§. 59. И сіе-то самое кажется бытъюю почкою, въ которой заключается поликокрашно оснориваемое и разсуждаемое свойство и разность шѣлосложеній или темпераментовъ, которая состоитъ какъ въ различной оной соразмѣрности и смѣшеніи (§. 22) частей, кровь составляющихъ, такъ и въ различной бодрости жизненныхъ, выше упомянутыхъ, силъ, равно какъ и въ различномъ опшуда произшедшемъ способѣ шѣла дѣйствовать надъ душою, а души надъ шѣломъ, отъ чего происходитъ въ шѣлѣ какъ особенное чувствованіе къ побужденіямъ, такъ и особенная большая или меньшая способность къ совершенію движеній.

§. 60. По сему различіе шѣлосложеній есть по истинѣ безконечное, и къ приведенію въ извѣстные предѣлы не возможное. Естли жъ желательнo какимъ либо образомъ ограничить шѣлосложенія; то довольно будетъ раздѣлить ихъ на чепыре обыкновенные порядка, то есть: на темпераментъ или шѣлосложеніе флегматическое или мо-

мокрошное или флегматическое, крова-
ное или Сѣгвиническое, вспыльчивое,
или Холерическое, и на конецъ задумчивое
или Меланхолическое.

§. 61. Ито раздѣленіе сіе, естъли
шкмо изъяснить оное неѣпное положе-
ніе, на которомъ основалъ Галенъ тако-
вое раздѣленіе шѣлосложеній, и кото-
рое выводилъ онъ изъ худорасположен-
ныхъ началъ кровяныхъ, кажется впро-
чемъ довольно согласно съ природою такъ,
что какъ всѣхъ вообще людей, такъ и
всякаго въ особенноти челоѣка, судя
по различію ихъ лѣтъ, разные шѣлосло-
женія къ четыремъ отдѣленіямъ удобно
относить можно, Такъ на пр. нѣжной
юности можно приписать мокрошное,
юношеству кровавое, мужеству запаль-
чивое, а старости задумчивое шѣлосло-
женіе (*temperamentum phlegmaticum, sanguineum,
cholericum, melancholicum*).

Впрочемъ, какъ выше упомянуто,
степеней и смѣшеній въ шѣлосложе-
ніяхъ находится столь великая раз-
ность, что ежели кто либо пожелаетъ
сходственность или разность, или сіи
либо другіе шѣлосложеній поставитъ
порядки, тошъ увидитъ открытымъ
для себя пространнѣйшее поле.

§. 62. Общее же совокупленіе и связь всѣхъ до сихъ мѣстъ упомянутыхъ способностей и законовъ, коими дѣйствія и должности человѣческаго шѣла чрезъ все теченіе жизни даже до смерти управляются и совершаются, называется человѣческимъ естествомъ: откуда произошло и имя Физіологіи или науки о естествѣ человѣческомъ, которую я теперь по мѣрѣ силъ моихъ излагаю.

§. 63. Но самыя оныя должности и дѣйствія шѣла не несправедливо раздѣляющіяся на четыре отдѣленія; которое раздѣленіе хотя и можетъ имѣть свои исключенія, такъ какъ не во всей точности съ природою согласное, однакоже можетъ быть принято для облегченія памяти юныхъ умовъ.

И во первыхъ первое отдѣленіе заключаетъ жизненные дѣйствія (*actiones vitales*), для того такъ названныя, что ихъ непрерывное и неповрежденное дѣйствіе есть всѣхъ прочихъ необходимѣе къ жизни; куды относятся кругообращеніе крови и дыханіе въ чело-вѣкѣ, рожденномъ на свѣтъ.

Второе содержитъ дѣйствія животныя (*actiones animales*), коими животныя отъ другаго царства ограниченныхъ или

или членосоставныхъ шѣлъ премного отличающихся; куды относятся въ чловѣкѣ соединеніе души съ шѣломъ, а наипаче чувства и движенія мышцъ.

Третье заключаеиъ естественныя дѣйствія (*actiones naturales*), кои отъ естества или природы опредѣлены къ питанію шѣла.

Четвертое объемлетъ дѣйствія, кои по есть служатъ къ рожденію и разпространенію чловѣческаго племени (*actiones sexuales*).

Теперь слѣдуетъ приступить къ изложенію каждаго въ особенности дѣйствій, начиная съ жизненныхъ.



ОТДѢЛЕНІЕ VI.

О кругообращеніи крови вообще (de sanguinis motu in universum).

§. 64. Кровь, какъ выше видѣли, главнѣйшимъ шѣла нашего частямъ даже самое произхожденіе, а прочимъ непрерывное подаетъ питаніе, и пошому по всѣмъ какъ внутреннимъ, такъ и наружнымъ частямъ шѣла, изключая немногія (§. 5), должна она раздѣляться; истиниъ которой научаемся

мы какъ изъ наливанія сосудовъ почкою нѣкоторою цвѣтною маперією, такъ и изъ того общаго опыта, изъ котораго открывається, что нѣтъ ни одной такой части въ тѣлѣ, изъ которой бы, естли ея хотя самопоначайшею уколоть иглою, не могла выступить кровь.

§. 65. Впрочемъ жизненная сія жидкость не такъ кругообращается въ тѣлѣ, чтобъ подобно Еврипу, какъ древніе говорили, чрезъ однѣ и тѣ же крововозвратныя жилы по приходила къ сердцу, по опять отъ него отходила; но такое имѣетъ обращеніе, что, будучи пролита сердцемъ въ бѣющіяся жилы, разливается чрезъ оныя по всему тѣлу и на конецъ, вступивши въ крововозвратныя сосуды, чрезъ оныя обратно проходитъ къ сердцу.

§. 66. Сіе кругообращеніе крови, опринувъ неосновательныя предшественниковъ своихъ наименованія (*), Вилгельмъ

(*) Несчастный Серветъ, равно какъ и славный Цезалпинъ всѣхъ прочихъ сочинителей, сюды принадлежащихъ, кажется ближе подходили къ познанію надлежащаго кругообращенія крови.

Въ доказательство чего довольно будетъ предложить немногія Серветовы слова изъ

гельмъ Гарвей, больше и больше утвердилъ въ томъ славномъ сочиненіи своемъ, которое 1628 года во Франкфуртѣ издано на свѣтъ. (*)

Д 3

Съ

того фیزیологическаго его разсужденія, котороторое помѣстилъ онъ въ томъ хотя впрочемъ славномъ, однако пагубномъ для него сочиненіи, которое издано въ свѣтъ (Viennae Allobrog. 1553. 8.), и которому заглавіе: Возстановленіе Христіанства (Restitutio Christianismi). Находится же рѣчь оная въ пятой Книгѣ того же самаго сочиненія, гдѣ предлагается обожественной Троицѣ, разсуждается о Святомъ Духѣ, и гдѣ между прочимъ говорится слѣдующее:

Жизненный есть тотъ Духъ, который посредствомъ соустій (anastomoses) изъ бьющихся переходитъ въ крововозвратныя жилы, въ коихъ онъ уже естественнымъ именуется.

Чтожъ касается до Андрея Цезалпина, то онъ также не малое имѣлъ свѣдѣніе о круготеченіи крови, какъ то ясно открывается изъ достопамятной его задачи о крововозвратныхъ жилахъ, ниже перевязки, а не выше, надувающихся, которая находится во 2. Т. его *Медицескихъ запросъ* 18. стр. 234.

(*) Сочиненіе оное называется Анапомическимъ упражненіемъ о движеніи сердца и кро-

Съ печеніемъ же времени круго-
обращеніе оное еще гораздо больше под-
тверждено, какъ самовидностію, обыкновенно посредствомъ увеличительныхъ сте-
колъ производимую (*), такъ и наливані-
емъ боевыхъ жилъ восковою или другою
подобною ей матерією, которая всегда
выше помянутыя пропекала дороги; на ко-
нецъ кругообращеніе крови чрезъ перели-
ванія оной, подлинно дерзкимъ образомъ
производившіяся, изъ одного то есть жи-
ваго въ другое живое же животное или
человѣка, также и другіе удобопр-
изводимые надъ живыми животными
опыты доказанно такъ, что теперь
ника-

крови въ животныхъ. Editio Francos. sumpt.
Fitzger. a. 1728. 72. paginis 4. с Fig. ae.

(*) Для показанія кругообращенія крови въ
жабахъ и имъ подобныхъ шваряхъ, весьма
способное есть Либеркинovo орудіе, обы-
кновенно именуемое *machina ad rana*.

А естли желательнo усмотрѣнъ оное
въ животныхъ, теплую кровь имѣю-
щихъ, то къ тому весьма хорошо упо-
треблять насиженные яйца, а наипаче тѣ,
кои чепыре или пять дней уже насижи-
ваны были, кои разсмапривать должно въ
простое увеличительное стекло, каковое
есть Лѳонетовo (*microscopium Lvonetianum*).

никакому уже не подлежитъ оно сомнѣнію (*).

§. 67. Но сколь великая былабы скорость движенія крови въ живомъ человѣкѣ, того ни коимъ образомъ точно опредѣлить не можно. Ибо взглядомъ скорости оныя кругообращенія крови не поком одинъ человѣкъ различествуетъ отъ другаго, но также великая находящаяся разность и въ разсужденіи возраста, равно какъ и въ разсужденіи разныхъ частей тѣла.

Вообще же кровь кажется медленнѣе и гораздо тише течетъ въ крововозвратныхъ, нежели въ бѣгущихся жилахъ. При томъ скорѣе течетъ она въ нияхъ сосудовъ, нежели въ самыхъ мѣлкихъ въпочкахъ оныхъ; почему полагаемыя нѣкогда отъ Физіологовъ разности скорости

Д 4

сти

(*) G. Remus. experimenta, circa circulationem sanguinis instituta. Goett. 1752. 4.

V. Haller de sanguinis motu. experimenta anatomica. Commentarior. Societ. Scient. Goetting. Tom. IV. an. 1754.

EJ. de eodem argumento Sermo II. operum minor. Tom. I. p. 63 sq.

Laz. Spallanzani V. cl. de fenomeni della circolazione &c. Mutin. 1773. 8.

ести кругообращенія крови суть неосновательны. Впрочемъ скорость крови, въ боевую жилу, изъ сердца выходящую, проливающейся полагается средняя такъ, что за всякимъ бѣненіемъ жилъ перебѣгаетъ она разстояніе почти осьмиунцовое, и слѣдовательно въ минушу перетекаетъ около 50 футовъ.

§. 68. Кровяные красные шарики кажутся въ ровень оси протекающихъ; чтожъ до того, что якобы шарики оные всѣхъ прочихъ кровяныхъ началъ скорѣе кругообращались, то я не знаю, на почномъ ли опытѣ основано таковое мнѣніе, или на однихъ только общихъ гидравлическихъ законахъ, весьма кажется неправильно къ теченію крови приспособленныхъ; неправильно говорю, ибо движеніе жизненной влаги, коимъ она чрезъ теплые и такъ сказать бодрые одушевленнаго шѣла каналы обращается, измѣряетъ и опредѣляетъ по шѣмъ точно механическимъ законамъ, по какимъ вода въ гидравлическихъ сосудахъ протекаетъ, есть нечто иное дѣлать, какъ заниматься пустыми умозаключеніями.

По крайней мѣрѣ я еще не имѣлъ счастья усмотрѣть такого шариковъ предъ

предъ прочими частями крови касатель-
но ихъ теченія преимущества.

§. 69. Напротивъ того я больше
удовольствуюсь въ томъ, что кровяные
шарики, плавая во общей кровяныхъ
частей жидкости, прямо шокмо спре-
мятся, а не купно около собственной оси
своей обращаются; вообще же нѣтъ ка-
жешся никакого сомнѣнія, что кромѣ
того движенія, о которомъ я здѣсь
предлагаю, кромѣ то есть сѣятельна-
го или поступательнаго движенія, едва
можно опредѣлить другое какое движе-
нiе, которое обыкновенно внутреннимъ на-
зываютъ; хотя впрочемъ не неизвѣстно,
что иногда кровяныя начала смотря по
различному направленію или раздѣленію
соустій сосудовъ разнообразно прегоня-
ются.

§. 70. И сего довольно о кругообра-
щеніи крови вообще. Теперь приступая
къ дальнѣйшему ея изслѣдованію, нажеш-
ся мнѣ, что наилучше поступимъ, ког-
да сперва нѣчто поговоримъ о тѣхъ со-
судахъ, въ коихъ кровь сохраняется; а
по потомъ изслѣдуемъ силы, коими оныя
сосуды къ прогнанію и опять къ воспрі-
ятію крови побуждаются.

ОТДѢЛЕНІЕ VII.

О бѣющихся жилахъ (*arteriæ*).

§. 71. Сосуды, разносящiе по всему соспаву тѣлесному приняшую ими отъ сердца кровь, называются бѣющимися жилами (*) (*arteriæ*).

Сiи боевыя жилы суть не такъ пространны и вмѣстительны, какъ крововозвратныя; однако же крововозвратныхъ жилъ гораздо тверже и упругѣе и, какъ открываеиися изъ Випрингамовыхъ опытовъ, гораздо крѣпче и плотнѣе.

§. 72. Онѣ состоятъ изъ проихъ оболочекъ, слоями разположенныхъ, или просто изъ трехъ плевъ (**), то есть:
1)

(*) Ger. van. Swieten de arteriae fabrica et efficacia in corpore humano. Lb. 1725. 4.

(**) De variis circa numerum et differentiam tunicarum arteriae sententiis cf.

Alex. Monro (pat.) in medical Effais and observations Vol. II.

De Lasone in Mem. de l'Acad. des sc. de Paris. a. 1756.

B. S. Albini annotat. Academ. L. IV. pag 30 fq. Tab. V. fig. 1.

Vinc. Malacarne della orsevez. in Chirurgia Taurin. 1784. Vol. II. pag. 103 fq.

1) изъ внѣшней, которую Галлеръ называлъ прямо клѣпчешюю, Албинъ чувственножилною, Везалій хрящевою, а иные сухожилною и проч. оболочкою именовали. Сія оболочка соспишъ изъ плошной клѣпчешой плевы, которая снаружи естъ слабѣе и рѣже; но чѣмъ ближе она присоединяется къ послѣдующей плевѣ, тѣмъ плошнѣе бываетъ; впрочемъ по ней разпростираются кровяные сосуды (*); вообще же сказать должно, что оболочка сія всякой бѣющейсѣ жилѣ подаетъ естественную крѣпость и упругость.

2) Изъ средней, которая составлена изъ волоконъ, поперегъ проведенныхъ, видъ полумѣсячїя или серпа имѣющихъ. Существо ихъ естъ мясистое, по чему и называется оболочка сія мышечною, въ коей, какъ кажется, жизненная сила, всѣмъ бѣющимся жиламъ естественная, больше ощущается, нежели въ другихъ плевахъ.

3) На конецъ изъ внутренней оболочки, которая гладкою и чрезвычайно склиз-

(*) Fr. Rhuysch. respons. ad ep. problematicam III. it. thesaur. anat. IV. Tab. III.

склизкою погёрхностію своею выспилаешъ полость бѣущейся жилы.

Она въ пняхъ и большихъ вѣтвяхъ сосудовъ есть гораздо явственнѣе, нежели въ маленькихъ и тонкихъ ихъ вѣтвочкахъ.

§. 73. Всѣ же въ человѣческомъ тѣлѣ обрѣтающіяся боевыя жилы имѣютъ происхожденіе свое отъ двухъ главнѣйшихъ пней.

Изъ коихъ одинъ называется легочною бѣущеюся жилою, которая, произведши отъ передняго пустыря сердечнаго, вселяется въ легкое (См. Tab. I. f. g. h.);

А другой большою или начальною бѣущеюся жилою именуется, которая, выведши изъ лѣваго или задняго пустыря сердечнаго, разпростирается по всему составу тѣлесному (См. Tab. I. n. t.).

Пни сїи раздѣляются на вѣтви, а вѣтви на мѣлкія вѣтвочки и пакъ далѣе.

§. 74. Вообще утверждающъ, что вѣтви кровеносныхъ сосудовъ, будучи взяты вмѣстѣ, превышающъ емѣстимостію своимъ внутреннее пространство тѣхъ пней, изъ коихъ онѣ производяшъ. Чпужъ до меня, но я сомнѣваюсь, чтобы утверждающіе сїе Сочинители

ли говорили и разумѣли то о всѣхъ вообще пняхъ, полагая поперешникъ пней наровень съ поперешникомъ лѣтей; но крайней мѣрѣ мнѣ, когда я чинилъ опыты на надъ воскомъ наложенными сосудами, какъ - то многіе Физіологи для изслѣдованія истинны сея дѣлали, но суда по самому существу дѣла, надъ сосудами самыхъ свѣжихъ мертвыхъ тѣлъ (какъ - то безименной и производящими опшуда бѣущимися жилами правой сонной или ушной и подъключевой (*carotis et subclavia tertia*) удалось примѣнить, что изъ поперешника пня и поперешниковъ вѣщей вышелъ прямоугольный треугольникъ, коего гипотенузы квадратъ по общей Пизагоровой теоремѣ равенъ былъ суммѣ (или содержанію) квадратовъ базиса и катета (*).

Да и самъ Галлеръ мѣлочнымъ бѣущихся жилочекъ пнямъ большее приписывалъ пространство, нежели въпочкамъ оныхъ, такъ что но крайней мѣрѣ въ семь разѣ обыкновеннаго вычету онаго за общій почестъ не можно, но должно щитать его таковымъ взглядомъ нѣкоторыхъ шокмо весьма не многихъ пней.

§. 75.

(*) V. D. Кепр. 1. с. pag. 51.

§. 75. Что принадлежитъ до виду или начертанія сосудовъ ; то вообще какъ всѣмъ нямъ, такъ и ихъ вѣтвямъ коническій приписывается, такъ какъ будто бы основаніе, противоположенное сердцу, было пространнѣе прошивной конечности. Однакожъ сіе мнѣніе не есть подлинно истинное , но токмо положительное ; ибо еслии кто спанетъ внимательнѣе разсмапривать какой либо родъ сосудовъ , то увидишь , что оныя суть почти со всѣмъ цилиндрическаго начертанія ; когда находятся примѣры нѣкоторыхъ бѣющихся жилъ , кои показываютъ , что онѣ чѣмъ далѣе отъ сердца простираются , тѣмъ пространнѣе спановятся. Куды по справедливости принадлежатъ внутреннія питешнія бѣющіяся жилы , да и самая дуга аорты или начальной боевой жилы (aorta) при корнѣ своемъ есть гораздо уже и тѣснѣе , нежели въ продолженіи ; сказать же вообще , что бѣющіяся жилы , а наипаче большія , прежде раздѣленія своего на вѣтви почти всегда ширѣ бывають.

§. 76. А что таковыхъ раздѣленій каждой бѣющейся жилы на вѣтви и вѣточки точно опредѣлить не возможно ;

сіе

сіе всякъ можешъ узнатьъ, кто только приметъ въ разсужденіе ту великую разность, по которой самыя маленькія бѣущіяся жилочки въ разныхъ частяхъ тѣла, а наипаче во внутренностяхъ, даже по многократнымъ раздѣленіямъ тѣми же остаются жилочками.

Что самое и произвело несогласіе между Сочинителями касательно до такого раздѣленія бѣущихся жилъ такъ, что Кейль до 50, а Г. Галлеръ до 20 только такихъ раздѣленій полагали.

§. 77. Послѣ такихъ многоразличныхъ раздѣленій, равно какъ и тѣхъ взаимнообразныхъ соединеній (*anastomolos*), посредствомъ коихъ ближнія и сопридѣльные вѣтви бѣущихся жилъ взаимно соединяются между собою, на концѣ достигаютъ бѣущіяся жилы до своихъ крайностей, гдѣ онѣ превращаются въ крововозвратныя жилы, такъ что та кровь, которая находилась въ боевыхъ жилахъ, на концѣ протекаетъ въ крововозвратныя, коими она опять приносится къ сердцу.

§. 78. А хотя такое непрерывное и непосредственное обоого рода сосудовъ соединеніе во многихъ частяхъ тѣла весьма явственнымъ оказывается; одна-
кожъ

кожѣ находится сомнѣніе, всегда ли бываетъ шакъовый переходъ бѣгущихся жилъ въ крововозвратныя, или кромѣ онаго въ нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ частяхъ шѣла находится нѣкоторое губчащее и ноздреватое шѣло (ragenschuma), въ которое концы бѣгущихся жилъ вселяются, и потомъ, выходя опять изъ онаго, превращающіяся на конецъ въ крововозвратныя жилы.

Подлинно находится нѣкоторыя явленія, куды по справедливости принадлежатъ возстанія и надутія дѣтородудныхъ частей, и куды можетъ быть также отнести должно и рдѣніе лица, спыдомъ причиняемое, кои шакое посредственное сосудовъ совокупленіе, естли не со всѣмъ истиннымъ, то по крайней мѣрѣ вѣроятнымъ учинающъ.

§. 79. Далѣе другіе многіе сосуды совсѣмъ особливаго рода кажутся вездѣ въ шѣлѣ получающъ произхожденіе свое отъ бѣгущихся жилокъ, каковыя сосуды суть двоякаго рода, одни то есть *сукровицныя* (ferofa), то есть споль мѣлкѣе и тонкѣе, что въ здоровомъ чловѣкѣ не красныя кровяныя шарики, но шокмо ихъ водяность, распворомъ (vehiculum) обыкновенно называемую (§. 69).

69), принимающъ въ себя въ состояніи. А другіе *отдѣлительные* (*secretoria*), по естѣ такіе, кои одни только опредѣленные влаги, изъ боевожильной крови (§. 4) отдѣляемыя, припаягивающъ и въ себя вѣрающъ.

§. 80. Что касается до первыхъ, то естѣ сукровичныхъ сосудовъ, то надлежитъ замѣтитъ, что здѣсь говорится не о вымышленныхъ Боергавомъ, желтыми и бѣлыми именуемыхъ, сосудахъ, коихъ нѣкогда число поставляли съ вымышленнымъ Левейгокомъ шестеричнымъ числомъ кровавыхъ шариковъ; ни о чувственнопасочныхъ Виевzenовыхъ и Феррейновыхъ сосудахъ, изъ коихъ, какъ утверждали мужи оные, большею частію состоятъ внутренности, что также не на лучшемъ и вѣрнѣйшемъ утверждено основаніи; но о простыхъ безцвѣтныхъ или прозрачныхъ сосудахъ, кои рѣдко, и развѣ въ нѣкоторыхъ воспалительныхъ болѣзняхъ сильнымъ стремленіемъ крови, либо подражаніемъ природѣ, то естѣ наливаніемъ какою либо цвѣтною маперіею зрѣнію представляюща; каковыя суть сосуды роговой глазной оболочки, коихъ едва когда либо, исключая свѣжіе трупы тѣхъ

людей, кои по долгомъ внутреннемъ глазномъ воспаленіи (chemosis) скончались, едва, говорю, когда либо можно найти изпещреннымъ воскомъ.

§. 81. Напротивъ того отдѣлительные сосуды отъ сихъ со всѣмъ суть отличны, а наипаче тѣ, кои свойственны отдѣляющимъ внутренностямъ и такъ называемымъ сгромажденнымъ или отдѣлительнымъ железамъ (glandulae conglomeratae); кои можно также помощію зончайшаго наливаія изслѣдовать; такъ на примѣръ ежели впустишь цѣпной какой либо маперіи въ бѣющуюся жилу околоушной железы (parotis); то оная чрезъ Штепоновъ протокъ вытекаетъ въ ротъ. Но о семъ ниже говорено будетъ.



ОТДѢЛЕНІЕ VIII.

О крововозвратныхъ жилахъ (de venis.)

§. 82. Кровь, которая чрезъ боевыя жилы по всему разливается шѣлу, должна опять помощію крововозвратныхъ жилъ возвращаться къ сердцу.

Сии жилы какъ дѣйствіемъ своимъ, такъ и строеніемъ премного различествуютъ отъ бѣгущихъ жилъ, исключая

чая весьма малое число такихъ, коихъ различіе сокрыто отъ чувствъ нашихъ.

§. 83. Впрочемъ крововозвратныя жилы суть всё вообще, исключая легочныя, пространнѣе и гораздо вѣтвистѣе бѣгущихся жилъ; онѣ не такъ постоянны въ печеніи и раздѣленіи своемъ, какъ боевыя жилы; а хотя суть мягки и не такъ упруги, какъ бѣгущіяся жилы; однако имѣютъ великую крепость и чрезвычайно много растягиваться могутъ.

§. 84. Оболочки въ нихъ суть тонѣе, нежели въ боевыхъ жилахъ, такъ что кровь чрезъ нихъ нѣкоторымъ образомъ видѣть можно; ихъ также меньше находится въ крововозвратныхъ, нежели въ бѣгущихся жилахъ; потому что изъ нихъ поставляютъ одну жѣлѣзчешую, нѣкоторымъ образомъ сухожильной боевыхъ жилъ подобную, а другую внутреннюю, столько же гладкую, какъ въ бѣгущихся жилахъ. Чтожъ касается до мышечной оболочки, то она находится развѣ въ пняхъ, ближайшихъ къ сердцу.

§. 85. Внутренняя оная оболочка въ премногихъ пространнѣйшихъ крововозвратныхъ жилахъ, коихъ то есть по-

перешникъ почти больше линей, имѣетъ вездѣ весьма хорошо успроенныя и иѣкія, видѣ сумочки имѣющія, заслоночки, по большей части простыя, нерѣдко двойныя, а иногда и тройныя такъ разположенныя, что дно каждой заслоночки къ началу крововозвратной жилы, а края къ сердцу обращенными находящіяся.

Однакожъ таковыя заслоночки не во всѣхъ находящіяся жилахъ. Такъ на примѣръ не находящіяся ихъ въ мозговыхъ и легочныхъ жилахъ и проч. равно какъ не находящіяся ихъ и въ воротной крововозвратной жилѣ (*vena portarum*).

§. 86. Вѣпочки крововозвратныхъ жилъ, (коихъ надлежало бы лучше называть корнями оныхъ) спускаются на конецъ въ большія вѣпви, а сіи напослѣдокъ въ шесть главнѣйшихъ пней превращаются, то есть: въ двѣ большія полныя жилы, одну вышнюю (см. Таб. 1. бук. а), а другую низшую (Таб. 1. бук. в) *vena cava superior & inferior*; и чешыре пня легочной крововозвратной жилы (— Таб. I. I. —).

Одна токмо воротная жила имѣетъ передъ прочими крововозвратными жилами ту отличность, что ея пень при входѣ въ печень сперва раздѣляется по

подобно бѣжущихъ жилъ на вѣтви, коихъ послѣдующія отпрыски претрагиваются въ корешки низшей полой жилы, и такимъ образомъ срастаются на концѣ въ одинъ пень.

§. 87. Что объ общемъ мнѣніи касательно пространства всѣхъ почви вѣтвей вообще сказано было, то есть что онѣ суть пространствѣ полости самаго пня, или что было сказано относительно до конического вида каждаго въ особенностяхи сосудовъ при изъясненіи о бѣжущихъ жилахъ (§. 74 75.); то самое взглядомъ подобныхъ случаевъ можно произнести и о крововозвратныхъ жилахъ.

Впрочемъ находящаяся хоня и рѣдкіе примѣры и крововозвратныхъ жилъ, коихъ вѣтви въ дальнѣйшемъ отъ сердца разстояніи бывающъ пространствѣ своихъ пней, куды на примѣръ принадлежатъ какъ чашковая или подколѣнная крововозвратная жила (*subcoriacea vena*), такъ и нѣ жи́лы, кои по отпрыскамъ бедренной или лядвѣйной кости разпростираются.

И слѣдовательно все то можно отнести, хоня впрочемъ съ нѣкоторою перемѣною, къ произхожденію крововоз-

врашнихъ жилъ, что сказано было о бѣющихся жилахъ (§. 77. 78. 781).



ОТДѢЛЕНІЕ IX.

О сердцѣ (de corde).

(§. 88.) Двойное, какъ видѣли (§. 65), между крововозвращными и бѣющимися жилами находится содиненіе: одно на самыхъ послѣднихъ обоого рода сосудовъ концахъ (§. 77); а другое въ самомъ ихъ источникѣ, то есть сердцѣ, въ коемъ всѣ главнѣйшіе пни кровоносныхъ сосудовъ совокупно стекаются.

(§. 89.) Самое же сердце (*) есть какъ бы первая дѣйствующая и движущая причина всей машины человѣческаго шѣла; ибо оно кѣ самопервѣйшему и самопреимущественнѣйшему жизненному дѣй-

(*) Guil. Cowper myotomia reformata (posth.) Lond. 1724. fol. max. Tab. XXXVI—XL.

Raym. Vieuvissens traite nouveau de la structure du coeur. Tolos. 1715. 4.

Jo. de senae traité de la structure du coeur, de son action, et de ses maladies. ed. II. (curante cl. Portal.) Paris 1777. II Vol 4.

Rob. Peirceval tentam. physiolog. de corde. Edinb. 1780. 8.

дѣйствию, то есть къ кругообращенію крови, съ четвертой по крайней мѣрѣ недѣли послѣ зачатія младенца начинающемуся и до послѣдняго жизни предѣла продолжающемуся, непрерывно и чудообразно споспѣшествуетъ.

(§. 90.) Сердце попеременно то пріемлетъ въ себя, то опять безъ всякаго закоснѣнія проливаетъ изъ полостей своихъ теплую кровь такъ, что первѣе изъ всего шѣла чрезъ обѣ крововозвратныя полныя жилы (*vena cava*), какъ вышшую то есть (Таб. I. бук. а. —), такъ и низшую (Таб. I. бук. в. —), равно какъ и изъ мясѣ, собственную его машину составляющихъ, чрезъ общее то есть его вѣночныхъ крововозвратныхъ жилъ отверзтіе, особливую за-слоночку имѣющее (*), въ переднюю пазуху (— с —) и соединенное съ оною ушко (— d —) пріемлетъ, а потомъ въ пустырь передній же, иначе еще правымъ называемый (*ventriculus anterior cordis*), отпуда изливаетъ.

§. 91.

(*) Casp. Fr. Wolff. V. cl. de officio venae coronariae magnae. in Act. Acad. Scient. Petropol. a. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani de cod. argum. in arti di Siena. Vol. VI.

§. 91. Изъ сего передняго, или какъ некогда говаривали, взявши подобіе отъ сердца рогатаго скопа, праваго сердечнаго пустыря: чрезъ легочную боевую жилу (— f. g. h. —), которую Древніе крововозвратною бѣсѣкся жилою (*vena arteriosa*) называли, кровь изливается въ легкія, возвращаясь же опшуда, входитъ сперва въ чепыре легочныя крововозвратныя, отъ Древнихъ бѣущимися крововозвратными жилами именнованныя, (— i —) вступаютъ въ общую всеѣмъ имъ пазуху (— k —) и соединенное съ оною лѣвое, что нынѣ лучше называется заднимъ, ушко (— l —) сердца.

§. 92. На конецъ изъ ушка сего въ задній изливается пустырь сердца (— m. —), а по томъ чрезъ боевую начальную жилу (*aorta arteria*) (— n. o. —) во всю связь и соединеніе всеѣхъ жилъ цѣлаго тѣла, а чрезъ вѣночныя (*) бѣущіяся жилы и въ самое существо сердца изливается.

§. 93. По семъ, достигнувъ самыхъ послѣднихъ предѣловъ кровеносныхъ сосудовъ

(*) Cf. Achill. Mieg V. cl. Specimen II. observationum botanicarum &c. Basil. 1776. 4. pag. 12 sq.

довѣ, возвращаеиша назадѣ чрезѣ самыя малыя опрасли крововозвратныхѣ жилѣ, изѣ коихѣ на конецѣ входитѣ она въ большія полыя жилы, а изѣ вѣночныхѣ одному сердцу свойственныхѣ боевыхѣ жилочекѣ, чрезѣ крововозвратныя такія же жилочки въ полыя жилы, изливаеиша, и такимѣ образомѣ все, о коемѣ мы говорили, круготеченіе совершаетѣ.

§. 94. Таковое чрезѣ впадины сердца непрерывное обращеніе крови въ порядкѣ соблюдаютѣ и опѣ мяшежныхѣ и возмущительныхѣ ея вспять возвращеній охраняютѣ заслоночки, отверзшія сердечныхѣ полостей окружающія (*valvulae*); которыя отверзшія суть не что иное, какѣ края сердечныхѣ пустырѣй, ближайшіе къ своимѣ пазухамѣ, каковыя суть и оба боевожилъныя отверзшія, изѣ полостей сердечныхѣ въ боевыя жилы отверзающіяся.

§. 95. Такимѣ образомѣ кольцо или сухая жила (*tendo venosus*), сосна-вляющая предѣлы пазухи и передняго желудка сердца, низходя во впадину онаго, кажется, какѣ будто на при
Ж сухо-

сухожильныя раздѣляется заслоночки (*), изъ коихъ каждой приписывали нѣкогда опять по три острія или зубца, и по той самой причинѣ называли ихъ *трязубчатými* (*triglochine* seu *tricuspidales valvulae*), кои соединяются съ тремя мышечными сердечными перекладами, вообще *сосными мышцами* называемыми (*trabes s. musculi papillares*).

§. 96. Подобнымъ образомъ предѣлы задней пазухи и желудочнаго задняго или лѣваго пустыря составляютъ другое такое же кольцо, на двѣ попомѣ заслоночки раздѣляющееся (**), кои по причинѣ нѣкотораго сходства съ митрою или первосвященническою шапкою, *митрообразными* называются (*valvulae mitrales*).

§. 97. У отверстій же легочной (***) и начальственной боевыхъ жилъ (****) во кругъ всего пространства оныхъ обрѣ-

(*) Eustachii Tab. VIII. fig. 6. — Tab. XVI. fig. 3. —

Santorini Tab. posth. IX. fig. 1.

(**) Eustachii Tab. XVI. fig. 6.

(***) Eustachii Tab. XVI. fig. 4.

(****) Eustachii Tab. XVI. fig. 5. — Morgagni adversar. anat. I. Tab. IV. fig. 3. — Santorini l. c.

обрѣшающіяся при, хотя впрочемъ гораздо меньшія, однако прекрасно устроенныя *полумѣсячно подобныя* заслоночки (*valvulae semilunares s. figmoideæ*).

§. 98. Отсюда явствуешь, какимъ образомъ посредствомъ сихъ разнообразныхъ заслонокъ охранено, что кровь возмущительнымъ стремленіемъ не можетъ вспять возвращаться въ нѣ впадины, откуда она выходитъ. Ибо заслоночки оныя впередъ грядущей крови удобно и легко уступаютъ; но возвращающейся назадъ всякимъ сопротивляющимся образомъ такъ, что она обратно течь не можетъ. Потому что заслоночки оныя удаляющеся назадъ кровію наподобіе раздуваемой вѣтрами парусины разширяются, и такимъ образомъ замыкаютъ сердечныя отверстія.

§. 99. Но та заслоночка, которая находится въ зародышѣ и новорожденномъ младенцѣ у отверстія низшей полѣй крововозвратной жилы, которую по имени изобрѣшателя Евстахіевою называютъ, съ лѣтами человѣка мало по малу уничтожается такъ, что на конецъ къ управленію прежняго дѣйствія своего учиняется неспособною; потому что въ ту пору въ ней никакой не бываетъ ну-

жды. Ибо по открытіи въ рожденномъ на свѣтъ младенцѣ чрезъ легкія дороги крови выше помянутыя полостей сердечныхъ заслоночки, бывающѣ совершенно помѣхою обратному ея изъ легкихъ возвращенію, и грядущая позади кровь не иначе можетъ совершать печеніе свое, какъ послѣдуя предвѣдущей.

А хотя иногда по несчастію и случаются препоны, исхожденію крови изъ праваго пустыря сердца въ легкія мѣшающія; однако въ то время кровь обратнымъ движеніемъ изъ правой пазухи опять возвращается въ большія поля крововозвратныя жилы, а не въ другое какое либо мѣсто, какъ - то ясно доказываетъ бѣеніе крововозвратныхъ жилъ, а наипаче вышшей полой жилы, въ то время противъ естества ощущаемое.

§. 100. Спрашивается было, позволяющѣ ли оныя полумѣсячю подобныя заслоночки полостямъ сердечнымъ совершенно опрассываться, или по крайней мѣрѣ какая нибудь частица крови, захваченная разширеніемъ оныхъ, обратно въ нихъ упадаетъ (*)?

На-

(*) Ita post Weitbrechtum aliosque. cl. Fel. Fon-

Наблюденія , учинныя надъ лягушками и даже надъ самомалѣйшимъ сердечкомъ цыпленка, еще въ яйцѣ находящагося, показываютъ , что въ животныхъ сихъ сердца совершенно опоражниваются ; но случается ли то же самое и съ человеческимъ сердцемъ въ естественномъ и неповрежденномъ его состоянїи, того заподлинно не извѣстно, да и противное тому подлинно оказалось бы, ежели бы можно было увидѣть строеніе заслоночекъ оныхъ таковыми въ естествѣ, каковыми онѣ по разрѣзанїи сердца представляются зрѣнію.

§. 101. Что до строенія сердца, то оно есть со всѣмъ особливаго художества и неподражаемаго искусства. Ибо хотя оно и мясистое ; однако чрезвычайно твердое и плотное, и отъ обыкновеннаго мышцъ вида премного различствуется.

Ж 3

Оно

Fontana, ricerche filosofiche sopra la Fifica animale. Florent. 1775. 4. pag. 101 sq.

Verum argumentis cl. viri respondit pridem Hallerus in noujs litterar. Goetting. tum nuper quoque, qui vernacule reddidit Fontanae librum cl. E. B. G. Hebenstreit. Lips. 1785. 8. pag. 328. sq.

Оно состоитъ изъ волокнистыхъ пучковъ больше или меньше косыхъ, и въ разныхъ мѣстахъ опмѣнно вѣшвшихъ, разнымъ и подлинно удивительнымъ направленіемъ изогнутыхъ и завитыхъ, слоями извѣстнымъ порядкомъ другъ на другъ лежащихъ, въ средостѣніи обѣихъ полостей сердца тѣсно соединенныхъ и чешырямя хрящевыми нитями къ основанію сердца укрѣпленныхъ, кои, какъ говоритъ Волфъ, все строеніе сердечныхъ волоконъ подробно описавшій (*), въ основаніи сердца раздѣляющіяся и перяющіяся, и кои мясистой составъ сердечныхъ пусырей какъ бы утврждающъ и опъ волоконъ ихъ паухъ опдѣляющъ.

§. 102. Всѣ же волокна оныя какъ чувствительными саомыгчайшими жилами, такъ и превеликимъ множествомъ кровеносныхъ сосудовъ, опъ вѣчныхъ бѣющихся жилокъ произходящихъ, усѣяны такъ, что Руишъ (**) не усумнился ска-

(*) Acad. Scientiar. Petropol. pro a. 1780 fq. тахите а. 1781. Р. I. pag. 211 fq. о хрящевомъ переплетеніи сердца, или о хрящевыхъ волокнахъ и ихъ раздѣленіи въ основаніи сердца.

(**) Ruysch. thesaur. anat. IV. Tab. III. fig. 1. 2.

сказать, что составъ сердца почти весь состоитъ изъ однихъ кровеносныхъ трубочекъ.

§. 103. Таковымъ спроенiемъ (§. 90 fq) и переплетенiемъ мышекъ своихъ (§. 101 fq.) сердце учиняется способнымъ къ непрерывнымъ и равнымъ движенiямъ своимъ, кои вообще суть таковы, что попеременно то преддверiя сердечныхъ пустырей, то самые пустыри при сжатiи сердца стягиваются, а при разширенiи онаго опять раздаются и разпространяются.

§. 104. Таковая мѣрность (rhythmus) въ ономъ переменномъ сжиманiи и разширенiи совершается такъ, что когда преддверiя или назуки полостей сердечныхъ сожмутся, дабы такимъ образомъ кровь, изъ легкихъ и полыхъ крововозвратныхъ жилъ въ нихъ возвратившуюся, вышѣснишь въ пустыри, то самые пустыри въ тоже время раздаются для воспрiятiя въ себя идущей крови; а когда пустыри стянутся и сомкнунутся, дабы такимъ образомъ вынудить содержимую въ нихъ кровь въ пни боевыхъ жилъ, съ ними соединенныхъ; то преддверiя опять разширяются и какъ бы поглоща-

ютъ кровь, изъ крововозвратныхъ жилъ къ нимъ приходящую.

§. 105. Сжиманіе же оное пустыррей сердечныхъ, на которое, какъ говорятъ Сочинители, одна шреть ($\frac{1}{3}$) времени всего сердечнаго біенія или пульса употребляется, по большей части совершается такъ, что внѣшніе бока или спѣны впадинъ къ средоспѣнію, между ими находящемуся, прижимаются, которое средоспѣніе передній пустырь сердца отъ задняго отдѣляетъ, каковое прижиманіе, наипаче, еслили взять въ разсужденіе коническій видъ сихъ впадинъ, кажется быть весьма довольнымъ къ опоражниванію упомянутыхъ пустыррей.

Впрочемъ не только спѣны пустыррей сердечныхъ, но и самыя оспроконеція ихъ во время сжиманія сердца влекутся къ основанію онаго, что не только въ животныхъ, какъ холодную (*),
такъ

(*) Ни въ которомъ животномъ при живо-разбѣженіи онаго не видалъ я явственнѣе точно сокращающагося сердца при его сжиманіи (systole), какъ въ томъ ужѣ (coluber patrix), который въ лѣсахъ къ городу нашему близкихъ длиною въ четыре
фуша

шакъ и горячую кровь имѣющихъ, но и въ самомъ живомъ челоѣкѣ не однократно примѣчено было (*).

Что касается до того обыкновеннаго опыта, якобы то есть остроконечіе сердца во время его сжиманія удареиша въ лѣвую пишьку, и слѣдовательно больше разширяется, нежели сжимается! то всякъ хорошо о вещахъ разсуждающій увидитъ, что оный опытъ

Ж 5

ни-

фута былъ однажды пойманъ и живъ распластанъ ножемъ, въ копоромъ всякое разширеніе сердца (*dilatole*) по самой малой мѣрѣ до 2 линей длиною превышало мѣру его сжиманія.

(*) Что оное уменьшеніе длины сердца при его сжиманіи не есть совершенно необходимое, сіе кромѣ прочихъ доказательствъ узналъ я изъ сердца утки почти вовсе окаменѣлаго, которое досталось мнѣ въ собраніе мое таковыхъ рѣдкостей отъ (С. F. Michaelis), которое отъ основанія до самого верха было окаменѣлое, въ бокахъ же имѣло мясное существо, помощію котораго могло оно имѣть съ боковъ движенія, коими могло оно желудки свои сжимать и содержимую въ нихъ кровь вынуждать.

никакой основательности не имѣетъ, но всѣ оныя ударенія единственно произходятъ отъ стремительнаго впечатлѣнія крови изъ крововозвратныхъ жилъ въ преддверія полостей сердечныхъ, и быспраго изліянія ея изъ оныхъ же полостей въ бѣющіяся жилы, отъ чего все сердце движется къ упомянутой сторонѣ ребръ.

§. 106. Возбуждаемое же оное сжиманіемъ сердца стремленіе крови со всѣми боевыми жилами такъ сообщается, что всякое сжатіе сердца во всѣхъ бѣющихся прочаго тѣла жилахъ, конхъ либо осязаніемъ ошутить можно, и кои по крайней мѣрѣ $\frac{1}{2}$ часть линей своимъ пространствомъ или поперешникомъ превышаютъ, либо коихъ бѣеніе другимъ образомъ чувствовать можно, что на примѣръ легко учинить можно въ ухѣ и глазѣ, особливымъ образомъ чувствуемо бываетъ, которое обыкновенно называютъ разширеніемъ или раздѣтіемъ (diastole) бѣющихся жилъ; о которомъ разширеніи, то есть можно ли полагать причину онаго въ одномъ дѣйствіи бѣющихся жилъ, ниже сего пространнѣе говорено будетъ.

§. 107. Впрочемъ опытъ подтверждаетъ, что бѣеніе жилъ въ здоровомъ чело-

человѣкъ (здѣсь разумѣть должно бѣущія жилы) образу, какимъ движется сердце, есть во всемъ соотвѣстственно и движенію сердца современно; да и въ самомъ болѣзненномъ бѣеніи жилъ прерываніи мѣрность сердца и бѣущихъ жилъ въ одну и ту же точку времени пресѣкается, и въ одно и то же мгновеніе опять возобновляется.

§. 108. Однако же число удареній сердца и въ самомъ здоровомъ человѣкѣ безчисленными перемѣняется образы; какъ въ разсужденіи лѣтъ, такъ и взглядомъ другихъ обстоятельствъ, кои во всякомъ возрастѣ собственное каждого человека здравіе составляющъ такъ, что точныхъ предѣловъ оному поставить не можно. Впрочемъ за позволенное почитаю предложить то, что я въ нашей странѣ (*) въ разныхъ людяхъ и при томъ разныхъ лѣтъ и разнаго возраста примѣшилъ, то есть, что я въ новорожденномъ младенцѣ, спокойно спавшемъ, въ первые дни послѣ его рожденія нащипалъ

(*) *Parum differunt meae rationes ab iis, quae Gu. Heberden ex anglico coelo exhibuit. V. Medical Transact. Vol. II. P. 21 sq.*

сталъ до 140 удареній жилъ въ одну минушу.

При испеченіи же перваго года въ шуже минушу до 124.

На второмъ году до 110.

На претшемъ и послѣдующихъ годахъ до 96.

Въ возрастѣ же, когда обыкновенно падають млечные зубы, я примѣшилъ до 86.

Въ юношесствѣ до 80.

Въ мужескомъ возрастѣ до 75.

Въ шесшидесятилѣтнихъ до 60.

А въ преспарѣлыхъ едва только два ударенія примѣшитъ могъ, въ коихъ число бѣеній сердца и боевыхъ жилъ ровно бываетъ степени ихъ старости.

§. 109. Женскій полъ бѣеніе жилъ имѣетъ скорѣе, нежели мужескій.

И ежели взять въ разсудокъ видѣ и состояніе тѣла вообще, то въ людяхъ большихъ и высокихъ бѣеніе жилъ совершается тише и медленнѣе, нежели въ людяхъ малорослыхъ, какъ то я собственнымъ извѣдалъ опытомъ въ Карлахъ и Великанахъ (*in panis et gigantibus*).

§. 110. Чтожъ принадлежишь до тѣхъ перемѣнъ бѣеній жилъ, кои производять оны вѣщи такъ на-
зываетъ

зываемыхъ неесшественныхъ, то должно знать, что оныя въ холодныхъ климатахъ или поясахъ медленнѣе совершаются, нежели въ теплыхъ такъ, что въ Гренландцахъ совершенно впрочемъ здоровыхъ и крѣпкихъ сердце въ одну минушу не болѣе тридцати или сорока разъ ударяетъ (*).

А Что бѣеніе жилъ послѣ употребленія пищи и иншя, также послѣ совокупленія, долгаго бдѣнія, и упражненія тѣлеснаго и душевныхъ спрасней скорѣе и чаще бываетъ, сіе всякому извѣстно.

§. 111. И сего довольно о бѣеніи жилъ, котораго изслѣдованіе относитъ больше къ сердцу, такъ какъ источнику своему, нежели къ боевымъ жиламъ, въ коихъ обыкновенно

(*) Сему наблюденію довольно соопвѣствуетъ медленное бѣеніе жилъ тѣхъ животныхъ, кои зимою въ безпрерывномъ снѣ, погребены бывають. Такъ на пр. въ ежѣ (*erisetus*) въ лѣтнее время бьютъ жилы въ минушу до 150; а ежели выкопашъ его изъ земли зимою; то въ такоеже разстояніе времени едва 50 разъ сердце его ударяетъ. — Cf. amicissimi Sulzer Naturgesch des Hamsters p. 169.

новенно изслѣдывается бѣеніе оное, естъ съ самую природою согласно поступать.

Ибо сердце даже до послѣднаго издыханія безпрестанно бьется, при концѣ однакожъ жизни человѣческой не всѣ вмѣстѣ части онаго замолкающъ, но передній пустырь сердца съ соединенною съ нимъ пазухою и ушкомъ имѣетъ по преимуществу предъ лѣвымъ, что нѣсколько долѣе онаго совершаетъ свое движеніе (*).

Ибо

(*) Однакожъ случается иногда, хотя впрочемъ весьма рѣдко, что правый пустырь сердца, будучи обремененъ излишнимъ количествомъ крови, изъ жилъ возвращающейся, противъ природы учинившись разслабленнымъ, прежде лѣваго зажимаетъ, что я самъ не давно извѣдалъ изъ разбѣятія живаго кролика. Ибо когда съ самаго начала (что обыкновенно случается при живоразбѣятіи сихъ робкихъ животныхъ) надлежащее бѣеніе сердца возмутилось шакъ, что часто чешыре вдругъ сжатій предсердій скоропоспѣжно одно за другимъ послѣдовали, при недвижимости впрочемъ желудковъ; по передній желудокъ былъ недвижимъ, когда напротивъ того задній непрерывно производилъ ударенія. По прошествіи же ось-

Ибо ежели по смерти челоуѣка возвращающейся вснять чрезъ полныя большія жилы крови пересѣкается обыкновенный путь чрезъ легкія, въ то время упавшія и сжавшіяся, а та между прочимъ кровь, которая изъ легкихъ не задолго передъ тѣмъ возвратилась къ сердцу, и потомъ, будучи изліяна въ начальную боевую жилу, впереди идущую въ кровообращенныхъ жилахъ кровь сзади понуждаетъ; то иного быть не можетъ, кроме

осьми минутъ, вырѣзалъ я сердце, которое еще лѣвою споровою своею сжималось, и опустилъ оное въ холодную воду, въ которой когда вымылась содержащаяся въ немъ кровь; то и лѣвыя оныя половины все пресѣлось движеніе. А когда по прошествіи трехъ минутъ положилъ я сердце на теплую ладонь; то лѣвой его желудокъ опять началъ чрезъ многія двигатися минуты, хотя правый, равно какъ и обостороннія его предсердія недвижимы пребывали.

Что до Галлероваго опыта, посредствомъ котораго онъ, перевязавши обѣ полныя крововозвращенныя жилы въ живомъ живошномъ, и перерѣзавши легочную общую жилу, учинилъ, что лѣвый пусырь сердца дѣйствовалъ долѣе праваго, то оный принадлежитъ больше до слѣдующаго ошдѣленія.

кромѣ того, что кровь сія, устремляясь къ сердцу и какъ бы ударяясь въ оное, приводитъ въ движеніе переднее сердца предмѣстіе; и что самое сіе предмѣстіе съ удареніемъ оныя еще нѣкоторое время борется тогда, когда заднее сердца предмѣстіе уже лишилось дѣйствія своего.

§. 112. Изъ такового въ послѣдніе разы при сместномъ издыханіи человека собранія крови къ переднему пусырю сердца довольная открывается причина, для чего большія бѣгущія жилы по смерти порожними оказываются (*).

Сію

(*) Что оное самое обыкновенное и нынѣ къ изъясненію самое удобное явленіе нѣкогда обмануло Еразиспраша, и заставило его думать, яковы въ бѣгущихся жилахъ содержишся воздухъ, а не кровь; сіе приписывать должно недоспашичной того времени Физіології. Но что и въ наши времена былъ нѣкоторый мужъ, который не только возобновилъ ложныя оныя мнѣнія, но еще не въ одной книжкѣ съ неописанною упорностію защищать оныя старался, тому удивляшся будущіе потомки. Кромѣ прочихъ сочиненій, которыми онъ отъ физіологически ученыхъ отринутъ, наипаче принадлежатъ сюда:

Сію же самую (*) причину полагалъ тому послѣ Вейссія (**) и Сабатіе (***), что передній пусырь сердца въ мертвомъ шѣлѣ взрослога наипаче человѣка, пространствомъ и вмѣстимостію своею превышаетъ задній.

§. 113. Удержанію же въ своихъ предѣлахъ и какъ бы управленію онаго, по сихъ мѣстѣ описываемаго, движенія сердца способствуетъ околосердечная сума (pericardium), въ коей сердце, такъ какъ бы въ нѣкоторой крѣпости будучи заключено, обрѣщается свободнымъ.

Сума же оная есть не что иное, какъ перепончатый мѣшечекъ, довольно пространнй, имѣющій видъ сообразный

3

на-

Cl. P. Moscati osservazioni ed esperienze sul sangue fluido, e rapreso &c. Mediol. 1783. 8.

Et cl. Bass. Carminati risultati di sperienze e osservazioni sui vasi sanguigni, e sul sangue. Ticin. 1783. 4.

(*) Sam. Avrivillius de vasorum pulmonalium et cauitatum cordis inaequali amplitudine. Goetting. 1750. 4.

(**) Jac. N. Weiss de dextro cordis ventriculo post mortem ampliori. Altorf. 1767. 4.

(***) Ant. Chavm Sabatier E. in vivis animalibus ventriculorum cordis eadem capacitas. Paris. 1772. 4.

начертанію (*) содержимаго въ немъ сердца, который мѣшечекъ происходитъ отъ плевъ грудостѣнныхъ (mediastinum), и который хотя весьма нѣжнымъ кажется, однако есть столько крѣпокъ, что по Випрингамовымъ, учиненнымъ надъ нимъ, опытамъ всѣ такого рода плесныя перепонки крѣпостію своею гораздо превышаетъ.

А что околосердечная сума принадлежитъ къ весьма важнымъ частямъ плѣла, сіе заключается даже изъ одного того, что она во всѣхъ животнохъ, красную кровь имѣющихъ, также обрѣщается, какъ и самое сердце (**); и
едва

(*) V. Haller elem. physiol. Tom. I. Tab. 1 fig. 1. 2.

(**) О Дикобразѣ (*hystrix erinaceus*) удивительное находится несогласіе между Анастомиками, изъ коихъ одни отвергаютъ, другіе приписываютъ оному околосердечную суму. Между послѣдними суть: Лавуизій, Галлеръ и проч. а между первыми послѣ Власа, Пееръ, Гарлеръ, а наипаче Октавіянъ Тоземпи (*in patris relaz. d' alcuni viaggi in diverse parti della Toscana ed. 2. Tom. VII. pag. 166 sq*). Средняго между обѣими мнѣніями кажется придерживается Дюверней, приписывая Дико-

едва находится одинъ примѣръ сердца человѣческаго , который бы противъ природы вовсе лишенъ былъ своея сумы ; хотя нѣчто тому подобное и предлагалъ Г. Динклеръ (*).

§. 114. Околосердечная сума всегда окропляется тою сукровичною росой , которую повидимому изпочають самые боевожилъные сердечные сосуды.

Подобная влага и въ самыя сердечныя пустошы изливается и увлажняетъ внутреннїя ихъ стѣны.

Объ же влаги оныя въ здоровомъ состоянїи человѣка имѣють свойство сукровицы , мѣсто которой развѣ во время воспаленїя сердца занимаетъ пасока (lymph)

З 2

pha)

Дикобразу вмѣсто околосердечной сумы грудобрюшную преграду.

Но я послѣ нѣсколькихъ разсѣченныхъ Дикобразовъ узналъ , что сего рода животное имѣетъ всегдашнее , хотя и неопредѣленнаго вида околосердечїе , отъ ближайшей слабой плевры грудобрюшной преграды происходящее , которое иногда бываетъ столь тонкое и изъ однихъ самыяжнѣйшихъ и слабыхъ клѣточекъ составленное , что едва заслуживаетъ имя настоящей околосердечной сумы.

(*) V. cl. Sandifort Natuur. en genees - kinkige Bibliotheek. Vol. II. pag. 661.

pha), которая на внешней поверхности сердца производитъ такъ называемыя волокна, и бываетъ причиною, что околосердечная сума срастается съ сердцемъ, а внутрь впадинъ сердечныхъ учиняются настоящїе (§. 19.) полипы, или перепончнокровяныя сращенія (polypus gignit).



ОТДѢЛЕНІЕ X.

О силахъ, кругообращающихъ кровь
(*de viribus, sanguinem pellentibus*).

§. 115. Изслѣдовавши до сѣлѣ и рассмотрѣвши сосуды, кровь въ себѣ содержащїе, уже надлежитъ говорить теперь о силахъ, коими они будучи снабжены, приводящъ въ движеніе кровь.

И во первыхъ разсуждать станемъ о силахъ сердца, кои по истиннѣ всѣхъ прочихъ главнѣйшими и преимущественнѣйшими. и почитать должно; потомъ поступимъ къ изъясненію вторичныхъ силъ, кои также не мало споспѣшествуютъ дѣйствию сердца.

§. 116. Ежели подробно разсуждать о силахъ сердца, то кажется, что ихъ изчислить не возможно, равно какъ

не возможно узнать ни количества крови, за однимъ сжатіемъ сердца въ жилы изпекающей, ни мѣры разспоянія, которое перебѣгаетъ кровь, проливая сердцемъ, ни скорости, съ каковою спрешится кровь, кольми паче не возможно поставить настоящей мѣры тѣхъ препонъ, кои учиняють великія помѣшательства силамъ и дѣйствию сердца, и прочая.

§. 117. Однакоже не взирая на то, можно нѣкоторымъ образомъ опредѣлить силу и могущество сердца, ежели сравнить все то, что изъ правдоподобной и вѣроятной догадки открывается; такъ на пр. ежели мы, придерживаясь середины, полагаемъ количество крови 33 фунтамъ, или 396 унціямъ равное, а число удареній жилъ, въ одну минушу совершаемое, равное 75, или 4500 въ одинъ часъ поспавляемъ (§. 108); и ежели полагаемъ, что за всякимъ сжатіемъ задняго пустыря сердца проливается въ жилы 2 унціи крови; то необходимо слѣдсать должно, что вся толща (табл.) или количество крови всякій часъ около 224 разъ чрезъ сердце протекаетъ.

Стремленіе же, съ каковымъ кровь, проходящая чрезъ сердце, отъ сжимающихся его мышцъ прогоняется, кромѣ

прочаго можно узнатьъ изъ той удиви-
тельной скорости и высоты, до кото-
рой кровь изъ прорѣзанной близкой къ
сердцу бѣгущей жилы возходитъ; ибо
я видѣлъ, что кровь изъ прорѣзанной
бѣгущей шейной жилы (carotis) взрослого
человѣка при первыхъ сжатіяхъ сердца
почти выше пяти футовъ воздымалась (*).

§. 118.

(*) Опыты Г. Галеса, кои онъ произ-
водилъ, вкладывая длинныя стеклян-
ныя трубки въ бѣгущія жилы жи-
выхъ животныхъ, и воспринималъ ими
изъ жилъ истекающую кровь, измѣряя
такимъ образомъ высоту ея воздыма-
нія, суть столько же изыщны, какъ
всѣ прочіе мужа сего, къ таковымъ из-
слѣдованіямъ рожденнаго. Однако ежели
желательно опшуда извлечь силы сердца,
то должно помнить, сколь много въ
опытахъ оныхъ столпъ крови, который
въ трубкѣ находящійся висѣющимъ и не имѣ-
ющимъ исхода, сколь говорю, много уни-
рается въ лѣвой желудокъ сердца и оный
обременяетъ и прочая. Выкладки Гале-
совы суть таковы, якобы кровь, изъ сон-
ной человѣческой жилы вырываясь, поды-
мается до вышины 7 фуп. $\frac{1}{2}$, а по-
верхность лѣваго желудка равна 15 квад-
ратнымъ унціямъ, и слѣдственно столпъ
кро-

§. 118. Почему ежели изслѣдовать источники, кои столько постоянную и всегда пребывающую силу и крѣпость сердцу доставляютъ; то первою и всѣхъ прочихъ главнѣйшею въ семъ случаѣ должно поставлять его *раздражительность* (*irritabilitas* §. 44), когда доказано, что сердце раздражительною своею, напротивъ, ежели возрѣтъ на ея долговременность (§. 89), всѣ прочія мышечныя части тѣла нашего гораздо превышаетъ (*).

А что и самыя сильныя впадины сердечныхъ отъ проходящаго чрезъ оныя пошoka кровяного раздражаются и побуждаются къ сжиманію своему, сіе ясно открывается изъ того Галле-роваго опыта, о которомъ мимоходомъ на стр. 87 упомянуто было,

и

кровеный есть шокъ, который тяже-
стію 51. 5. фунт. упирается въ оной
желудокъ и, сжиманіемъ онаго будучи
превозможенъ, изгоняется вонъ. *Statical*
Essays. Vol. II. pag. 40. ed. Lond. 1733. 8.

(*) V. de ea cordis prerogativa subtiliter di-
sputantem Cl. Fontana l. c. qui eam limitare
quodammodo voluerat. Sed et his pridem res-
pondit Hallerus in Indice litterario Goetia-
genfi.

и по которому Г. Галлеръ какъ шѣхъ, такъ и другихъ частей сердца, то есть какъ передней, такъ и задней полости онаго движеніе по произволѣнью долѣе продолжаясь могъ, то есть опни-мая отъ сей либо той крови полости сердца поощреніе, то есть во спящая изливаться въ оныя (*).

§. 119. Ежели находится въ шѣлѣ надлежащее количество крови, и ежели качество оныя неиспорчено, то дѣйствіе ея на сердце, а сего противудѣйствіе на оную такъ соразмѣрно, и такъ легко бываетъ, что человѣкъ спокойнаго духа никакого отъ круготеченія крови чувствованія не ощущаетъ, и ниже долженъ естественно ощущать оное.

Ежели же будетъ обремененъ либо лишешесвомъ крови, либо спрадать недостаткомъ оныя, а наипаче, когда какая либо чуждая матерія, на примѣръ зараза какой либо болѣзни, или электрической воздухъ, либо какія лекарства и такъ далѣе, смѣшаются съ жизненною вла-гю сею; тогда сердце, будучи противъ природы либо взволновано и встревоже-
но

* (*) V. Haller de motu cordis a stimulo nato. in Commentar. Soc. Scient. Goettingens. Tom. 1.

но, либо приведено въ великую слабость и учинено немощнымъ къ опправленію своихъ движеній, далеко уклоняешся отъ обыкновенной снечи дѣйствія и движенія своего; да и другія чуждыя шѣла, каковъ на пр. есть воздухъ и прочая, ежели ихъ впустишь въ жилы недавно умершаго какого либо животнаго, могутъ опять возбудить погасшую жизненность сердца.

§. 120. Впрочемъ происходили и при томъ въ недавнія времена споры о томъ, въ самыхъ ли мясныхъ волокнахъ сердца чрезвычайная она находится раздражительность, или должно производить ее отъ посторонней силы, и во первыхъ, какъ думаютъ нѣкоторые славные мужи, отъ впечатенія въ нихъ чувственножильной влаги? Мѣсто говорить о семъ будемъ тогда, когда дойдемъ до изложенія раздражительности мышечъ, куды она ближайше принадлежитъ. А теперь довольно упомянуть о томъ, что съ одной стороны повседневные опыты свидѣтельствуютъ, что раздражительность есть особенной видъ жизненной силы, единственно мышечнымъ волокнамъ свойственный, и который отъ чув-

ественножильной силы совсѣмъ отличать должно (§. 44-45); съ другой несомнѣннымъ кажется бытъ то, что кромѣ раздражительности весьма много имѣющъ дѣйствія надъ сердцемъ и чувствительныя жилы; что какъ особый видъ чувствительныхъ сердечныхъ жилъ, ихъ мягкость и такъ сказать нагость, и особенное разположеніе ихъ сплетеній (*), такъ и великое сердца съ весьма многими и совсѣмъ различными оппавленіями человѣческаго шѣла согласіе довольно подтверждаетъ; къ поясненію чего довольно представимъ въ примѣрѣ для краткости слога какъ возмущеній душевныхъ даже въ самомъ здоровомъ чловѣкѣ, такъ и расстройки пище-проходныхъ дорогъ во многихъ родахъ поврежденнаго здравія мгновенное согласіе съ сердцемъ.

§. 121.

(*) Cf. praeceptoris mei in disciplina anatomica, desideratissimi, pientissimi, Jo. Ern. Neubaveri descriptio nervor. cardiacorum Jen. 1772. 4. Tab. 1.

V. Haller. ad figuram cordis lateris sinistr. Anderschii discipuli sui diuinatio. in nov. Commentar. Soc. Scient. Goettingens. Tom. II. Tab. II. pag. 1.

§. 121. Кромѣ сихъ жизненныхъ силъ сердца, находится еще и другая, опъ художественнаго его спроенiя произходящая, которая повидимому также не мало споспѣшествуетъ къ сохраненiю надлежащаго кругообращенiя крови. То есть, когда впадины сердца во время его сжатiя спѣснятсѣ, и находящуюся въ нихъ кровь вышѣснятъ вонъ; то въ то время происходитъ пустое мѣсто, въ которое по общему пустотѣ или опводовъ закону (*derivationis lege*), кровь, вблизи находящаяся, должна вступишь и заняшь оное; ибо когда обратному возвращенiю крови мѣшаютъ заслоночки, въ нихъ находящiяся; то въ семъ случаѣ ничего не остается для нихъ, какъ только приходящую къ нимъ чрезъ крововозвратныя жилы кровь въ себя приниматъ. (*)

§. 122. Теперь потребно изслѣдовать, обрѣтаются ли кромѣ сердца еще и другiя, и припомъ какими снабженныя силами, орудiя, кои не мало также споспѣшествуютъ къ кругообратному печенiю крови? О каковыхъ, какъ по разуму дога-

И 2

ды-

(*) Andr. Willson's Enquiry into the moving powers employed in the circulation of the blood. Lond. 1774 8 pag 35 fq.

дываться, когда кажется не имовѣр-
нымъ быть то, чтобы природа со-
вершенство того крайняго оппавленія,
спѣ котораго самоближайше зависить
вся жизнь кровеносныхъ живошныхъ,
одному нокмо препоручила орудію, коего
поврежденіе весьма легко и удобно мог-
ло бы быть для нихъ пагубнымъ; такъ и
по опытамъ заключаешь можно, что тако-
выя силы дѣйствительна находятся въ
пѣлѣ, кои можно безошибочно называть
вторичными силами, и кои дѣйствіе
сердца либо облегчаютъ, либо и совершен-
но занимають иногда могутъ. Ибо
не мало таковыхъ частей находится въ
пѣлѣ, до коихъ силы сердца едва до-
стигаютъ могутъ, или и вовсе не дости-
гаютъ, каковое кровообращеніе находит-
ся въ печеночныхъ крововозвратныхъ жи-
лахъ, дѣтскомъ мѣстѣ (placenta) и въ
маткѣ, не упоминая уже о многочислен-
ныхъ примѣрахъ такихъ рожденных на
свѣтѣ младенцевъ, въ коихъ никакихъ
слѣдовъ сердца не обрѣшалось (*).

ф. 123.

(*) Cf. V. c. Car. Wern. Curtius de monstro
humano cum infante gemello LB. 1762. 4.
Pag. 89. sq. fig. 4. et pluribus v. Haller opera
minora Tom. III. p. 33. item. Gu. Cowper in
philos. Transact. Vol. LXV. pag. 316.

§. 123. Къ таковымъ силамъ кажется первоначально принадлежишь дѣйствіе бѣгущихъ жилъ и довольное къ споспѣшествованію печенія крови могущество оныхъ, хотя впрочемъ и невозможно надлежаше опредѣлять причины и способа ихъ дѣйствія.

Истинну сію доказываетъ немалое сходство, между бѣгущимися жилами и сердцемъ находящееся, когда каждому довольно извѣстно, что онъ подобно сердцу изъ мышечныхъ (§. 72.)-составленны оболочекъ.

Кромѣ сего изъ опытовъ славнаго Вершуйра открывается (*), что онъ имѣютъ и раздражительность; и какъ сердце имѣетъ много особенныхъ чувствительныхъ жилъ, сердечными обыкновенно называемыхъ (*perui cardiaci*); такъ и вездѣ въ тѣлѣ (**), а наипаче большія отпра-

И 3

сли

(*) Gualth. Verichuir de arteriar. et venar. vi irritabili eiusque in vasis excessu, et inde sangvinis directione abnormi. Groning. 1766. 4.

(**) Cf. v. c. in cl. Walteri Tabulis nervor. thorac. et abdominis hepaticam dextram. Tab. II. O. Tab. III. 1. — lienalem Tab. II. P. Tab. III. T. Tab. IV. O. — mesentericam superiorem Tab. II Q. Tab. III. S. — mesen-

сли бѣющихся жилъ удивительными мягкихъ чувствительныхъ жилъ съпчашыми переплешеніями (*) окружаются.

§. 124. Наконецъ извѣстно, что бѣющіяся жилы имѣютъ и ударенія и припомъ такъ сильныя, что бѣеніе чашковой бѣющейся жилы (*arteria subperitonea*), ежели положить одну ногу на колѣно другой, не шокмо ногу оную, но и гораздо еще большую тяжесть вмѣстѣ съ оною бѣеніемъ своимъ поднимають можешъ; кромѣ сего давно уже приписывается боевымъ жиламъ сжиманіе и разширеніе, кои по утвержденію сочинителей соотвѣшственны бывающъ сжиманіямъ и разширеніямъ сердца.

Послѣднее какое явленіе хопя самыи чувствами подтверждается; однакожъ не одному еще подвержено оно сомнѣнію, (**) наипаче, ежели спрашивается, собственной ли силъ бѣющихся жилъ ихъ сверканіе, которое ощущаемъ пальцами, при-

tericam inferiorem Tab. II. T. — aliasque plures.

(*) Haller de nervor. in arterias imperio. Goetting. 1744. 4.

(**) Th. Kipkland's Inquiry into the present state of medical Surgery. Lond. 1783. 8 Vol. I. Pag. 306. sq.

приписывать должно, или одному дѣйствию сердца, такъ что все движеніе каждой бѣющейся жилы зависитъ единственно отъ того стремленія, съ какимъ кровь въ аорту или начальную боевую жилу (aorta) изъ сердца выбрасывается и ея бока расширяетъ.

Къ рѣшенію каковаго спора разсѣченія живыхъ тѣлъ кажутся бытъ недовольными. Ибо часто случается, что при разсѣченіи живыхъ, теплую кровь имѣющихъ, животныхъ, большія бѣющіяся жилы иногда оказываются бѣющимися, а иногда, что и часто случается, совсѣмъ недвижимыми представляются (*). Сверхъ сего случилось однажды примѣнить и въ самомъ живомъ человѣкѣ, что какъ начальной, такъ и легочной бѣющихся жилъ пни, близкіе къ сердцу, никакого не имѣли движенія; что однакожъ, сказать должно, примѣчено было въ жилахъ, противъ природы устроенныхъ. Кромѣ сего находясь и такія бѣющіяся жилы, коихъ сильныя ударенія ощущаемъ, и кои однакожъ, какъ открывается изъ науки раздроблять тѣла или Анапоміи, суть, да и

И 4

быть

(*) Cl. De Lamvre recherches sur la cause de la pulsation des arteres &c. Monspel. 1769. 8.

быть должны почти недвижимы; какъ-
вѣя суть сонныя мозговья бѣющіяся жи-
лы, въ каналахъ каменистыхъ височ-
ныхъ костей лежащія, и такъ далѣе.

§. 125. Но ежели все сѣе подробно
разсмотримъ; то окажется, что раз-
жатіе большимъ бѣющимся жиламъ по
самой природѣ приличествуетъ, кото-
раго разжатія причину приписывать дол-
жно крови, со стремленіемъ въ нихъ
вливающейся и разширяющей (*) ихъ обо-
лочки, кои потомъ мгновенно приходятъ
опять въ естественное положеніе; и что
самое даже боковой ихъ оси движеніе по-
бужденію же крови приписывать должно,
которое движеніе въ большихъ бѣющихся
жилахъ, когда онѣ излучисто прости-
раются, и въ слабой клѣпчатой плевѣ
закрывающіяся, иногда примѣшны можно.

Чтожъ принадлежитъ до ихъ
сжиманія; то я думаю, что онѣ по
естественной своей толстотѣ въ здо-
ровомъ состояніи тѣснѣе едва сжи-
маться могутъ, но какихъ то есть
поръ

(*) Cl. Arthaud Diff. sur la dilatation des arte-
res Par. 1771. 8.

Cl. Jadelot Mem. sur la cause de la pulsa-
tion des arteres. Nancej. cod. 8.

порѣ сердце въ состояніи отправлять свои дѣйствія; не отвергая впрочемъ того, что онѣ имѣютъ такую способность тогда, когда сердца не находится, либо когда оно окостенѣетъ, или другою какою либо болѣзнію спадать будетъ, въ какое время онѣ пособляютъ дѣйствию онаго и повидимому жизненными силами своими прогоняютъ и въ движеніе приводятъ кровь.

§. 126. А какъ съ теченіемъ времени нѣкоторые славные естествословы, а наипаче Випшъ (*), удостовѣрились въ томъ, что силы сердца до самыхъ мѣлчайшихъ, несущихъ кровь, сосудовъ, то есть до концевъ бѣющихся, и началъ крововозвратныхъ жилъ, никакъ достигать не могутъ; то приписали движеніе и обращеніе крови въ тѣхъ мѣстахъ нѣкому сосудовъ колебанію или дрожанію (*oscillatio*), помощію котораго содержимыя въ нихъ жидкости прогоняются; какое колебаніе или дрожаніе не безуспѣшно употребляли они и къ доказатель-

И 5

ству

(*) Cf. Fj. physiological Essays, containing an inquiry into the causes, which promote the circulation of the fluids in the very small vessels of animals &c. &c. ed. 2. Edinb. 1761. 12.

ству свойства возпаленія (inflammatio).

И въ самомъ дѣлѣ не мало находится какъ физіологическихъ, о копорыхъ сказано будетъ въ Ошдѣленіи о шеплошѣ живопныхъ, такъ и паеологическихъ явленій, каковыя на пр. суть лихорадочныя приспупы (ragoхуismus), кои кажется немало подптверждають такую ихъ шрасущуюся способность, хотя впрочемъ простыми глазами при разсѣченіи живыхъ тѣлъ усмошрѣть ее и не возможно.

§. 127. Теперь оспаешся излѣдовашь кромѣ корней и происхожденія крововозврапныхъ жилъ еще и шѣ средства, коими онѣ снабжены для обрапнаго ошнашиванія крови къ сердцу. И кажется съ перваго взгляду явствуешь, что онѣ имѣють гораздо меньшую дѣятельность, нежели другіе кровеносные сосуды, да и самое оное обратное къ сердцу шеченіе жизненныя, въ нихъ содержимыя, влаги по большей части спремленію, позади идущей въ боевыхъ жилахъ крови и ихъ снабженному заслоночками спроенію приписывать должно; когда дѣйствіе такихъ заслоночекъ къ споспѣшествованію шеченія крови довольно подптверждаютъ за-

заслонъ въ тѣхъ чревныхъ крововозвратныхъ жилахъ, въ коихъ не находится заслоночекъ (*).

Однакожъ вѣроятнымъ кажется бытъ то, что и крововозвратныхъ сосудовъ ни имѣютъ нѣкоторыя жизненныя силы, какъ то ясно открывается изъ примѣровъ крововозвратныхъ жилъ печени и дѣтскаго мѣста въ маткѣ (§. 122.).

Кромѣ сего, какъ всякому небезвѣстно, доказывающъ жизненную силу, въ крововозвратныхъ жилахъ находящуюся, и тѣ опыты, кои надъ ними первый кажется учинилъ славный Вершуйръ.

Да и выше сего упомянуто было (§. 84.), что ни крововозвратныхъ жилъ изъ мышечныхъ состоятъ слоевъ, почему и не могутъ не дѣйствовать подобно мышечнымъ частямъ тѣла.

§. 128. И сѣи-то суть первѣйшія силы, въ движеніе кровь приводящія, кои отъ самаго строенія сосудовъ производятъ, не упоминая уже о тяжести, притягиваніи и другихъ таковыхъ, всѣмъ

(*) G. E. Stahl. de vena portae porta malorum. Halae 1698. 4.

всѣмъ шѣламъ общимъ, свойствахъ, кои надъ оною дѣйствовать могутъ, и не говоря о шѣхъ дальнѣйшихъ пособіяхъ, кои человекъ можетъ получать какъ и дѣйствительно получаетъ отъ другихъ состава своего дѣйствій; какъ то: дыханія, шѣлодвиженія и такъ далѣе.



ОТДѢЛЕНІЕ XI.

О дыханіи, и его главнѣйшемъ употребленіи (*de respiratione ejusque usu primario*).

§. 129. Легкія, весьма шѣсно съ сердцемъ соединенныя, какъ въ разсужденіи близкости мѣста (*), такъ и взаимнаго союза въ оппращеніи ихъ дѣйствій, суть не что иное, какъ двѣ внутренности въ человекѣ, рожденномъ на свѣтъ, довольно простиранныя, но взглядомъ ихъ величины такъ легкія, что плаваютъ поверхъ воды, будучи брошены въ оную; кои состоятъ изъ губчатого и какъ бы пузырчатого, однакоже весьма крѣпкаго состава (*parenchima* **).

§. 130.

(*) Eustachii tab. XV. fig. 1 — 6.

(**) Первый Малпигій подробно описалъ свойство легкихъ въ 2 письмахъ, писан-

§. 130. Они наполняютъ объ пусто-
шы грудныя, будучи смѣжны (*) шѣмъ
мѣ-

санныхъ имъ о нихъ къ Бореллю. (Utor
editione subiecta Th. Bartholini de pulmonum
substantia et motu diatr. Hârn. 1663. 4.)

Brenem horum viscerum potitiam ex bonis
fontibus collegit cl. G. Fr. Hildebrandt diff. de
pulmonibus Goett. 1783. 4.

(*) Славная сія побѣда, одержанная Гал-
леромъ, а нанпаче отъ 1744 по 52 годъ
надъ Гамбергеромъ, съ достопамятною
упорностію защищавшимъ какъ упругій
воздухъ, во впадинѣ грудной, такъ и
противодѣйствіе обоого рода между ре-
берныхъ мышцъ. Желаящіе знать про сей
споръ, могутъ смотрѣть:

G. Erh. Hambergeri de respirationis mecha-
nismo et vsu genuino diff. vna cum scriptis,
quae ad controversiam de mechanismo illo agi-
tatam pertinent. Jen. 1748. 4.

Haller Mem. sur plusieurs phenomenes im-
portans de la respiration, fonde sur les experi-
ences; ad calcem operis sur la formation du
coeur dans le poulet &c. Laus. 1758. 12.
Vol. II. Pag. 201 — 364.

C. F. T. (cl. Trendelenburg. patr.) conti-
nuatio controuersiae de mechanismo respiratio-
nis Habbergeriano &c. Goett. 1749. 4.

U. fernere Fortsetzung der Halerischen und
Hambergerischen Streitigkeiten vom Athemholen.
Rossloch. 1752. 4.

Rela-

мѣшкамъ подреберной плевры, въ коихъ они заключающа, и къ коихъ виду, равно какъ и къ положенію другихъ частей, въ груди содержимыхъ, такъ какъ бы къ нѣкоторому образцу приспособляюща и принаразливающа.

§. 131. Они висятъ какъ бы на нѣкоторой духовой трубкѣ, вообще жесткою или проводящею въ легкія воздухъ жилою именуемой, которая кромѣ внутренней плевры, склизью умащенной, и лежащей подъ оною, чувствительно-жилыю весьма чувствительной оболочки, состоятъ еще изъ мышечной, чувствительно-жилыю облекающей, и наконецъ, выключая заднюю сторону, изъ хрящевыхъ, видъ серпа имѣющихъ, неопредѣленнаго числа колецъ.

§. 132. Самая же сія жесткая жила или духодвижная труба (*aërea arteria*), при низхожденіи своемъ въ грудь, сперва раздѣляетъ на два пня духодвижныхъ каналовъ, а сіи, чемъ глубже и далѣе вселяюща въ легкія и ихъ доли, шѣмъ больше и больше на вѣтви, а вѣтви пере-

перемѣняются на вѣпочпи при непрерывномъ изчезаніи какъ хрящевыхъ колечекъ, такъ и мышечной плевы до шѣхъ поръ, пока на концѣ кончиками своими превращаясь въ шѣ клѣпочки, кои самую большую и самую главнѣйшую часть толщи легочной составляютъ; кои вдыхаемый нами воздухъ по перемѣнно то въ себя вбираютъ, то опять выпускаютъ оный.

§. 133. Впрочемъ воздушныя оныя клѣпочки ни виду, ни величины (*) не имѣютъ одинаковыхъ. Вообще же ихъ видъ и начертаніе поставляется многоугольное, которое, ежели возрѣть на обширность ихъ поверхности, едва опредѣлить можно (**); а ежели посмотрѣть на ихъ внутреннее пространство, то оно въ легкихъ возрастнаго человѣка, сильно воздухъ въ себя вбирающаго, почти до бо-
ку-

(*) Кейль, полагаясь больше надлежащаго на свой умъ и свои медикоматематическія выкладки полагалъ таковыхъ клѣпочекъ въ обѣихъ доляхъ легкаго болѣе 1,744,000,000.

(**) Либеркинъ поверхность воздушныхъ легочныхъ клѣпочекъ поставлялъ равною 1500 квадратнымъ фунамъ также съ излишнимъ увеличеніемъ.

кубическихъ унцій простирается; ибо величина она, до которой надутыя легкія при вскрытіи груди возвышались могущь, не принадлежишь къ сему мѣсту.

§ 134. Окружаются и взаимно совокупляются воздухоносныя легкихъ пещерки обыкновенною одною, однакожь весьма нѣжною клѣпчатною плевою, о которой сказано выше, что она всего шѣла связь составляетъ. Впрочемъ надлежишь порядочно ошлечать воздушныя пещерки отъ клѣпочекъ такъ называемыхъ клѣпчатой плевы. Ибо я видѣлъ, что оныя воздухоносныя клѣпочки или пещеры въ здоровыхъ и весьма свѣжихъ легкихъ, одна отъ другой такъ отдѣляются, что воздухъ, въ самую мѣлкую духодвижныхъ каналовъ вѣточку съ осторожностію вдохнутый, одно токмо особое клѣпочекъ оныхъ мѣсто подыалъ, а въ ближнія клѣпочки или въ оную клѣпчатую плеву, ихъ соединяющую, никакъ не проникнулъ. Ежели же сильнѣе понудить воздухъ, то онъ по распорженіи воздушныхъ пещерокъ и смѣшеніи ихъ съ окружающею клѣпчатопузырчатую плевою, удобно проходитъ въ клѣпчатую оболочку, и бываетъ кричиною, что

что въ то время легкія вездѣ раздуты-
ми предспавляющся.

§. 135. Поверхъ самой же сей клѣп-
чатой плевры, между воздушными легоч-
ными пузырьками находящейся, распро-
стирается безчисленное множество ве-
сточекъ обоого рода кровяныхъ легочныхъ
сосудовъ, то есть: вѣтви легочной бѣс-
щейся жилы (— Таб. 1. ф. g. h. —)
и опрасли четырехъ крововозвратныхъ
(Таб. 1. — 1. —) жилъ, кои вѣточки
и опрасли соупствуютъ вѣтвямъ воз-
духоносныхъ трубъ (*), и кои по много-
кратномъ раздѣленіи, превращаются на-
конецъ въ неисчетныя, сѣтямъ подоб-
ныя, самопощайшія соустья (анастомо-
ses); оныя же удивленія достойныя сѣ-
точки и сплешенія кровеносныхъ сосу-
довъ, по клѣпчатой оной перепонкѣ вез-
дѣ распротертыхъ, тѣсно объемающъ
воздушные пузырьки такъ, что все оное
количество крови, которое непрерывною
пропою чрезъ помянутыя проходитъ со-
судцы, опъ прикосновенія воздуха, вды-
хаемаго въ легкія, весьма тонкими пере-
поночками отдѣляется, про которыя го-
ворилъ Галесъ, что онѣ толстотою

(*) Eustachii Tab. XXVI. fig. 13.

своею едва тысячной части дюйма равняться могутъ.

§. 136. Но какъ выше видѣли мы (§. 134.), что каждая вѣточка воздухоносныхъ каналовъ имѣетъ какъ бы нѣкопорый, одной ей собственный, гроздь или кисть воздушныхъ пещерокъ, такъ кажется, что и всякаго грозда или кисточки каждая пещерка какъ бы особливую ей только собственную кровеносныхъ сосудовъ имѣетъ связь, отразли коея связи хотя и соединяются въ удивительныхъ оныхъ сѣточкахъ; однакожъ по видимому съ сосудцами ближнихъ имѣ. клѣпочекъ не имѣютъ никакого взаимнообразнаго соединенія. Каковой истиннѣ, ежели не ошибаюсь, научаютъ насъ какъ учиненныя посредствомъ увеличительныхъ стеколъ надъ легкими жабъ и живыхъ змѣевъ наблюденія, такъ и тончайшія человѣческихъ легкихъ наливанія, равно какъ и тѣ болѣзненныя явленія, кои видѣть можно въ легочныхъ волдыряхъ (*comica*) и другихъ, симъ подобныхъ, мѣсныхъ легкаго порчахъ.

§. 137. На конецъ остается упомянуть о великомъ множествѣ пасочныхъ сосудовъ, (*vafa lymphatica*), коихъ покрывающая оболочка, съ легкими имѣ общая, есть боль-

большую частью клапчатая, и къ коимъ многочисленныя принадлежатъ шаровидныя млечныя железы (*glandulae lymphaticae f. conglobatae*), коихъ опъ другаго рода желѣзъ; железами воздуходвижныхъ каналовъ именуемыхъ, съ коими ихъ безъ всякой основательности смѣшиваютъ, весьма хорошо опдѣлять должно. (*)

§. 138. Грудь (*thorax*), въ коей содержащіяся легкія, утверждена на костянохрящевомъ, нѣкоторымъ образомъ пшичей клапкѣ подобномъ, основаніи, которае хотя вообще довольно есть твердо и почти неколебимо, однако такъ устроено, что многія части, грудь составляющія, будучи подвижны и удобопреклонны, бывающъ способны къ опправленію ихъ дѣйствій и движеній, кои необходимы къ дыханію (**).

I 2

Наи-

(*) Cf. cl. Portal in *Mem. de l'Ac. des Scienc. de Paris*. 1780.

(**) На стоящее устройство и движеніе груди прежде всѣхъ подробнѣе изслѣдовали въ прошедшемъ вѣкѣ:

Ив. Шваммердамъ, *Tract. de respiratione vltima pulmonum*. LB. 1677. 8.

Наипаче же таковое движеніе имѣ-
ющѣ шестѣ парѣ ребрѣ, истинными на-
зываемыхѣ, кои высшей парѣ ребрѣ под-
верженны, и кои шѣмѣ подвижимѣе быва-
ющѣ, чѣмѣ ниже находящіяся, или чѣмѣ
длиннѣе бывающѣ какѣ самыя ихѣ шѣла,
такѣ и ихѣ хрящевыя прицѣпочки, по-
мощію которыхѣ въ видѣ наружнаго
членосоединенія совокупляющіяся онѣ съ
обѣихѣ сторонѣ съ краями грудинной
кости (sternum).

§. 139. Промежѣ краевѣ сихѣ ребрѣ
находится двоякій слой между ребрен-
ныхѣ мышцѣ, коихѣ мясныя жилочки
хотѣя

Ив. Маѣовѣ, коего похвалы ниже
сего изчислены будущѣ. *Tract. de respiratione*
&c. Ожоп. 1668. 8.

Малахія Трусмонѣ. *de respirationis usu*
primario. Lond. 1676. 8.

Halleri de eo capite merita modo tetigimus.

Изѣ новѣйшихѣ наипаче заслуживающѣ
упоминовенія cl J. G. Amstein (praes. Oetinger)
de usu et actione musc. intercostalium.
Tubing. 1769. 4.

Cl. Theod. Fr. Trendelenburg, fil. *de sterni*
costarumque in respiratione vera genuinaque
motus ratione. Goetting. 1779. 4.

Bordenave et cl. Sabatier in *Mem. de l'*
Acad. des Scienc. de Paris a. 1779.

хотя различное имѣющъ положеніе или направленіе (*directio*); однако одно и то же имѣющъ дѣйствіе.

Подъ основаніемъ всея грудныя полости проведена поперегъ на подобіе свода перепонка, грудобрюшную преградою называемая (*diaphragma*) (*), которая есть не что иное, какъ большая, замѣчанія достойнѣйшая, мышца, и которая, какъ съ Галлеромъ сказано, по сердцу есть первая, коея участіе въ удивительномъ отпращиваніи дыханія, какъ то давно уже доказалъ Галенъ посредствомъ пластанія живыхъ шѣлъ (**), по большей, какъ кажется, части зависящъ отъ преградогрудобрюшныхъ чувствительныхъ жилъ (*nervi phrenici*) (***).

I 3

Пре-

(*) *Haller de musculis diaphragmatis. Bern. 1733. Id. Icon anatom. fascic. I. Tab. 1.*

B. S. Albini Tab. muscutor. Tab. XIV. fig. 5. 6. 7.

I. S. Röderer de arcibus tendineis muscutor. progr. 1. Goetting. 1760. 4.

Santorini Tab. posth. X. fig. 1.

(**) *De anatomicis administrationibus L. VIII. Cap. 8. sed totus liber ad respirationem spectantium experimentorum ditissimus est.*

(***) *Ephr. Krüger de nervo phrenico Lips. 1759. recens. in cl. Sandifort thesauro Tom. III.*

Cl.

Преграда она дѣйствуетъ пропиво-
стоятельнымъ образомъ съ чревными
мышцами, а наипаче съ косвенными и
поперекъ проведенными (*transversi musculi*).

§. 140. Такимъ образомъ устроен-
ная грудь въ живомъ человѣкѣ, полу-
чившемъ дыханіе то расширяется, при
вдыханіи воздуха, то опять сжимается
при воспослѣдовавшемъ издыханіи онаго.

И въпервыхъ при вдыханіи воздуха
въ легкое расширяется она въ стороны
и въ низъ такъ, что средины выше-
помянутыхъ (§. 138.) ребръ поднимают-
ся въ верхъ, а нижніе ихъ края выда-
ются наружу; сводъ же грудобрюшной
перепонки, подаваясь нѣкошорымъ обра-
зомъ внизъ, становится ровнѣе.

Чтожъ касается до утвержденій, яко
бы грудная кость въ тоже самое время,
когда вбирается воздухъ въ легкія, ниж-
нею частію своею подавалась напередъ; то
скажу чистосердечно, что при покойномъ
здороваго человѣка дыханіи никогда не
могъ я того примѣнить.

§. 141.

§. 141. Таковое перемѣнное груди движеніе въ здоровомъ и свободно дышущемъ человѣкѣ отъ самаго его рожденія на свѣтъ, даже до послѣдняго издыханія продолжается съ тѣмъ, чтобы и самыя легкія подобнымъ образомъ то разширяясь для вбиранія въ себя воздуха, то опять сжимаются для издохновенія онаго въ состояніи были.

§. 142. Ибо человѣкъ, равно какъ и прочія, горячую кровь имѣющія животныя, такъ есть разположенъ, что вдохнушаго внутрь воздуха долго держать въ себѣ не можеть, но принужденъ опять испускать оный, и съ новымъ почерпаніемъ сея жизненной пищи (такимъ именемъ воздухъ изъ самыхъ древнихъ временъ назывался (*)), перемѣнять старое.

(*) Сколь давнее есть воздуха, такъ какъ жизненной пищи, свѣдѣніе, сіе открывается даже изъ одной книги о вѣтрахъ (Libr. de flatibus), которая щипается между Гиппократовыми, и которая сочинитель проякую пищу человѣческаго тѣла поставляеть: то есть: свѣдь, пишіе и воздухъ; воздухъ же для того онъ такъ какъ жизненную пищу отъ прочихъ отдѣляетъ, что безъ онаго ни самаго малѣйшаго времени безъ опасности жизни пробыть не можемъ.

рое. Ибо изъ самаго просвѣдѣннаго открываешся наблюденія, что со вдохнувшимъ въ легкія воздухомъ и въ нихъ содержимымъ, хотя бы онъ былъ самая чистая снѣжкѣя, въ скоромъ времени такія достопамятныя случающіяся перемѣны, что онъ, ежели его не возобновлять новымъ вдохнувшимъ воздухомъ, учиняется къ дыханію (*) совсѣмъ неспособнымъ.

§. 143. Спрашивается же, какія бы были тѣ перемѣны, которыя претерпѣваетъ воздухъ, вдохнутый въ легкія, и кои не изъ лишенія какой-то, не знаю, упругости, какъ нѣкогда думали, но изъ разрушенія самыхъ его началъ производить должны. Ибо атмосферическій или окружающій насъ воздухъ, коимъ мы всегда дышемъ, есть

под-

(*) Cf. magni Harv. de succi alibilis aërei necessaria renovatione, cum celebri Astronomiae Prof. Jo. Greaves disputationem, in huius Description of the pyramids in Aegypt. pag. 101 fq. ed. Lond. 1646. 8.

Item immortalis eius popularis Edm. Halley Discourse concerning the means of furnishing air at the Bottom of the Sea in any ordinary Depths. in Philos. Transact. Vol. XXIX. No. 349. Pag. 492. 1b.

подлинно удивительное различного рода стихій смѣшеніе, когда онѣ, не упоминая о таковыхъ чуждыхъ и постороннихъ началахъ, каковыя на пр. суть: носящіяся по воздуху расшительныя сѣмяна, благо или зловонныя разныхъ шѣлъ истеченія, пыль и пысячи разныхъ шѣлъ, въ атмосферахъ плавающихъ, всегда обремененѣ бываетъ разнымъ количествомъ какъ водяныхъ паровъ, такъ электрическимъ и магнитнымъ веществомъ, который, хотя бы и всѣ сїи отнять отъ него веши, опять однакожъ не изъ одного какого либо начала состоятъ будеть, но вкупѣ изъ многихъ, а особливо въ нынѣшнія времена предъ прочими извѣстнѣйшихъ, какъ то: дефлогистированнаго или лишеннаго горючести, далѣе горячаго, и на конецъ твердаго существа, (*substantia dephlogisticata, phlogisticata et fixa*).

Количество сихъ началъ судя по различію мѣстѣ и шѣлъ, а наипаче членоустроенныхъ или ограническихъ, въ нихъ находящихся, премного различно бываетъ; вообще же поставляется, что въ атмосферическомъ воздухѣ дефлогистирован-

К

наго

наго почти $\frac{1}{4}$, флогистического $\frac{11}{16}$, а твердаго $\frac{1}{16}$ (*) доля находится.

§. 144. Известно же, что при всякомъ вдыханіи, за которымъ возрастный и свободно дышущій человекъ почти около 30 кубическихъ дюймовъ воздуха въ себя вбираетъ, четвертая она доля лишеннаго горючести воздуха разрушается и большею частію въ флогистическій и твердый перемѣняется такъ, что изпущенный опять изъ легкихъ воздухъ, будучи надлежаще пойманъ сосудомъ, пламя или горящій уголь, въ него положенный, въ самомъ скоромъ времени погашаетъ, известъ изъ ея воды осаждаетъ на дно, тяжестію же своею атмосферическій воздухъ пре-

(*) Твердый и горючій воздухъ кажется однимъ степенемъ различествующъ между собою. Славный Кирванъ оба вида сѣи почипаетъ за лишенный горючаго вещества воздухъ, который, будучи исполненъ горючестію, учиняется твердымъ, и ежели оною совершенно исполненъ будетъ, то учиняется горючимъ. А что сѣе раздѣленіе есть вѣроятное, сѣе узналъ я изъ опытовъ даже одного Лихтенберга, сотрудника моего и друга, кои весьма хорошо соотвѣщаютъ оному.

превышаетъ и другія симъ подобныя явленія производитъ (*).

К 2

§. 145.

(*) Чтобы узнать, сколь долго животное извѣстное количество какого либо вида воздуха можетъ въ себя вбирать, пока на конецъ сдѣлается онъ для него смертельнымъ, но я избралъ трехъ собакъ породы одинаковой величины и крѣпости, изъ коихъ первому привязалъ я пузырь, около 20 кубическихъ дюймовъ чистаго, лишеннаго то есть горючести, воздуха въ себѣ содержавшій, посредствомъ шпубки, въ разрѣзанное дыхательное горло вложенной, которая собака по прошествіи 14 минутъ издохла.

По семъ другой привязалъ я тотъ же самый пузырь, атмосферическимъ воздухомъ наполненный, которая въ исходѣ шестой минуты издохла.

На конецъ третьей собаке привязалъ я тотъ же самый пузырь, наполненный горючимъ издохновеніемъ первой собаки, отъ чего собака сія въ чешыре минуты погибла.

Такимъ образомъ флогистическій воздухъ, будучи впушенъ изъ пузыря въ артерійный сосудъ, оказывалъ явленія подобныя темъ, о коихъ я выше сего упомянулъ.

Описаніе и изображеніе орудій, кои я для учиненія таковыхъ опытовъ употреблялъ, здѣлалъ я въ Врачебной Библиотекѣ. Vol. I. pag. 174. fq. Tab. 1.

§. 145. Вѣроятно, что огненные части (*) лишеннаго загараемости воздуха, учинившись при разрушеніи его въ легкихъ свободными, вселяются въ боевожилъную кровь, и такимъ образомъ чрезъ все тѣло пропекаютъ, а основаніе напрошивъ того швердаго воздуха купъ съ загараемымъ веществомъ и кровью чрезъ кровоозвращныя жилы къ правой полоси сердца приносится, и чрезъ легкія какъ неопреѣнная матерія изъ тѣла извергается.

Живѣйшій цвѣтъ (**) въ боевыхъ, напрошивъ же того темнѣйшій въ крово-

роз-

(*) Великая часть изъ сихъ достопамятныхъ явленій, коими въ недавнія времена какъ физическое ученіе объ искусственныхъ воздухахъ, такъ и Естественное о дыханіи, споль много обогащены и пояснены, за сто уже и болѣе лѣтъ извѣстны были прозорливѣйшему Врачу Ивану Маіову, коего разсужденіе (*Tract. de fal - nitro et spiritu aëreo*, подъ какими словами разумѣлъ онъ обезгорюченный воздухъ), изданное 1674 г. въ Окс. съ великимъ удовольствіемъ я не однократно читалъ.

(**) Jo. Andr. Hammerschmidt de notabili discrimine inter sangvinem arteriosum et venosum. Goetting. 1753. 4.

возвратныхъ жилахъ содержимой крови, также сходство и подобіе тѣхъ цвѣтовъ, кои получаютъ кровь, ежели ее поставишь въ тѣ виды воздуха (§. 16.), о коихъ выше упомянуто, здѣсь сказываемое мною премного подтверждающъ.

§. 146. Далѣе во всякомъ зародышѣ какъ въ бѣющихся, такъ и крововозвратныхъ жилахъ содержаемая кровь никакого различія не имѣетъ, такъ какъ въ чловѣкѣ, рожденномъ на свѣтѣ и питающемся воздухомъ; пошому что зародышъ, въ утробѣ находящійся, еще не получилъ дыханія и не почерпнулъ въ себя изъ воздуха огненныхъ началъ.

А когда рождается младенецъ на свѣтѣ, то кажется, что новое ощущение необычайной ему стихіи, въ копорую исходитъ сіе, до сихъ поръ водянымъ бывшее животное, и другія множайшія новыя поощренія подающъ ему случай къ новымъ тѣлодвиженіямъ, а наипаче разширенію груди и вбиранію въ легкія воздуха.

Послѣ каковаго легкихъ разширенія опъ вхожденія въ нихъ воздуха новый путь крови открывається, такъ что она, опторгнувшись опъ пупошныхъ сосудовъ, устремляется всею толщею (масса) своею къ груди.

Поелику же вдохнуый въ легкія воздухъ отъ разрушенія въ нихъ началъ своихъ вреднымъ, и для легкихъ не-
сноснымъ учиняется, для того при-
рода, отвращающая всѣ губительные
случаи, употребляетъ на то шакое
движеніе, посредствомъ котораго извер-
гаетъ она оную ядовитость воздуха,
въ легкихъ учинившуюся, и перемѣняетъ
ее на новую животворную пищу.

Что все, наипаче, ежели принять
въ разсужденіе то, сколь много дыханіе
способствуетъ къ кругошеченію крови,
каковое способствованіе весьма ясно
доказалъ онымъ обыкновеннымъ опытомъ
Тукъ (*), кажется гораздо лучше по-
ясняетъ славное оное Гарвеево пред-
ложеніе (**), до кругообращенія крови от-
носящееся, нежели всѣ прочія покушенія,
кои

(*) *Nomen tulit, quod maxime a Rob. Hooke
ornatum fuerit v. Th. Sprat. hist. of the royal
Society Lond. 1667. 4. pag. 232. Sed pridem
a Vesalio institutum et ob elegantiam valdope-
re commendatum est. de c. h. fabrica pag. 824.*

(**) *Gu. Harvey de circulat. sanguinis, ad Jo.
Riolanum. pag. 258. ed. Glasgov 1751. 1.*

*Et maxime Exerc. de gener. animal. pag.
263. ed. princ. Lond. 1651. 4.*

кои употребляли Физіологи для разрѣшенія сего достопамятнаго узла (*).



ОТДѢЛЕНІЕ XII.

О голосѣ и рѣчи (de voce et loquela.)

§. 147. О первомъ дѣйствіи дыханія уже разсуждаемо было. Но сколь много пособляетъ оно смѣшенію питательнаго сока съ кровію, и сколь много-различно споспѣшествуетъ къ отправленію дѣйствій естественныхъ (§. 63. и 1.), о томъ въ другомъ мѣстѣ сказано будетъ. А теперь приступаю я къ изложенію прочихъ его много-различныхъ пользъ.

И во первыхъ намѣренъ я говорить о *голосѣ* (de voce), который рожденному на свѣтѣ человѣку (***) естествен-но приличествуетъ, и который произ-

К 4

ХО-

(*) Conf. v. c. Petr. Jac. Daoustenc de respiratione Lugd. 1743. 4. pag. 54 sq.

Rob. Whytt on the vital. and other involuntary motions of pag. 222. ed. Edinb. 1751. 8°

(**) P. L. M. Maloet et Jac. Savary E. vt ceteris animalibus, ita homini sua vox peculiaris. Paris. 1757. 4.

ходишь отъ легкихъ , какъ уже давно утверждалъ оный основатель Философъ Аристотель , который никакихъ живопныхъ не называлъ гласными или словесными , развѣ кои дышатъ легкими. Подъ именемъ же голоса собственно разумѣется звонъ , помощію издыхаемаго изъ легкихъ воздуха въ верху дыхательнаго горла образуемый , который верхъ , или гортань , есть машина , весьма чудно устроенная , на верху духовнаго канала , такъ какъ нѣкоторая головка на столбѣ , утвержденная (*).

§. 148. Машина сія (ларинх) состоитъ изъ разныхъ хрящей , кои такъ какъ бы нѣкоторую сумочку составляющихъ (**), и кои великимъ количествомъ мышечъ , разнообразно распо-

(*) Fabr. Ab Aquapendente , de visione , voce et auditu. Patav. 1603. fol.

Julivs Cafferius Placentinus de vocis auditusque organis. Ferrar. 1600. fol.

Jan. Marc. Busch de mechanismo organi vocis huiusque functione. Groning. 1770. 8.

(**) Eustachii tab. XLII.

Morgagni adversar. anatom. prim. tab. II.

Santorini observat. anatom. tab. III. fig.

1. 2. 3.

ложённыхъ будучи снабжены (*), либо всѣ купно, либо судя по различію образованія голоса нѣкоторыя только изъ нихъ въ особенноти подвижны бывають.

§. 149. Первѣйшею и главнѣйшею къ совершенію голоса предъ прочими почитается такъ называемое горшаное откверзше (glottis), которое есть не что иное, какъ дыхательнаго горла зѣаніе, которое закрываетъ повѣшенный надъ нимъ надгорловой хрящикъ (epiglottis); ибо что выходящій изъ легкихъ воздухъ, ударяясь надлежащимъ образомъ о края сего устья, учиняется звонкимъ, и слѣдственно образуетъ голосъ, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

§. 150. О томъ только происходили споры, какія бы претерпѣвала перемѣны горшанъ для образованія голоса? то есть: раздается ли она, и по томъ опять спѣсняется и сжимается, какъ то думали Галенъ и Додаршъ; или паче зависить образованіе и различіе голоса отъ перемѣннаго то натягиванія, то послабленія ея связей, какъ утверждалъ Феррейнъ?

К 5

Изъ

(*) B. S. Atbini. Tab. musculor. Tab. X. fig. 1 - 15. Tab. XI. fig. 45 - 48. Tab. XII. ff. 1-7.

Изъ коихъ первый орудіе, голосъ совершающее, съ флейшами (*tibiae*), а послѣдній сравнивалъ со струнами (*fides*.)

Все что разобравши надлежащимъ образомъ, и сличивши вмѣстѣ, въроятнымъ почишаю я, что горшанъ, издающая голосъ, обѣ оныя претерпѣваетъ перемѣны, однакожъ такъ, что шѣ, кои производятъ ошѣ напряженія связей, а особливо низшихъ, щипочерпалообразные хрящи связывающихъ, (и кои по Феррейню составляютъ звонкія или гласныя струны (*chordae vocales*), кажется имѣющъ предъ прочими большее преимущество (*).

§. 151. А что все оное, какого бы рода ни было, движеніе горшани управляется многочисленными, къ ея головкѣ принадлежащими, мышками, сіе явствуетъ изъ того, любопытство наше привлекающаго, опыта, по-

МО-

(*) Experimenta de ea lite dirimenda, Goettingae instituta v. in cl. Jo. G. Runge diff. de voce eiusque organis LB. 1753. 4.

It. cf. Jos. Ballanti in Commentar. instituti Bonon. T. VI.

Et. cl. Vicq.-d' Azyr in Mem. de l'ac. de scienc. de Paris a. 1779.

мощію котораго, но еспѣ перевязавши или перерѣзавши либо вспяшь возвращающіся, либо и самыя скипающіся чувствительныя жилы (*vagus* *per* *pervagus*), голосъ животныхъ либо слабымъ учинишь, либо и со всѣмъ уничтожишь можно (*).

§. 152. Свистъ (*sibilus*) человѣку есть общій съ гласными и поющими шипцами, кои для сей самой причины имѣютъ горшанъ, на обѣ крайности духодвижной трубы раздѣленную. А человѣкъ хоща и одинакую имѣетъ горшанъ, однакожъ разнообразнымъ сжиманіемъ губъ животныхъ онымъ всегда подражать можешь (**).

§. 153.

(*) De celebri experimento, pridem a Galeno instituto. Cf. praeter alios

W. Courten in Philos. Transact. N. 335.

Morgagni ep. anat. XII. N. 20.

et maxime P. P. Molinelli in Commentar. instituti. Bonon. T. III.

(**) Что человѣческая горшанъ (*larynx*) есть весьма гибка и удобна къ переиманію и произношенію голосовъ животныхъ, сіе явспивуешь даже изъ одного примѣра самыхъ дикихъ народовъ. Cf. v. c. de Nouae Guineae orbis australis incolis, quos Parus vocant, Nic. Witsen Noord-en Oost-Tartarye ed. 2. Amst. 1705. Vol. I. pag. 165.

§. 153. Чшождь до пѣнїя (cantus), изъ рѣчи и согласнаго образованїя голоса произходящаго; то я скажу, что оно приличествуетъ одному токмо человѣку, и показываетъ, что человѣкъ предъ всѣми прочими животными касательно орудїи голоса большее имѣетъ преимущество; когда напротивъ того свистѣетъ природенъ птицамъ. Впрочемъ многїя изъ нихъ, а иногда и самыя собаки, научаются нѣкоторымъ образомъ произносить слова. О наспоющемъ же пѣнїи, то есть пѣли ли когда либо животныя подобно человѣку, я вовсе сомнѣваюсь, будучи удостовѣренъ въ томъ, что нѣтъ ни одного такого дикаго народа, который бы не имѣлъ обыкновенїя пѣть (*).

§. 154. Рѣчь (loquela) есть особенное голоса измѣненїе и разположенїе, какъ

(*) Подобныя увѣренїя на пр. объ Арапахъ, Гренландскихъ, Канадскихъ, Калифорнскихъ и Камчатскихъ жителей имѣю я отъ самыхъ достоверныхъ путешественниковъ такъ, что утвержденїя оныя Г. Руссая, якобы то есть пѣнїе не приличествуетъ онѣ природы человѣку, кажутся быть для меня чудными. Dictioner. de Musique Vol. I. pag. 170. ed. Genev. 1781. 12.

какъ помощію языка, такъ и самыхъ губъ, зубовъ, неба и носа образующее буквы.

Откуда явствуетъ, что голосъ отъ рѣчи великое различіе имѣетъ, когда голосъ совершается въ самой гортани, а рѣчь, исключая примѣры не многихъ людей (на примѣръ Китайцевъ, у коихъ буквы, какъ будто бы всѣ онѣ были одногласны и единознаменательны *sympliciter litterae*, различнымъ измѣненіемъ голоса различающся) особливымъ устройствомъ гласныхъ орудій изображается.

Далѣе голосъ человѣку со скотами есть общій, и приличенъ самому даже новорожденному младенцу, не исключая даже и тѣхъ несчастныхъ дѣтищъ, кои выросли между дикими звѣрями, и кои родились глухими на свѣтъ. Но рѣчь или слово на просвѣщеніи и употребленіи разума основывается, и слѣдственно сколько приличествуетъ оно человѣку, сколько и самой разумъ, и словесность человѣка составляетъ его преимущество предъ всѣми неразумными животными. Для скотовъ довольно одного только побужденія, изъ самаго ихъ естества произтекающаго; но человеку какъ сихъ, такъ и другихъ по-
собій

•обій лишенному, необходимыхъ къ поддержанію собственными трудами своей жизни, дано свыше еще преимущество разума и рѣчи съ шѣмъ, чтобы помощію оныхъ, обитая въ общежитіи, къ храненію котораго союза отъ самой природы предопредѣленъ онъ, находился въ состояніи открывать свои желанія и нужды, и шѣмъ помогать онымъ.

§. 155. Самое же оное подлинно чудное рѣчи и буквъ въ произношеніи художество послѣ знаменитыхъ опытовъ Франциска Меркуріяла де Гелмонша (*), спранныхъ подлинно нравовъ человека, больше еще дальнѣйшими изысканіями Ивана Виллизія (**), и Ивана же Амманна (***) объяснено и усовершенствовано.

Однако предъ прочими буквъ раздѣленіями Амманово кажется быть сходнѣе

(*) E.J. Alphabeti vere naturalis Hebraici delineatio Suiz. Bas. 1657. 12.

(**) E.J. Grammatica linguae Anglicanae, cui praefigitur de loquela f. sonorum omnium loquelarium formatione Tract. grammatico-physicus. utor ed. VI. Lond. 1765. 8. (ed. curante Th. Hollis)

(***) E.J. furdus loquens. Amst. 1692. 8. ed. princeps — auct. prodit f. t. diff. de loquela ib 1700. & al.

нѣе съ самую природою, который Амманъ раздѣлилъ всѣ буквы 1) на *гласныя*, 2) *полугласныя* и 3) *согласныя*.

Первыя то есть гласныя (*vocales litteræ*) раздѣлилъ онъ (*).

а) на *простыя* (*simplices*), коихъ есть шесть: а, е, і, о, и, у Греческое.

б) На *смѣшенныя* (*mixtæ*) или *двоегласныя*, кои пишущся такъ: æ, œ, и уе. ä ö и ѱ на Нѣмецкомъ.

Вторыя то есть *полугласныя* (*semivocales*) раздѣлилъ онъ

а) На *носовыя*, въ носъ то есть *выговариваемыя* (*nasales*), кои сущъ м, н, г.

б) *Устные*, ртомъ то есть *произносимыя* (*orales*), кои онъ еще и *язычными* называеиъ (*linguales*), каковы сущъ г, и л.

Послѣднія, то есть *согласныя*, опять раздѣлилъ онъ :

а)

(*) De harum formatione v. cl. Chr. Theorh. Kratzenstein tentamen, præmio coronatum, resoluendi problema ab Acad. Scient. Petropolit. propositum: de natura et charactere sonorum litterarum vocalium &c. Petrop. 1781. 4.

а) на буквы, со свистомъ произносимыя (sibilantes), каковы суть: h, g, ch, sch, f, v, ph.

б) на шумныя или звучныя (explosivæ), каковыя суть: k, q, d, t, b, p. и на конецъ

с) на двойныя или сложныя (duplices), каковы суть: ж и з.

§. 156. На конецъ слѣдуетъ упомянуть и о другихъ нѣкоторыхъ голоса человѣческаго измѣненіяхъ (modificatio vocis), кои обыкновенно случаются припадочнымъ образомъ и изображаютъ либо нѣкія спрасхи душевныя, либо сильное поврежденіе орудій, дыханію служащихъ, и изъ коихъ множайшія, каковыя на примѣрѣ суть: плачь и смѣхъ (fletus et risus), одному только человѣку свойственны.

§. 157. Множайшія же изъ нихъ такъ сродны между собою бывають, что часто одно перемѣняется въ другое; а иногда много случается и шаковыхъ, кои не одинакимъ открываются образомъ.

Вообще однако жъ въ смѣхѣ краткія и какъ бы прерывныя одно за другимъ послѣдуютъ издыханія (*).

Плачь

(*) Fr. Lupichius de risu. Basil. 1738. 4.

Плачь (fletus) глубокия производитъ вдыханія, кои въ скоромъ времени за продолжительными также часто прерываемыми издыханіями послѣдуютъ (*).

Воздыханіе (suspirium) состоитъ изъ продолжительнаго и сильнаго вдыханія воздуха, за коимъ послѣдуетъ иногда всхлипываніе или легкой плачь (gemitus) (**).

Кашель (tussis) есть скорое и звонкое издыханіе, за глубокимъ вдыханіемъ воздуха послѣдующее (***).

Чиханіе (sternutatio) есть скоропостижное, сильное и какъ бы судорожное издыханіе воздуха, коему обыкновенно предшествуетъ краткое и сильное вдыханіе онаго (****).

Л

На-

(*) Jo. Fr. Schreiber de fletu. LB. 1728. 4.

(**) Dav. C. Imm. Berdot de suspirio. Basi 1756. 4.

(***) Jo. Melch. Fr. Albrecht (praes. Hallero) experimenta in vivis animalibus circa tussis organa exploranda instituta. Goetting. 1751. 4.

(****) Marc. Beat. L. Jac. Porta de sternutatione. Basil. 1755. 4.

Напрошивъ того икота (singultus) состоимъ изъ звонкаго, самокрапчайшаго и какъ бы судорожнаго вдыханія воздуха (*).

Куда также можно отнести и зѣвоу (оscitatio), (**) копорая полнымъ, медленнымъ и долгимъ вбираниемъ и таковымъ же послѣдующимъ за онымъ испущеніемъ воздуха съ разверзтіемъ зѣвъ и челюстей, совершается, такъ что вдохнумый въ легкія воздухъ проникаетъ и въ Естахіевы трубы.

Она имѣетъ ту замѣчательную особенность, что не рѣдко и въ другомъ человѣкѣ производишь зѣвоу, чего безъ сомнѣнія причина состоитъ въ воспоминаніи пріятнаго чувствованія, отъ зѣванія происходящаго.



ОТДѢЛЕНІЕ XIII.

О теплотѣ животныхъ (de calore animalium)

§. 158. Человѣкъ живой съ прочими животными и пернатыми ту имѣетъ предъ дру-

(*) C. Jo. Sig. Thiel de singultu. Goetting. 1761. 4.

(**) Just. Godofr. Günz (praes. Waltero) de oscitatione Lipſ. 1738. 4.

другими тварями особенность и преимущество, что природная теплота ихъ тѣлѣ теплоту, въ коей они обитаютъ, гораздо превышаетъ. Однако жъ не взирая на сѣ, въ человѣкѣ находится та еще достопамятность, что кажется онъ меньшую имѣетъ степень теплоты передъ животными, выше сего упомянушими, такъ, что теплота она по тепломѣру Фаренгейтову въ нашемъ поясѣ почти до 96 градусовъ простирается, напротивъ того теплота другихъ животныхъ, а наипаче птицъ, градусъ оный не мало превышаетъ (*).

§. 159. Оная степень природной и естественной теплоты въ здоровомъ человѣкѣ есть столь постоянна, что взглядомъ здравія, каждому человеку въ особенности приличнаго, развѣ малымъ

Л 2

нѣко-

(*) Что состояніе оное теплоты нѣкопрыхъ животныхъ, чрезъ все зимнее время спящихъ, изъ сего исключать должно, сѣ кажется не требуетъ никакого напоминанія. Ибо извѣстно, что въ то время какъ премногія другія животнаго тѣла уснройства дѣйствія либо вовсе замираютъ, либо чрезвычайно слабо совершаются, такъ и природная ихъ теплота почти въ холодность превращается.

нѣкошорымъ образомъ перемѣняется, хотябы человекъ подверженъ былъ жестокой спужѣ самаго холоднаго пояса, или зною самаго жаркаго неба.

Чшождѣ до мнѣнiя великаго Боергава, якобы по есшь человекъ не можетъ пребывать въ томъ мѣстѣ, гдѣ теплота превосходитъ естественную его теплоту; по оное не только наблюденiями знаменишаго пушника и бывшаго нѣкогда въ Георгiи Губернаторомъ Г. Еллиса (*), но и другихъ физiологически ученыхъ мужей нарочито надъ шѣмъ учиненными опытами (**) опровержено и отпринуто (***); кромѣ

се.

(*) Philos. Transact. Vol. I. P. II. a. 1758.
In animantibus vero antea iam expertus erat
cl. Arn. Duntze, v. EJ. exper. calorem animale
speculantia. LB. 3754. 4.

(**) Duhamel et Tillet in Mem. de l'Ac. des
Scienc. de Paris. a. 1704.

Cl. Blagden. et Dobson in Philos. Transact.
a. 1765.

(***) Кромѣ сего извѣстно, что и въ Европѣ лѣшнiе жары иногда превышаютъ обыкновенную теплоту, что я самъ испыталъ 3 Августа 1783, находясь на Алпiйскихъ Людерненскихъ горахъ, на которыхъ около полудня съ знаменишымъ

му-

сего человекъ великое имѣетъ преимущество и въ томъ, что, не бывъ привязанъ ни къ какому поясу земному, вездѣ на семъ земноводномъ шарѣ, какъ на примѣрѣ: при заливѣ Гудзонскомъ, гдѣ ртуть сама собою иногда замерзаетъ (*), или на берегахъ Новой Земли, (**) гдѣ несказанная бываетъ стужа, такъ и на берегахъ Сенегальскихъ (***), гдѣ ужасные бывающъ знои, безбѣдно обиташь можешъ.

Л 3

§. 160.

мужемъ Шнедеромъ де Варшенсомъ видѣлъ я ртуть въ шепломѣрѣ Фаренгейтовомъ въ тѣнѣнномъ мѣсцѣ подымавшуюся выше 100 град. которая однакожъ ртуть во время приладыванія того же шепломѣра къ тѣлу опускалась почти до 97 град.

(*) Th. Hutchins (Governor of Albany Fort in Hutton's bay) Experiments for ascertaining the point of mercurial congelation Lond. 1784. 4. pag. 66 fq

(**) Gerrit de Veer waerachtighe Beschryvinghe van drie Seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort &c. Amst. 1598. 4 transv. (quae cit ed. princeps famosi itinerarii).

(***) Cl. J. p. Schotie on the Synochus atrabiliosa which raged at Senegal a. 2788. Lond. 1782. 8. p 74 fq.

§. 160. Теперь должно изслѣдовать источникъ того чуднаго огненнаго вещества, коимъ мы будучи исполнены, всегда ощущаемъ въ себѣ теплоту, которую, не упоминая уже о пустыхъ объ оной мечтаніяхъ древнихъ, одни изъ новѣйшихъ искали въ электрическомъ веществѣ и чувствительныхъ жилахъ (*), другіе напротивъ того опъ пренія поступательнымъ движеніемъ крови собираемаго (**), иные опъ пренія же, но шокмо твердыхъ частей тѣла (***), иные на конецъ опъ инуды начало ея производили.

§. 161. Однакожъ всѣ оныя предположенія (hypotheses) слишкомъ подлежатъ затрудненіямъ, колико есть простое, и съ явленіями природы сходственное по ученіе, по которому утверждаетъ ся, что такъ сказать печь (focus) естественной теплоты человека и другихъ,

10-

(*) Jo. Shebbeare's practice of physik Vol. I.

(**) Nuperum haec Boerhaavii sententia defensorum nacta est cl. Crell ad calcem versionis E.J. vernaculae dissertationum cl. Dobson et Blagden, quas modo citavimus. Helmst. 1778. 8.

(***) Cl. ed. Fryer. cogitationes physiologicae de vita animantium et vegetabilum LB. 1785. 8.

горячую кровь имѣющихъ, животныхъ легкія, а пламенникъ (fomes) оныя обезгрюченная часть воздуха, нами дыхаемаго, составляетъ; котораго ученія первыя черты провелъ Иванъ Маіовъ, больше же изъяснилъ и разпространилъ оное достоименный Крауфордъ (*).

Все же содержаніе умоположенія Г. Крауфорда клонится шуды, чшобы дыханіе, такъ какъ жженіе относить къ произшествіямъ удобъ загараемыхъ веществъ, коими загараемое вещество, въ шѣлахъ находящееся, во время прикосновенія къ нимъ свободного огня (который опъ водруженаго въ шѣлѣ и недѣйствительнаго огня хорошо оплачать должно) приводится въ движеніе и вонъ изгоняется.

Сіе пошому, что горячее или загараемое вещество и огненное начало суть одна другой противныя стихіи, и чемъ больше одной изъ нихъ обрѣщается въ какомъ либо шѣлѣ, шѣмъ меньше въ томъ находится другой, такъ на пр.

швер-

(*) V. Fj. Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies &c. Lond. 1779. 8.

твердый, шламъ сосущественный, воздухъ (аer fixus) не больше $\frac{1}{87}$ части содержишь въ себѣ того огненного вещества, которое въ подобномъ количествѣ воздуха, насъ окружающаго, находится и такъ далѣе.

Ибо изъ опытовъ явствуетъ, что окружающій насъ или атмосферическій воздухъ имѣетъ гораздо большее сродство съ горючимъ веществомъ, нежели съ огненнымъ такъ, что весьма скоро соединяется съ онымъ, а огненное начало, въ немъ внедренное, освобождаетъ и изъ себя изпускаетъ.

§. 163. Почему ежели сравнишь явленія, при дыханіи случающіяся, съ выше сказанными явленіями, то кажется бытъ весьма правдоподобнымъ, что таковымъ же образомъ происходитъ въ шламъ и животная теплота.

Ибо, какъ видѣли, издыхаемый воздухъ отъ вдохнутаго воздуха весьма много различествуетъ, будучи лишенъ огненныхъ своихъ частей, и на противъ того соединенъ съ горючестью и основаніемъ твердаго воздуха (§. 145).

164. Откуда вѣроятно, что огненная часть воздуха нами вдыхаемаго, проникаетъ въ самые мѣлкіе, весьма тонко о

пре-

преградою отъ воздушныхъ пузырьковъ отдѣленные (§. 135.) кровеносные сосуды, а отшуда чрезъ крововозвратныя легочныя жилы проходишь во всѣ бѣгущія, отъ аорты производящія, и на конецъ чрезъ все тѣло протекаетъ.

Потомъ съ загараемымъ веществомъ, а наипаче въ мѣлкихъ сосудахъ обрѣщаемымъ, соединяется и мѣсто онаго занимаетъ. А сіе (то есть загараемое вещество) вмѣсто огненного начала, смѣшавшись съ кровью крововозвратныхъ жилъ, купно съ оною приносится къ правой полостии сердца, а изъ онаго чрезъ боевую легочную жилу выходитъ въ легкія, гдѣ по выше помянутымъ законамъ сродности или припяжанія отъ воздуха, вновь вдыхаемаго, опять пріемлется, а новое огненное начало отъ соединенія его съ свѣжимъ воздухомъ освободившись, опять въ кровь вселяется и по тѣлу разносится.

§. 165. Симъ явленіямъ соотвѣствуетъ все то, что ни говорилъ я о разности крови, въ боевыхъ и крововозвратныхъ жилахъ спружащейся; соотвѣтствуетъ также онымъ и то, что говорено было объ особенной те-

плотѣ обоого рода крови (*) ; когда въ боевожилъной крови $11\frac{1}{2}$, а въ возвращательныхъ жилѣ развѣ 10 частей теплоты обрѣщается; кромѣ сего справедливостѣ вышереченнаго подтверждають и слѣ слова, кои говорены были тогда, когда дѣло шло о дѣйствіи самыхъ малыхъ кровеносныхъ сосудовъ (§. 126).

§. 166. Ибо весьма вѣроятнымъ кажется, что и самые оные сосуды имѣють участіе въ томъ, что при возбужденіи или уничтоженіи ихъ дѣйствія смѣшеніе онаго, чрезъ все тѣло протекающаго, огненнаго начала съ горючимъ веществомъ, вездѣ въ тѣлѣ обрѣщающимся, совершается, а производящая опшуда внутренняя теплота либо умножается, либо уменьшается.

Ибо достопамятныя оныя явленія, изъ коихъ открываеиъся, что животная
теп-

(*) Давно уже не на одномъ мѣспѣ упоминалъ Галенъ, что лѣвый желудокъ сердца есть теплѣе праваго. Cf. v. c. Ej. de temperamentis I. II. pag. 34. ed. Oper. Bas. 1562. Cl. I. et L. de inaequali temperie ed. cit. Cl. III. pag. 88 sq.

Pluribus videfis Th. Schwenke haematologiam Haag. 1743 8. pag. 31.

теплота (еслили то есть извѣдывать ее помощію тепломѣра, а не однимъ обманчивымъ ощущеніемъ), всегда почти одинакова бываетъ (*), то есть ни умножается въ лѣтніе жары, ни уменьшается въ зимнюю стужу, и изъ коихъ также явствуетъ, что тѣлесная теплота еще больше умножается, когда тѣло погрузить въ студеною воду (**), кажется доказывающъ ясно, что дѣйствіе самомалѣйшихъ сосудовъ тѣла нашего, судя по разной теплотѣ того мѣста, гдѣ мы обрѣтаемся, бываетъ различно, такъ что во время пребыванія на стужѣ (опъ которой кажется крѣпость ихъ умножается) большее количество огненной матеріи они возбуждающъ, и тѣмъ большую въ тѣлѣ теплоту рождаютъ, когда напротивъ того при теплой и слабой погодѣ дѣлающся и сами они слабыми и вялыми.



М 2

ОТ-

(*) Cf. cl. Crawford in Phil. Trans. Vol. LXXI. P. II.

(**) Cl. G. Pickel experimenta physico-medica de elasticitate et calore animali. Wirceb. 1778. 8. pag. 91 fq.

ОТДѢЛЕНІЕ XIV.

О испаринѣ (*de perspiratione*).

§. 167. Дѣйствія, производимыя кожею, облекающею человѣческое шѣло, суть споль многочисленны, что въ одной главѣ всѣхъ ихъ подробно изчислить не возможно, но кажется гораздо приличнѣе каждое изъ нихъ опнеспи къ тому отдѣленію дѣйствій, къ которымъ оно принадлежитъ.

Ибо кожа не токмо первоначальное есть орудіе или органъ осязанія, о которомъ говорить буду при изъясненіи дѣйствій живошныхъ; но она также есть орудіе вдохновенія или вбиранія (*inhalatio*), по силѣ котораго принадлежитъ она къ союзу всасывательныхъ пасочныхъ жилъ, о чемъ говорено будетъ при изложеніи естесственныхъ дѣйствій.

На конецъ кожа есть машина, испареніе производящая, взглядомъ котораго дѣйствія премного сходспвуетъ она съ оппращленіемъ дыханія, а посему справедливо заслуживаетъ, чтобы во первыхъ о ней имѣть разсужденіе.

§. 168. Кожа состоитъ изъ трехъ плевъ, то есть кожи, кожицы и клѣшечной плевы, ихъ соединяющей, о коихъ всѣхъ порознь говорить имѣю.

§. 169. И во первыхъ о кожицѣ (*) (*epidermis, cuticula*), которая есть не что иное, какъ внѣшній покровъ тѣла, воздуху подлежащій, коего прикосновеніе въ здоровомъ человѣкѣ едва какія части безбѣдно снести могутъ, исключая зубную кору, пуши, служащія дыханію, и пищепроходные каналы.

§. 170. Составъ кожицы есть самопростѣйшій, не имѣющій ни сосудовъ, ни чувствительныхъ жилъ, ни скважинъ; вообще же кожица хотя есть мало орудная, однакожь опмѣнно устроенная (**), и не взи-

М 3

ра-

(*) Al. Monro (patr) or. de cuticula humana. oper. ed. Angl. Edinb. 1781. 4. pag. 54 sq.

(**) Весьма толстая большихъ нѣкоторыхъ животныхъ кожица составлена изъ волоконъ, вертикально проведенныхъ, положеніемъ своимъ устроение сморчка (*boleus igniarius*) представляющихъ. Внутренняя ея поверхность показывается скважиноватою, въ кои скважины волокна кожи, подъ нею находящейся, какъ бы нѣкія шелковые нити вселяются. Таковое особенное

рая на ея полупрозрачную тонкость, столь крѣпка, что весьма долго сопротивляется намачиванію и другимъ разрушенію родамъ.

§. 171. Происхожденіе кожицы и по сѣ время подвержено сомнѣнію. Впрочемъ кажется вѣроятнымъ, что она воспріемлетъ происхожденіе свое вкупѣ съ волосными луковицами (*bulbilli*) отъ кожи, подъ оною находящейся, съ которою она безчисленными и при томъ
есть-

вое кожицы устройство я у себя имѣю между прѣуголовленіями изъ кожи Гренландскаго кита (*balena mysticetus*).

Подобное нѣкоторымъ образомъ устройство и въ человеческой недугомъ зараженной кожицѣ примѣчается, какъ на пр. въ наследственной зажной болѣзни, каковою спрдалъ одинъ Англичанинъ, такъ называемый человекъ Дикобразъ (*homo hystrix*) съ своими дѣтьми. V. G. Edward's Gleanings of natural history Vol. I. Tab. CCXXII. pag. 3. fqq.

Такимъ образомъ мозоли на ножныхъ пальцахъ и затвердѣнія кожицы на пяткахъ находящіяся, а особливо у ходящихъ босыми ногами, немного отличное имѣютъ устройство.

весьма тонкими и нѣжными совокупаются волоконцами (*).

Кожица всѣхъ прочихъ однородныхъ и простыхъ частей шѣла скорѣе раждается послѣ ея скупленія съ онаго.

§. 172. Преимущество оныя и необходимости для устройства орудныхъ шѣлъ, доказываетъ одна же ея повсемѣстность, по которой она въ обоимъ царствѣ животнохъ находится. Ибо обрѣщается она даже на самомъ нѣжномъ младенцѣ, по крайней мѣрѣ по прошествіи трехъ мѣсяцовъ послѣ зачатія его въ утробѣ.

§. 173. Подъ ней находится склизистая кожица, по имени изобрѣтателя ея Малпигіевою сѣпочкою именуемая (**)
reticulum Malpighianum), которая сѣпочка имѣетъ видъ удобораспускаемой скли-

М 4

зи

(*) Gц. Hunter in medical obs. and Inquir. Vol. II. p. 25 sq. Tab. I, fig. 1. 2. Впрочемъ я не почишаю вѣроятною сего изящнаго мужа ту догадку, по которой онъ думаетъ, якобы волоконца сѣи суть испражнишельные сосуды испаряемой матеріи.
(**) V. Marcelli Malpighii tertas anatomicar. epistolae. Conon. 1665. 12.

зи, и которую едва когда либо, исключая одну мощну у Араповъ, можно опдѣлить цѣлою отъ кожицы и самой кожи и представить зрѣнію въ образъ настоящей плевры (*).

§. 174. Кожица составляетъ первоначальное обиталище человѣческаго цвѣта (**). Ибо кожа у всѣхъ есть бѣлая, когда напрошивъ того кожица не у всѣхъ есть бѣла и полупрозрачна, у Араповъ же обыкновенно бываетъ она изъ сѣро-темноватая. Чтожъ принадлежитъ до склизистой Малпигіевой сѣточки, то она въ рожденномъ на свѣтѣ человѣкѣ взглядомъ возраста, рода жизни, пояса, равно какъ и болѣзненнаго состоянія бываетъ различна. (***)

Такъ

(*) Сіе надъ кожицею Араповъ первый учинилъ другъ мой Симмерингъ, по пріязни коего шакое изящное пріуготовленіе имѣю и я въ моемъ собраніи анатомическомъ. Cf. Ej. über die körperl. Verschieden. des Negers vom Europäer ed. 2. pag. 46 fq.

(**) B. S. Albinus diff. de fede et causa coloris Aethiopum et caeteror. hominum. C. icon. color. distinct. LB. 1737. 4.

(***) Flur. de his ex professo egi. I. de generis humani variet. nativa, pag. 61-77 ed. 2.

Такъ на примѣрѣ взглядомъ тѣхъ пяти различій, на которыя кажется весьма хорошо раздѣлить можно родъ человѣческій, пять и отдѣленій оныхъ поспавляется.

Первое заключаетъ въ себѣ кромѣ Европейцовъ, жителей западной Азіи и Сѣверной Африки, Гренландцовъ и Есквимоповъ, кои больше или меньше бѣлую имѣютъ сѣпчешую плеву, и слѣдовательно цвѣтъ тѣла бѣлѣе или чернѣе.

Ко второму принадлежатъ прочіе Азіатцы, у коихъ цвѣтъ тѣла есть изъ черна-оливковый (*subfusco olivaceus color*).

Въ третьемъ отдѣленіи заключаются Арапы, имѣющіе цвѣтъ черной (*).

Четвертое содержитъ въ себѣ жителей прочихъ частей Америки, у коихъ цвѣтъ почти на блѣдный или красный походитъ.

М 5

Пя-

(*) Jo. Nic. Pechlin de habitu et colore Aethiopum, qui vulgo et Nigritae. L. Kilon. 1677. 8.

Cl. Camperi de eodem argumento oratio extat in EJ. kleiner, Schriften, Vol. I. P. I. pag. 24 - 49.

Пятое ошдѣленіе заключаетъ въ себѣ всѣхъ обывателей Тихаго Моря, кои имѣютъ цвѣтъ смуглой въ большей или меньшей степени.

Однакожъ не взирая на всѣ сіи равно какъ и прочія разности цвѣтовъ, которыми человекъ отъ человека, и одинъ народъ различествуетъ отъ другаго, такъ оныя соединяются между собою, и одинъ (разумѣется цвѣтъ) на другой такъ перемѣняется, что кажется и не нужно напоминать, что кромѣ произвольныхъ раздѣленій народныхъ цвѣтовъ другихъ никакихъ поставишь не можно.

§. 175. Самая же кожа (corium), которой клѣпчатая плева и кожада служатъ покровомъ, есть особливаго рода оболочка, которая есть вся скважиновата (*), удоборасстягиваемая и премного расширяющаяся, имѣющая различную толщину; вообще же кожа состоитъ изъ клѣпчатой плевы, коея поверхность есть плотнѣе исподу, гдѣ она, исключая немногія части шѣла (§. 36), по большей части жиръ или сало въ себѣ содержитъ.

§. 176.

(*) B. S. Albinus annotat. Acad. L. VI. Tab. III. fig. 1 - 5.

§. 176. Кожа кромѣ чувствительныхъ и пасочныхъ жилъ, о коихъ въ другомъ мѣстѣ говорено будетъ, снабжена безчисленными кровяными сосудами, на самой поверхности оныя простирающимися, и, какъ научаетъ наливаніе оныхъ, облекаетъ властно какъ бы какія самомалѣйшія, однако весьма плотныя тончайшаго сплетенія, сѣточки.

§. 177. Далѣе на кожѣ вездѣ разсѣяно великое множество сальныхъ железъ (*folliculi sebacei*), кой весьма тонкимъ прозрачнымъ и нескоро засыхающимъ (*) масломъ умащаютъ (**) кожу, котораго не можно смѣшивать ни съ обыкновеннымъ попомъ, ни съ тѣмъ козлиной запахъ издающимъ пукомъ, который выпускаютъ нѣкоторыя особливья части тѣла.

§. 178. На конецъ почти вся кожа усѣяна волосами (***) различного рода, а наипаче тонкими и короткими, больше-

(*) V. cl. Lyonet lettre à M. Le Cat pag. 12.

(**) Chr. Gottl. Ludwig de humore cutem inungente. Lips. 1748. 4.

(***) Jo. Ph. Witthoff de pilo humano. Duisb. 1750. 4.

Cf. Commentar. Societ. Scient. Goetting. Vol. II.

ше или меньше пушистыми, коихъ, исключая глазныя вѣка, мужескій дѣтородный удѣ, ладони и пяты, едва какая либо часть тѣла вовсе лишена; когда напрошивъ того находятся другія такія мѣста тѣла, гдѣ волосы, для особливыхъ употребленій предопредѣленные, растутъ длиннѣе, каковыя на примѣръ суть: волосы на головѣ (capilamentum), брови (supercilia), рѣсницы (cilia), волосы въ ноздрахъ (vibrillæ), усы (mustaces), борода и тѣ, что подъ мышками и на дѣтородныхъ членахъ находятся.

§. 179. Вообще же человѣкъ не столько есть космашъ и волосашъ, какъ другія множайшія, грудью питающія, животноыя. Почему и въ семъ случаѣ между разными народами различное обрѣтается несходство, такъ что я уже не упоминаю о тѣхъ народахъ, кои и теперь тщательнѣе стараются ошипывать себѣ бороды или другія части тѣла, волосами усѣянные. Впрочемъ находятся и такіе народы, кои отъ самой природы почти никакихъ не имѣютъ волосъ, куды по справедливости принадлежатъ Тунгузы и Буреты. Впрочемъ слыхалъ я отъ достовѣрныхъ пушниковъ, что Надигдскіе жители, ко-

по-

торая сторона принадлежитъ къ Курильскимъ, къ сѣверу лежащимъ, островамъ, нарочито сушь волосашы (*).

§. 180. Не меньшее также находится различіе волосъ въ длинѣ, гибкости и кудравости, а особливо въ цвѣтѣ, какъ отъ дѣйствія пояса, возраста или лѣтъ и другихъ естественныхъ причинъ, такъ и болѣзненнаго состоянія шѣла; какъ на пр. у Араповъ происходящаго, которой весьма часто съ цвѣтомъ очей сходенъ бываетъ.

§. 181. Кромѣ сего волосы имѣютъ особенное нѣкоторое направленіе на разныхъ частяхъ шѣла. Такъ на пр. на шѣлѣ волосы обрѣщаются витые (*spiciles*), на лобковой кости и подчеревокѣ обращены въ верхъ, на плечахъ или раменахъ подобно какъ у обезьяны, лѣшимъ именуемой (*simia fatyrus*), всящія къ локтямъ, на пастяхъ протяжены въ верхъ, такъ что о бровяхъ и рѣсницахъ ничего не упоминаю.

§. 182.

(*) Cl. King in splendido opere, cui tit. a voyage to the pacific Ocean for making Discoveries in the Northern Hemisphere. Vol. III. pag. 377.

Cf. Müller Samml. Russisch. Geschichte Vol. III. pag. 31 et 174.

§. 182. Что до произхожденія волосъ, то они распушъ изъ внутренней поверхности кожи, великимъ количествомъ сала исполненной, съ кошкою они посредствомъ особливыхъ луковицъ (bulbi) весьма крѣпко соединяются (*); состоятъ же волосныя луковицы изъ двоякаго покрова (**), внѣшняго то есть сосудистаго, ящеобразное очертеніе имѣющаго, а другаго внутренняго, цилиндрической видъ имѣющаго, кошкою кажется есть продолженіе самой кожицы (***), служащей покровомъ шѣмъ упругимъ жилочкамъ, изъ коихъ жаждой

(*) Что луковицы больше служатъ къ утвержденію, нежели питанію волосъ, о семъ догадываюсь я пошому, что волосы оные, кои въ волдыряхъ, желшою и салу подобною матерією (meliceret et seotomata) наполненныхъ, а наипаче салника и яишниковъ, иногда находимы были; чему примѣры теперь же имѣю, вовсе не имѣющъ луковицъ, но, не бывши ни въ водружены, нагими содержащя въ помянутой оной матеріи.

(**) Duverney oeuvres anatomiques Vol. I. Tab. XVI. fig. 4.

(***) B. S. Albinus annotat. Academ. L. VI. Tab. III. fig. 4. 5.

дой состоишѣ волосокѣ , коихъ отъ 5 до 10 считается въ одномъ волоскѣ.

§. 183. Волосы всегда умащены бывающѣ испаряемою масленою жидкостію, почти никакой порчи не причастною. Мнѣ кажется, что они всѣхъ прочихъ частей сущѣ больше электрически, и припомѣ сами по себѣ. Ихъ питаніе совершается такъ скоро, что послѣ уничтоженія своего въ краткое время опять вырастаютъ, исключая, когда кожа какимъ либо недугомъ заражена бываетъ.

§. 184. Всѣ же сіи покровы тѣлесныя, кромѣ прочихъ пользѣ, коимъ они служатъ, принадлежащѣ по большей части къ изпражнительнымъ орудіямъ тѣлеснымъ, помощію которыхъ всякое чуждое и вредное для здоровья вещество изъ крови изтребляется и на воздухъ разсыпается. (*)

Истинну сію доказываютъ заразы, въ видѣ сыпи и пятенъ на покровы кожи изъ тѣла выходящія; утверждающѣ

(*) Abr. Кааи perspiratio dicta Hippocrati per univcrsum corpus anatomice illustrata. LB. 1738. 8.

юшѣ сквозь кожу проходящіе запахи чесноку, кабардинской спруи (*muscus*) и другихъ пряностей; свидѣтельствуютъ разные поты и другія симѣ подобныя явленія.

§. 185. Наипаче же пушями сими испражняется изъ шѣла жидкостѣ, которая по имени перваго изслѣдователя ея, мужа остраго ума, Санкторія, нечувствительнымъ Санкторіевымъ испареніемъ называется (*perspiratio Sanctorii*). (*)

При чемѣ должно замѣнить то, что подѣ симѣ именемъ надлежитъ понимать двѣ совсѣмъ пропивныя и такѣ сказать инородныя влаги, то есть потѣ и настоящее нечувствительное испареніе.

Ибо потѣ (*sudor*) есть нечто иное, какѣ водяная жидкостѣ, вкусѣ соленый имѣющая, которая изъ здороваго и въ покоѣ находящагося шѣла никогда сама собою не выходитѣ.

А

(*) *Ars Sanctor. Sanctorii de statica medicina aphorismor. sectionibus VII comprehensa. Venet. 1634. 16. quae est plenissima genuina ab ipso auctore curata editio celebris opusculi, quod Boerhaavius ipsis Hippocraticis aphorismis praeferre nullus dubitavit.*

А испареніе, о которомъ теперь говоримъ, есть тонкая и чувствами необъемлемая жидкость, которая имѣетъ приличную себѣ упругость и великое сходство съ тою влагою, которую мы чрезъ легкое издыхаемъ (*)

§. 186. Испареніе подобно издыхаемо-му изъ легкихъ воздуху есть обремено горючимъ веществомъ; оно осаждаетъ на дно извѣстку изъ ея воды, и бываетъ неспособно какъ къ питанію пламени горячей свѣчи, такъ и продолженію дыханія и прочая.

§. 187. количество сея влаги, изъ поверхности тѣла испаряемой, которая поверхность у взрослого человѣка, надлежащую величину имѣющаго, равняется 15 квадратнымъ футамъ, едва можно надлежаще опредѣлить.

А что вѣсы, со временъ Санкторія даже доселѣ для взвѣшиванія тяжестей человеческого тѣла употребляемыя (**),

Н

къ

(*) V. C. de Mill'y et cl. Lavoisier in Mem. de l. ac. des sc. de Paris a 1777. pag. 221 sq. 360 sq.

(**) Sanctorii Comm. in iam Fen Imi L. Canon. Avicennae. Venet. 1646. 4. pag. 781.

къ опредѣленію сего сушь недостаточны, сіе удобно узнать можно изъ того, что я выше сказалъ о многоразличной матеріи, которая кромѣ нечувствительнаго испаренія проходитъ сквозь кожу и разсыпается на воздухъ.

Кромѣ сего давно извѣдано, что испареніе въ каждомъ человѣкѣ бываетъ совсѣмъ особливаго рода. Вообще же можно отнести сюда то совсѣмъ особенной запахъ имѣющее Караибовъ, (*) Гренландцовъ (**), Араповъ (***) и другихъ варварскихъ народовъ испареніе, которое издаетъ ихъ кожа.

§. 188.

Cf. Jo. Andr. Segner de libra, qua fui quique corporis pondus explorare posset. Goetting. 1748. 4.

(*) Thibault de Chanvalon voyage à la Martinique. Paris. 1763. 4. pag. 44.

(**) Dav. Cranz Hist. von Grönland. ed. 2. pag. 179.

(***) Cl. Estwik) history of Jamaica. Lond. 1774 Vol. II. pag. 352. sq. 425.

Совсѣмъ особливою запахомъ, каковой издаютъ Арапы, а особливо Нагольскіе, я имѣлъ случай неоднократно примѣтить въ обоемъ полѣ разнаго возраста народовъ оныхъ.

§. 188. Почему ежели сравнить все, что токмо ни говорено было о сосудистой кожѣ (§. 176.), спроенїи и сходствѣ между испаренїемъ и издыхаемымъ воздухомъ (§. 186.); также и то, что сказано о могуществѣ и силѣ самыхъ мѣлкихъ сосудовъ къ произведенїю въ животномъ теплоты; то весьма правдоподобнымъ покажется, а особливо при испытнѣйшемъ разсужденїи, что между дѣйствїемъ легкаго и испаренїемъ, кожею производимымъ, великое находится сходство и взаимное согласїе такъ, что одно другому поспѣшествовать, или одно другое замѣнить, въ случаѣ воспослѣдовавшаго какого либо возмущенїя въ шѣлѣ, довольно въ состоянїи.

§. 139. Сїе мнѣніе подтверждають многія явленїя, какъ въ здоровомъ, такъ и болѣзненномъ состоянїи человека примѣчаемыя.

Каковыя *на пр.* суть шѣ, коими младенецъ и плодъ другихъ, грудью питающихъ, животныхъ различествуетъ (*) отъ цыпленка, въ яйцѣ находящагося.

Н 2

А

(*) Теплота шѣлесная въ зародышѣ чело-
вѣческомъ и другихъ животныхъ самого
ма-

А наипаче холодъ ощущаемый въ нѣкоторыхъ частяхъ животнохъ горячаго сложенія на пр. въ носу у сабаки и прочая; что подлинно кажется производимъ должно отъ меньшаго сосудовъ дѣйствія, теплоту производящаго.

Такъ

матерью, съ котрою онъ помощію мѣста соединенъ, сохраняется, которая (мать) огненную пищу ему доставляетъ, напошивъ того кровь горячимъ веществомъ исполненную, отъ него пріемлетъ. Почему онъ не долженъ имѣть ни дыханія, ни испаренія.

Но насиживаемый дышленокъ въ другомъ находящися положеніи. Онаяжъ онъ не имѣетъ дыханія и при томъ оное не есть для него нужное. А дабы загараемое вещество, отъ прикосновенія огня въ немъ обнаруживающееся, выходило вонъ, для того яйцамъ дана скважиноватая скорлупа, чрезъ которую испаряютъ яйца, а наипаче ежели положишь ихъ въ теплоту.

Сколь же удобное есть какъ матерняго огня къ дышленку прехожденіе, такъ и исхожденіе изъ оного загараемаго вещества, сіе можетъ увидѣть всякъ, кто только приметъ въ разсужденіе то, что говорено было о сходствѣ яичнаго бѣлка съ кровяною сывороткою (§. 11.), также и о удобности, съ каковою воздухъ чрезъ сыворотку оную можетъ дѣйствовать надъ ссѣдающеюся кровью (§. 12.).

Такъ какъ съ другой стороны изъ усиленнаго дѣйствія сосудовъ въ какихъ либо частяхъ тѣла, нѣкоторыя болѣзненныя явленія удобно изъяснить можно. Куды по справедливости относить должно особый нѣкоторый жаръ въ ладоняхъ у тѣхъ, кои спраждуютъ чахоткою лихорадкою (*febris hectica*).

Взаимное же оное пособіе, которое имѣютъ между собою оппращенія легкихъ съ кожею, кажется довольно поясняютъ тѣ явленія, для чего родившіеся на свѣтъ и возмужавшіе люди при совершенномъ почти уничтоженіи чахоткою или другою порчею легкихъ жили чрезъ долгое время, и что удивительнѣе чрезъ многія лѣта безъ всякаго почти дыханія пребывали въ живыхъ (*).

§. 190. На конецъ справедливо думать можно, что и пищепріемнаго канала внутренняя поверхность, кромѣ прочихъ стѣнъ главнѣйшихъ дѣйствий, также имѣетъ поврежденіе.

Н 3

Ибо

(*) Memorabile id genus exemplum cl. Tacconi memoriae prodidit in Comment. Instituti Bononiensis. Vol. VI. pag. 74. sq.

Ибо каналъ оный есть одна изъ всѣхъ внутреннихъ частей, которая подобно легкимъ подлежитъ окружающему насъ воздуху; а что таковое утверждение есть справедливо, то есть, что мы великое количество воздуха вкупѣ съ пищею глотаемъ, сѣ никакого дальнѣйшаго не требуетъ доказательства.

Также что глотаемый съ пищею и питіемъ воздухъ такую же претерпѣваетъ перемѣну, каковую претерпѣваетъ выходящій изъ легкаго, сѣ доказываетъ (*) свойство воздуха, во всемъ пищепроходномъ каналѣ содержамаго.

Кромѣ сего справедливостъ мнѣнія таковаго подтверждаетъ вкупѣ съ прочими явленіями безчисленное множество кровеносныхъ сосудовъ, во внутренностъ кишекъ отщепеняющихся, каковую внутренностъ нѣкоторые сравниваютъ со всею поверхностію тѣла.



ОТ-

(*) Id quod iam magni fane ingenii viro, et si paradoxo, Jo. Bapt. Helmont, perspectum fuit. V. DJ. de flatibus L. Sect. XLIX. p. 405. sq. ed. Op. 1682. 4.

ОТДѢЛЕНІЕ XV.

О чувствилищѣхъ и чувствительныхъ жилахъ (*de sensorio et nervis*).

§. 191. Теперь достигли мы къ другому отдѣленію дѣйствій чедовѣческаго шѣла, копорый заключаешъ въ себѣ такъ называемыя животныя (*animales* §. 63. 11.) дѣйствія, помощію копорыхъ сохраняешся взаимное согласіе и связь между шѣломъ и душевными способностями, и копорыя какъ потому, что онѣ однимъ шолько органическимъ или членоуспроеннымъ, душою одареннымъ шѣламъ приличествуютъ, такъ и потому, что всѣ вообще суть гораздо многочисленнѣе въ царствѣ животныхъ отъ жизненныхъ отпращиваній, справедливо таковымъ называются именемъ.

§. 192. Орудія же, къ отпращиванію и совершенію дѣйствій оныхъ болѣе прочихъ споспѣшествующія, суть: мозгъ обого рода, спановая, соединенная съ онымъ жила (*medulla spinalis*), и на конецъ чувствительныя жилы, отъ трехъ источниковъ оныхъ происходящія. (*)

Копо-

(*) Eustachii Tab. XVIII. fig. 2.

Которыя однакожъ орудія справедливо оп-
нестъ можно къ двумъ главнѣйшимъ отдѣ-
леніямъ, то есть общему чувствительному и
самымъ чувствительнымъ жиламъ (*senso-
rium commune et nervi*), изъ коихъ чув-
ствительное кромѣ чувствительныхъ жилъ
и другихъ частей, къ произхожденію
оныхъ принадлежащихъ, заключаетъ въ
себѣ все то, что находится во всей
связи оныхъ, и что ближайше принадле-
житъ къ той чудной связи, помощію
которыя должносты чувствительныхъ
жилъ соединяются съ благороднѣйшею
тѣла нашего частію, то есть со спо-
собностями душевными.

§. 193. На семъ раздѣленіи универ-
сируется то славное Г. Симмеринга на-
блюденіе (*), помощію котораго при-
мѣ-

Cl. Mayer Abh. vom Gehirn, Rückenmark u.
Ursprung der Nerven. Berol. 1779. 4.

Cl. Al. Monro (fil.) observations on the stru-
cture and functions of the nervous system.
Edinb. 1783. fol.

Cl. Vieq d'Azur tam in Mem. de l'Acad.
des sc. de Paris a. 1737. quam in FJ. Planches
anatomiques, quorum nuper P. I. Paris. fol.
prodit.

(*) V. E.J. diff. de basi encephali. Gœtting. 1778.
4. pag. 17. et pluribus Id. citato de Aethio-
pum anatome I. pag. 59. sq.

мѣшилъ онѣ, что опносительное оное множество обоого рода чувствительныхъ орудій такъ соотвѣтствуетъ способностямъ душевнымъ, что чѣмъ тонѣе чувствительныя жилы обрѣтаются въ какихъ либо животныхъ, въ разсужденіи другаго порядка частей, подѣ именемъ общаго чувствилища заключаемыхъ, тѣмъ большее изящество способностей душевныхъ тѣ животныя имѣютъ: и въ семъ-то случаѣ можно сказать, что человекъ имѣетъ весьма великой мозгъ, еслили только сравнить составъ мозга съ тонкостію чувствительныхъ жилъ, отъ него происходящихъ; а не тяжесть оного съ тяжестію всего тѣла.

§. 194. Самый же мозгъ, (*) кромѣ костянаго черепа, покрывается еще тремя оболочками, то есть: твердою верхнею и тонкою исподнею, и на концѣ паушинною, между ими находящеюся, пласвою (*dura, pia et arachnoidea meninges.*)

О

§. 195.

(*) Eustachii tab. XVII. XVIII.

Halleri icones anat. fascic. VII. tab. I.

II. III.

Synonymi tab. primæ. II. III.

§. 195. Твердая мозговая оболочка (*dura mater s. meninx*), (*) которая полость черепа подобно надкостной плеви (periosteum) выпилаетъ, будучи раздѣлена какъ бы на нѣкоторыя разнаго состоянiя преграды, серпообразною (*falciformis*) раздѣляетъ полукружiя какъ большаго, такъ и меньшаго мозговъ, а поперегъ проведенною (*tentorium*) (**) заднiя доли мозга
под-

(*) Jo. Ladmira! icones durae matris in concava & convexa superficie visae. Amst. 1738. fasc. I. II. 4.

(**) Достойный есть замѣчанiя костей головного черепа пошъ лиспочекъ, который во многихъ питающихъ млекожyвныхъ проведенъ между плевами упомянутой оболочки и оную утверждаетъ. Не справедливо Шезельденъ (*anat. of the bones cap. 8.*) оный костяной наметъ (*tentorium*) приписывалъ однимъ дикимъ звѣрямъ; ибо я находилъ оный какъ въ лошадахъ, такъ и въ морскихъ комахъ (*phoca*), и другихъ животныхъ. Впрочемъ объ употребленii онаго кажется должно имѣть сомнѣнiе. Ибо вообще приписываемое ему употребленiе (*a Saug. Nihell de cerebro. Edin 1780. p. 4.*), чтобы охранять малой мозгъ въ скоробѣгающихъ животныхъ, не есть обстоятельно, когда
мед-

поддерживаетъ, и тѣмъ препятствуетъ, что онѣ не давятъ малаго мозга подъ ними лежащаго (cerebellum).

Разнородными же сдвсеніями своими составляеиъ она такъ называемыя крововозвратныя пазухи (sinus venosi) (*), и предохраняетъ ихъ отъ сжатія, которыми пазухами кровь изъ головы возвращается къ сердцу. Про которую кровь (**) говорятъ, что она имѣетъ опмѣнное отъ прочей крови свойство, и шолікое количество, что нѣкоторые равняютъ оное по крайней мѣрѣ $\frac{1}{10}$ долѣ всего кровянаго состава.

§. 196. Подъ твердсю и верхнею мозговою оболочкою близко находится сред-

О 2

няя,

медвѣдь и другія животноыя, медленно ходящія, имѣютъ костяный наметъ, напротивъ того въ прескорой сернѣ (ibex), коея черепъ у себя имѣю, шаковаго намета не находится.

(*) Vieussens nevrograph. vniversal. tab. XVII. fig. 1.

Duverney oeuvres anatom. Vol. I. tab. IV.

Halleri icones anat. fascic. I. tab. VI.

Cl. Walter de morbis peritonaei & apoplexia. Berol. 1785. 4. tab. III. IV.

(**) Cl. Dan Jo. Taube de sanguinis ad cerebrum tendentis indole. Goetting. 1747. 4.

няя, по причинѣ тонкости своей паутинною именуемая, не имѣющая кровеносныхъ сосудовъ (§. 5), плева, копорая подобно пердой верхней оболочкѣ не проникаетъ въ бразды и излучины (lугае) мозга, но только составъ онаго облекаетъ.

§. 197. Напротивъ того исподняя мозговая, мягкою отъ древнихъ сочинителей называемая, оболочка (pia mater) совсѣмъ другимъ образомъ устроена и расположена обрѣнается, копорая со всѣхъ сторонъ столь крѣпко объемлетъ мозгъ, (*) что кровяные сосуды, на ней находящіеся, безчисленными опраслами своими въ самое корковое существо мозга проникаютъ, и какъ бы прободаютъ оное; почему ежели снять съ мозга сію оболочку, то она оказывается сколь гладкою извнѣ, столь изнутри ворсоватою и почти подобною тѣмъ мховъ корешкамъ, коими они удержаются въ шинѣ (**).

§. 198.

(*) Ruyschii respons. ad ep. problematic. novam. Amst. 1670. tab. X.

(**) B. S. Albini annotat. Acad. L. I. tab. II. fig. 1. 5.

§. 198. Мозги, какъ большой по
есть, такъ и малой, состоятъ изъ много-
различныхъ частей, различное строение
и видъ имѣющихъ, но которыхъ одна-
кожъ употребленіе и по сіе время не-
ислѣдовано, которыя по большей части
четырьмя полосками отдѣляются одна
отъ другихъ, коихъ взаимную связь
въ недавнемъ времени весьма хорошо из-
слѣдовалъ славный Монро, изъ кото-
рыхъ переднія, равно какъ и четвертая
полоска, имѣющъ въ себѣ ликосоставныя
сосудовъ сплетенія (*plexus choroidei*), ко-
торыхъ такъ же дѣйствіе и употребленіе
и по сіе время въ сомнѣніи находятся.

§. 199. Всѣ же части мозга состо-
ятъ изъ двоякаго существа, одного по-
ловиднаго, иначе еще корковымъ назы-
ваемого (*cineria s. corticalis substantia*), хотя
впрочемъ таковое существо не всегда на
поверхности мозга обрѣщается, а дру-
гаго бѣлаго, или мозжечнаго (*medullaris*),
промежъ которыхъ, какъ открывается
изъ наблюденій Симмерринговыхъ,
(*) находящя еще и третіе бѣлова-
таго цвѣта существо, которое по

О 3

больш-

(*) De basi encéphali pag. 63.

It. cl. Gennari de peculiari fructura cereb-
ri. Parmae 1782. 8. tab. II. III.

большей части въ жизненномъ древѣ (arbor vitae) малаго, и заднихъ доляхъ большого мозга, усматривается.

§. 200. Содержаніе пепельнаго. (*) мозгового существа къ бѣлому или мозжечному съ печеніемъ лѣтъ уменьшается; ибо больше онаго обрѣшается въ младенцахъ, нежели въ возрастныхъ людяхъ. Оно почти все состоитъ изъ безчисленнаго множества разнообразно сплешенныхъ, какъ кровеносныхъ, такъ и другаго рода (§. 79) сосудовъ, изъ которыхъ не многіе проникаютъ (**) въ самое даже мозжечное существо, которое кромѣ сихъ сосудовъ и самопончайшей клѣбчатой плелы кажется особенно состоитъ изъ мягкаго и какъ бы кашичѣ подобнаго состава (parenchyma), въ которомъ ни дѣсприческія орудія, ни другія средства постояннаго и опредѣленнаго стро-

(*) Malpighi de cerebri cortice c. rel. de viscerum structura Exercit. Lond. 1669. 12.

Ruysch de cerebri corticali substantia ep. problematic. XII ma Amst. 1699. 12.

Cl. Chr. Frid. Ludwig de cinerea cerebri substantia Lips. 1779 4.

(**) В S. Albini annotat. Academ. L. I. tab. II. fig. 4. 5.

строенія даже и по сіе время опкрыть не возмогли (*).

§. 201. Впрочемъ мозгъ имѣетъ всегдашнее, но только легкое движеніе (**), которое такъ соопвѣстственно дыханію, что онъ при сжатіи легкихъ не много поднимается, а при разширеніи оныхъ во время издохновенія опять осѣдаетъ (***).

§. 202. Мозгъ, такъ называемый продолговатый (*medulla oblongata*), все-

О 4

ля-

(*) Cf. cl. Mézgeri animadversiones in doctrinam nervorum. Regiomont. 1783. 4.

(**) Таковое доспомяташное явленіе первый подробнѣе описалъ Дан. Шлихпингъ in *Commerc. litter. Norico* 1744. pag. 409. sq. tum vberius à l' Acad. des. Sc. de P. T. I. pag. 113.

Причины же оного чрезъ многочисленныя живоразниманія хорошо изслѣдовалъ Галлеръ, а потомъ ученики его Jo. Dit. Walstorf, *experimenta circa motum cerebri, cerebelli &c.* Goetting. 1753.

Cf. etiam post cl. de la Mure labores, Lorryi de eodem argumento dissertationes in *Mem. presentes* T. III. pag. 277. sq. 344. sq.

(***) Подобнымъ образомъ въ недавнемъ времени имѣлъ случай и я весьма явственно примѣшивъ движеніе оное въ

воз-

ляется въ спановую жилу (*), (me-
dulla

возрасномъ чловѣкѣ и учинить надъ
онимъ опытъ. Чловѣкѣ оный былъ 18
лѣтней юноша, у котораго, какъ онъ
за годъ предъ тѣмъ съ высокаго упалъ
мѣсна и черепную кость выше лба по лѣ-
вую сторону вѣчнаго шва ироломилъ, ве-
ликое отъ того учинилось зѣянiе костей,
одними общими покровами и мягкимъ руб-
цемъ покрытое; которое представляло
какъ бы яму, больше или меньше глубо-
кую; больше глубокую, когда больной
спалъ, больше же ровную, когда онъ
находился въ бдѣнiи; которая взгля-
домъ различнаго дыханiя различна была
такъ, что глубоко опадала, когда я ве-
лѣлъ ему, вшянувши въ себя воздухъ, дер-
жашъ оный въ себѣ, и наоборотъ. Кромѣ
сего среди оныхъ было примѣтно бiенiе
жилъ, прочему бiенiю жилъ по всему со-
временное, которое кажется обмануло Пе-
трiола, Ванделля и другихъ, бывшихъ
нѣкогда противниками Галлеровыми, что
они движенiе оныхъ боевыхъ жилъ съ осо-
бливымъ другимъ, дыханiю единствен-
но соотвѣтствующимъ, смѣшивали.

При семъ можно напомнимъ то, что у
юноши онаго отъ раны, на лѣвой сторонѣ
головы учиненной, рука и нога съ правой
стороны ошнаны были.

(*) Jo. Jac. Huber de medulla spinali. Goetting.
1741. 4. — Icon adiecta redit inter Halleria-
nas fascic. I. tab. II.

Pro-

дѣла (primis), въ гибкомъ спинныхъ позвонковъ каналъ содержащую, и тѣми же покровами облеченную, какими покрывается мозгъ. Она также какъ прочій мозгъ изъ двоякаго состоить существа, съ такимъ только различіемъ, что бѣлое существо оныя объемлетъ непловидное, внутри онаго находящееся.

§. 203. Изъ обѣихъ же источниковъ сихъ, большаго то есть и меньшаго мозговъ, равно какъ и продолговатаго мозга происходятъ на конецъ чувствительныя жилы (nervi) (*), тѣ больше или меньше бѣлые, и больше или меньше мягкіе, канатики, копорые по прочимъ мягкимъ, хотя впрочемъ и не всѣмъ, частямъ тѣла распространяются.

§. 204. Ибо изъ многочисленныхъ опытовъ Г. Галлера и другихъ знаменитыхъ наблюдателей (**) открылось,

О 5

что

Propriae Halleri eiusdem partis icones exstant ibid. fascic. VII. tab. FV. V.

Cl. Monro (fil.) an the nervous system tab. X. fig. 1.

(*) Cl. Martin Or. de proprietatibus nervor. generalibus; praemissa EJ. instit. neurologicis.

(**) v. Haller de partibus c. h. sensibilibus in Commentar. Societ. Scientiar. Goetting. T. I.

&

что не одного рода первоначальныя шѣла нашего часпи находящяся, которыхъ ни прупоразнимашельный ножъ, (*culter anatomicus*) и охраняющій себя отъ всякихъ обманчивостей глазъ настоящихъ слѣдовъ чувственныхъ жилъ, ни наблюденія руководящельной врачебной науки (или Хирургіи) (*), ни пла-

& de iisdem Sermo III. in nov. Comment. Goetting. T. III.

Petr. Castell. experimenta, quibus constitit varias h. c. partes sentiendi facultate carere. Goetting. 1753. 4.

Tum tres integrae collectiones ad ingentes lites facientes, quae super iis scriptis Goettingensibus per uniuersam Europam excitatae sunt. viz.

Sull' insensibilita de irritabilita - dissertazioni, trasportate da J. G. V. Petrini. Rom. 1755. 4.

et quae Hallero ipso curante prodiit f. t. corps humain. Laufann. 1756-59. IV Vol. 12.

Memoires sur la nature sensible & irritable des parties du corps humain. Laufann. 1756-59 IV Vol. 12.

Sull' insensitivita Halleriana opuscoli raccolti da G. B. Fabri Bonon. 1757 - 59. IV. Vol. 4.

(*) Относительно до удивительнаго несогласія или паче противорѣчія о чувствованіи сухихъ жилъ и другихъ, ниже сего упоминаемыхъ, поврежденныхъ часпей въ человѣкѣ, для меня всегда великоважнѣе казались отрицательныя, нежели положительныя утвержденія; потому что ни-

чего

пластанія живыхъ живошныхъ, искусною рукою чинимыя и неоднократно повшоряемыя (*), никакого и никогда чувствованія обрѣсти не могли.

Куды

чего удобнѣе сужденія больныхъ о мѣстѣ внутренней боли вымыслишь не лзя. Ибо, не упоминая о примѣрахъ людей, о коихъ премногія находясь свидѣтельствва, что они жадовались на части давно опияшья, такъ какъ бы на болящія въ настоящее время, вообще видимъ мы больныхъ, жалующихся на мѣстную и постоянную боль какой либо части; которая однакожъ по смерти при вскрытіи трупа оказывается цѣлою и неповрежденною, а вмѣсто оныя другая весьма отдаленная повреждена была, коея досадное чувствованіе больной ошибалъ совсѣмъ къ другому безболѣзненному мѣсту.

Такимъ образомъ кажется мнѣ гораздо удобнѣе можно изъяснить какъ жалобы страдающихъ любоспращною болѣзнію людей на сильную боль въ костяхъ, такъ и противныя тому происшествія, каковыя я самъ примѣтилъ въ людяхъ, коихъ мозгъ при нарочитомъ онаго боженіи и при томъ при свѣдѣніи самихъ ихъ вовсе не производилъ никакого противнаго чувствованія.

(*) Ибо съ дня на день паче и паче удосповѣряюсь въ томъ, сколь великія оспа-

Куды вонѣрвыхъ принадлежитъ кро-
мѣ клѣбичеюй плевы кожа съ Мал-
лигѣеюй плеею , волосами и ногтѣями.

По ней хрящи и кости съ надко-
стною плеею и мозгомъ.

Да-

оспорожности и сколь великаго упраж-
ненія и частаго повѣворенія одного и того
же опыта надъ живошными пошребно ,
въ пошпановлеиіи чрезъ живоразниманія
физіологическихъ правилъ. Ибо когда
я надѣ многими какъ грудью пишю-
щими живошными , такъ и пишцами ,
дѣлалъ опыты; то всегда прошивное ви-
дѣлъ произшествіе. Ибо многія изъ оныхъ
живошныхъ разрушеніе мозга какой ли-
бо круглой кости безъ всякаго признаку
боли сносили; другія напрошивъ того
при шаковомъ же поступкѣ опъ одного
приближенія къ нимъ орудія корчились ,
кричали и прочая. Бышь могло, что онѣ,
будучи заняты страхомъ прошедшихъ
мученій , опъ слабаго и никакого повре-
жденія не причинявшаго приложенія къ
нимъ орудія корчились. Могло так-
же бышь , что нѣкоторыя изъ живош-
ныхъ оныхъ жестокостію прежде бывшей
боли будучи какъ бы обезчувственны ,
легкаго протанія мозга чувствовашь не
могли , хотя впрочемъ онѣ и былъ снаб-
женъ чувствительными жилами.

Далѣ сухія жилы (*tendines*), ихъ разширенія и связи (*aponeuroses & ligmenta*).

Также премногія широкія перепонки, каковыя сунѣ: твердая и паупинная мозговья плевы, подреберная плева (*pleura*), грудостѣнная преграда и сердечный мѣшечекъ (*mediastinum & pericardium*), брюшина (*peritoneum*) и самая даже роговая глазная оболочка (*cornea*), и такъ далѣ.

Многіе также изъ всасывательныхъ сосудовъ, а особливо грудной, питающей сокъ несущій, каналъ (*ductus thoracicus*), дѣтское мѣсто и пуповина (*placenta & funiculus umbilicalis*).

§. 205. Что принадлежитъ до происхожденія чувствительныхъ жилъ изъ мозга или общаго чувствилища; то ихъ ни помощію ножа, ни быстрой глазу изслѣдовать не можно; да и по сѣ время еще споръ не рѣшенъ, съ той ли стороны мозга чувствительныя жилы начало свое воспріемающъ, на которой онѣ находятся, или противнымъ тому образомъ происходятъ (*)? Последнее мнѣніе

(*) *Diversas de eo argumento Auctorum sententias studiose collectas exhibet cl. Lattus sur les découvertes faites en Anatomie. Par. 1773. 3. 8. pag. 292. fq.*

ніе кажется подтверждающъ многія болѣзненные явленія (*). Да и въ недавнемъ времени доказалъ Г. Симмерингъ (**), что зрительныя чувствительныя жилы точно пересѣкаются между собою.

§. 206. Мозжечекъ чувствительныхъ жилъ въ ихъ теченіи (***) сопровождаетъ нѣкоторое продолженіе мягкой исподней мозговой оболочки, составляющей самой его сосудистой покровъ (****). Но какъ скоро выдущъ онѣ изъ мозга или спановой жилы; то пріемлютъ совсѣмъ другой видъ, которымъ могутъ онѣ оплестись отъ всѣхъ почти другихъ первоначальныхъ частей шѣла, то есть показывающъ видъ поперегъ распростертыхъ сгибовъ, больше или меньше косоугловатыхъ, которые не несправедливо Г.

(*) Cf. Mein Sim. du Pui de homine dextro et sinistro LB. 1780. 8. pag. 107 sq.

(**) Hessische Beyträge zur Gelehrsamkeit P. I. et IV. it. F. N. Höthig. (praef. Sömmerring.) de decussatione nervor. opticor. Mogunt. 1786. 8.

(***) Cf. cl. Pfeffinger de structura nervorum. Argent. 1782. 4.

(****) Gul. Battie de principiis animalibus. Lond 1757. 4. pag. 126.

Г. Молинеэль (*) давно уже сравнивалъ съ морщинами земляного червя, или съ колечками дыхательнаго горла.

§. 207. Чувствительныя жилы, а наипаче особливаго порядка, каковыя суть между-реберныя и скипающіяся, вездѣ имѣютъ сплешенія (Ganglia), то есть узлы строенія плотнаго, цвѣту же изъ сѣробѣловаго, которыхъ однакожъ употребленіе еще не совершенно доказано. Всѣхъ же прочихъ больше кажется для меня мнѣніе (**) Г. Зиннія, который полагалъ, что узлы оныя способствуютъ къ соединенію, и какъ бы сплешенію чувственожилыхъ нитей, изъ различныхъ источниковъ происходящихъ и въ помянутыхъ узлахъ соединяющихся, такъ что каждая нить, изъ нихъ выходящая, имѣетъ уча-

(*) Comment. instituti Bononiens. T. III, 1755. p. 282 sq. fib. 1. 2.

Quam Molinelli observationem nuper confirmarunt & vltro ornarunt cl. viri Fel. Fontana & Al. Молро: hic opere saepius citato; ille Tr. sur le venin de la vipere. Flor. 1781. 4. Vol. II.

(**) Mém. de l' Acad. des Sc. de Berlin Vol. IX. 2. 1753.

участіе (*) въ нитяхъ, прежде въ узлы вшедшихъ и тамъ соединившихся.

§. 208. Не много чѣмъ различествуютъ отъ чувствительножилъ узловъ и сплетенія чувствительныхъ жилъ (plexus), которыя воспріемлютъ начало свое отъ подобнаго первымъ сплетенія и сѣти подобной видъ имѣющаго соустья различныхъ чувствительныхъ жилъ, и таковаго же соединенія шѣхъ нитей, на которыя онѣ опять раздѣляются и по шѣлу распространяются.

§. 209. Впрочемъ какъ первыя происхожденія чувствительныхъ жилъ, такъ и ихъ, хотя въпрочемъ и не всѣхъ, послѣднія крайности, которыми оканчиваются ихъ конечныя отрасли, еще и по сіе время находятся въ неизвѣстности. Ибо естли исключить не многія чувствительныя жилы, кои перемѣняются какъ бы въ мозжечную перепонку, куды по справедливости относятся зрительныя чув-

(*) Conf. post alios de gangliis ex professo agentes cl. Haase de iis diff. Lips. 1772. 4.

Jo Cavernill Tr. of ganglions Lond. eod. 8.

Cl. Scarpa anatom. annotat. L. I. de perneur. gangliis & plexibus. Mutin. 1779. 4.

Cl. Meckelke de functione nervorum Vindob. 1736. 8. H. cl. Meckel 1. 3.

чувствительныя жилы (nervi optici), въ сѣтчатая глазныя плевы превращающіяся, и мягкая часть седьмой пары чувствительныхъ жилъ, въ поясъ (zona), въ винтообразныхъ пластинкахъ ушнаго блока содержимый, перемѣняющаяся, прочихъ чувствительныхъ жилъ послѣднія нити, во внутренности, мышцы, кожу и прочая вселяющіяся, и весьма тѣсно съ ихъ составомъ смѣшивающіяся, превращаются какъ бы въ нѣкоторый макишъ или нѣкоторое густоватое мягкое вещество (pulpa) такъ, что на послѣдокъ во все невидимыми учиняются.



ОТДѢЛЕНІЕ XVI.

О дѣйствіяхъ чувствительныхъ жилъ вообще (de functionibus nervorum in universum)(*).

§ 210. И такъ мы видѣли, что изъ чувствилища и чувствительныхъ жилъ, отъ него проихоющихъ и по всему тѣлу разпростирающихся, состоитъ цѣлая связь, то средство составляющая, помо-

II

цію

(*) Cf. ad universam hancce sectionem praeter numerosos alios, passim iam citatos, aut infra nominandos:

щю котораго союзъ между душою и тѣломъ де тѣхъ поръ сохраняется (*), пока продолжается жизнь.

§. 211. И подлинно кажется, что душа съ тѣломъ весьма тѣснымъ соединена союзомъ, каковое его преимущество какъ близость къ нему многихъ чувствительныхъ орудій, такъ и удивительное его изъ особливаго вида и строенія частей составленіе, а наипаче дѣйствія болѣзненныхъ его припадковъ, весьма справедливою учиняютъ.

§. 212. Да и нѣкоторые Физіологи упомянутымъ онымъ мозга видомъ и его положеніемъ, утверждаясь болѣе надлежащаго на своихъ умозаключеніяхъ, такъ обманулись, что сію или другую часть мозга силились учинить обиталищемъ души. По сему-то одни старались учинить таковымъ обиталищемъ души остроглавную

cl. Tissot Tr. des nerfs & de leurs maladies T. I.

C. Stuart de Systematis nervosi officii. Edinb. 81. 8.

cl. Prochaska adnotat. Academic. fasc. III. sect. I.

(*) V cl. Jo H. Rahn Exercit. de causis physicis sympathiae I. (de miro inter animi & c. consensu) Turig. 1786. 4.

вную (*) въ мозгѣ железу (*glandula pinealis*), другіе малый мозгѣ (*cerebellum*), иные мозолистое (**) въ мозгѣ шѣло, (*corpus callosum*); иные на концѣ шакѣ называемый Вароліевѣ мостикѣ или перемычку въ мозгѣ (*pons Varolii*).

§. 213. Однакожѣ не должно думать, якобы сила и дѣйствіе всѣхѣ вообще чувствительныхѣ жилѣ единственно отѣ мозга зависѣла, но шакже и спановая жила, да и самыя чувствительныя жилы имѣющѣ собственныя свои силы

П 2

шакѣ,

(*) Карпезіеву положенію казался при-
давали нѣкоторую важность вскрыванія
сумашедшихѣ людей, въ коихѣ железа
ея камнями исполненною найдена бы-
ла. Однакожѣ испытаніе наблюденіе
показало, что не только въ сумашедшихѣ,
но и въ самыхѣ здоровыхѣ людяхѣ, хо-
тя и не всѣхѣ съ 12 почти года желе-
за оная какѣ бы Маргаритнымѣ хрящемѣ
исполняется. Cf. с. Sömmerring de lapillis
vel prope, vel intra glandulam sitis, s. de
aservulo cerebri. Mogunt. 1785. 8.

(**) Какѣ малаго мозга, шакѣ и мозоли-
стаго шѣла вымышленныя оныя преиму-
щества мужественно отпринулъ Г. Зин-
нѣй: *Experim. circa corpus callosum, cerebel-
lum, duram menigem in vitis animalibus
institut.* Goetting. 1759. 4.

ипакъ, что довольны суть къ приведенію въ движеніе мышцъ, къ сохраненію и утвержденію копорыхъ силъ кажется споспѣшествуетъ сосудистая оныхъ орудій корка (§. 205); однакожъ человекъ меньше имѣетъ такихъ собственныхъ силъ чувствительныхъ жилъ, нежели другія животныя, а особливо холодную кровь имѣющія, но большею частію зависятъ онѣ отъ мозга.

§. 214. Двоякая же есть всѣхъ чувствительныхъ жилъ должность. Одна то есть, чтобы помощію оныхъ прочія части шѣла, а наипаче мышцы, воли подлежащія, возбуждались къ движенію, о чемъ въ другомъ мѣстѣ пространство говорено будетъ; другая, чтобы имъ споспѣшествовать къ чувствованію, и ощущаемыя впечатлѣнія, шѣлу причиняемая, подобно нѣкоторымъ вѣспникамъ сообщать чувствилищу и производить въ ономъ понятія и такъ далѣе.

§. 215. Кромѣ сего мозгъ или общее чувствилище (*Sensorium commune*) имѣетъ еще способность, что чувствованія отъ жилъ чувствительныхъ, надъ нимъ дѣйствующихъ, причинаемая, не только къ имъ же самымъ, но и другимъ чувствительнымъ жиламъ

ламъ относитъ и взаимнообразно надъ ними дѣйствовать можеть. Для подтвержденія чего довольно представить дѣйствіе надъ мозгомъ сѣтчатой оболочки въ глазъ (retina), сіяніемъ свѣта поражаемой, мозга же взаимнообразное споспѣшествованіе либо къ сжиманію, либо къ разширенію радужной глазной оболочки (iris).

§. 216. И поистиннѣ изъ сего послѣдняго источника какъ воображенія и душевныхъ спрасней множайшія дѣйствія надъ человѣческимъ тѣломъ, о коихъ ниже сего говорено будетъ, такъ и всей связи чувствительныхъ жилъ, по всему тѣлу разпростершихъ, многообразное согласіе (*) (§. 54) и удивительное надъ всѣми почти тѣлоустройства животного оппавленіями могущество и силу ихъ производить можно.

II. 3

§. 217.

(*) G. Egger (auctore Laur. Gasser praestantissimo) de consensu nervorum. Vindob. 1766. 8. recuf. in cl. Wasserberg collect. fasc. II.

Cf quoque cl. Camperi de consensu nervorum egregias observationes, insertas commentario cl. Coöpmans in Al. Monro (patr.) tract. de nervis. Harling. 1763. 8.

It. cl. Isenflamm. Verf. einiger praktischen Anmerk. über die Nerven. Erlang. 1774. 8. pag. 116 sqq. & alias.

§. 217. А что все, мною сказанное объ отправленіяхъ и дѣйствіяхъ чувствительныхъ жилъ, есть истинно; сіе опытъ и вѣрнѣйшія наблюденія подтверждаютъ. Но узнать способъ, какъ сіи орудія отправляютъ свои должности, есть дѣло трудное.

§. 218. Вообще же изъ разныхъ о семъ мнѣній главнѣйшія избрать можно: изъ коихъ первое полагаетъ дѣйствіе чувствительныхъ жилъ въ прясущемся движеніи, въ задъ то есть и передъ производимомъ (*motus oscillatorius*); а другое въ движеніи нѣкоторой жидкости, о свойствѣ которой еще и теперь спорятъ Физіологи, изъ коихъ иные называютъ жидкость оную жизненными соками (*), (*spiritus animales*), иные почитаютъ ее за огненное или электрическое, либо и самое магнитное существо, и такъ далѣе.

§. 219. Впрочемъ хотя я ни одного изъ мнѣній сихъ принять не могу; однакожь могу сказать, что премногія оныя доказательства, коими одного какого либо положенія послѣдователи другое опровергнувъ старались, столько же для меня ка-

(*) Cf. cl. Michelitz *scrutinium hypotheseos spirituum animalium*. Prag. 1782. 8.

кажутся бытъ грубыми, сколько напрошивъ того должны бы бытъ тонкія, ежели шолько есть какія, прясенія оныя чувствительныхъ жилъ, или соки, въ нихъ содержимые.

§. 220. Да и кажется мнѣ, ежели не ошибаюсь, что оба мнѣнія сїи вмѣстѣ приняты бытъ могутъ, то есть нѣкошорая жидкость, дѣйствіемъ надъ нею какихъ либо побужденій приходящая въ движеніе, и равноспоятельное движеніе чувствительныхъ жилъ (*motus sive vibratio oscillatoria*).

§. 221. Ибо присудствіе жидкости въ чувствительныхъ жилахъ кромѣ прочихъ примѣровъ доказываетъ еще чувствительныхъ жилъ, а особливо мозга, съ прочими ошдѣляющими внутренностями довольно сходное устройство; однакожъ изъ сего не слѣдуетъ заключить, яко бы находились въ мозгѣ какія либо трубочки или каналцы, коими жидкость оная должна протекать чрезъ чувствительныя жилы, такъ какъ не находишь таковыхъ каналцовъ въ обертошной бумагѣ, или другомъ какомъ либо рѣшетчепомъ (*filtrum*) шлѣ и прочая.

Кольми же паче не слѣдуетъ заниматься тщетными изчисленіями шой скоро-

скорости, съ которою, какъ обще думали, жизненные соки въ чувствительныхъ жилахъ спреляются и чрезъ нихъ протекають.

§. 222. Чшоужъ до прясенія чувствительныхъ жилъ, ежели шокмо не сравняшь онаго съ прясеніемъ какихъ либо спрунъ, сильно напханурыхъ, но представлять оное такимъ, каковое можетъ приличесшовать нѣжному спроенію мозга; шо кажешся многія фізіологическія явленія подтверждають оное. Ибо довольно ясно доказано, что слышаніе производится чрезъ посредство дрожанія или колебанія. Вѣроятно также, что и видѣніе производится такимъ же образомъ, хотя впрочемъ и все шо справедливо естъ, что Г. Еллеръ говоривъ касательно онаго. А что шакимъ почти образомъ производится дѣйствіе и другихъ чувствъ, сіе кромѣ догадокъ (*) о шомъ великаго Невтона, довольно доказываютъ еще и шѣ славные успѣхи, коими Г. Гаршлей съ великою

(*) V. EJ. Quaestiones ad calcem optices. Qu. 23. p. 355. ed. Lond. 1719. 8.

вѣроятностію (*) сперва изъяснилъ при-
соединеніе понятій однѣхъ къ другимъ,
потомъ чрезъ посредство онаго изо-
бразилъ и другихъ душевныхъ спосо-
бностей премногія отправленія.



ОТДѢЛЕНІЕ XVII.

*О внѣшнихъ чувствахъ вообще, и въ осо-
бенности объ осязаніи (de tactu).*

§. 223. Другое дѣйствіе или отпра-
вленіе чувствительныхъ жилъ, какъ
выше видѣли, состоитъ въ томъ, чтобы
доспавлять чувствителю впечатлѣнія
внѣшнихъ предметовъ. Что производит-
ся помощію внѣшнихъ чувствъ, кои суть
какъ бы хранители тѣла, и наставники
души нашей.

О каковыхъ единственно чувствахъ
я здѣсь говорю намѣренъ. Ибо от-
носите сюда побужденія къ испражненію
желудка или вождѣніе пищи (fames),
и другія симъ подобныя внутреннія по-
бужденія природы, по давиѣйшему уже на-

Р

по-

(*) Day. Hartleys observations on man, his
frame, his duty and his expectations. Lond.
1749. II. Vol. 8.

номинанію Г. Галлера, будетъ дѣло тонкаго шокмо, а не нужнаго разсужденія.

§. 224. Дѣло достопамятно, что нѣтъ въ шѣлоустройствѣ живошныхъ ни одного такого отдѣленія дѣйствій, шолкой перемѣнѣ въ разныхъ людяхъ подлежащаго, какъ то состояніе чувствъ, о которыхъ здѣсь говоримъ. Между которыми безконечное почти находится различіе, какъ въ разсужденіи острошы, такъ шонкости и способъ, которыми онѣ отъ шѣхъ же самыхъ поощреній въ однихъ сіи, а въ другихъ совсѣмъ другія производятъ впечатлѣнія; каковое различіе бываетъ какъ врожденное (*), такъ

и

(*) Такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ людяхъ, остро въпрочемъ чувствующихъ, бываетъ такое особливое расположеніе, что отъ одного или другаго вида раздраженія, для другихъ довольно чувствительнаго, вовсе не чувствуютъ въ себѣ никакой досады. Я зналъ одного Агличанина, имѣвшаго острыя чувства и изящныя душевныя дарованія, а наипаче острое обоняніе, который хотя не нюхалъ табаку, однако въ цвѣтахъ рѣпишниковыхъ (*gefeda odorata*) никакого запаха ощущать не могъ. Объ обыкновенныхъ примѣрахъ такихъ людей, кой сего или другаго цвѣша различать не могутъ, я не упоминаю.

и прижилое или привычное, употребленіемъ то есть и упражненіемъ пріобрѣтенное. (*habitualis diverſitas*).

§. 225. И такъ не несправедливо поступимъ, когда при изчисленіи внѣшнихъ чувствъ, начнемъ сперва говорить объ осязаніи (*de tactu*), потому что оно всѣхъ прежде въ рожденномъ на свѣтѣ человѣкѣ показывается, и орудіе снато по всей поверхности тѣла распространено, помощію котораго человѣкъ гораздо больше свойствъ внѣшнихъ предметовъ испытывать можетъ.

§. 226. Ибо посредствомъ осязанія не только узнаваемъ нѣкоторые только качества вещей, какъ на пр. теплоту, твердость, мягкость, тяжесть и прочая, но еще извѣщаемся и о такихъ, кои хотя и другимъ подлежатъ чувствованію; однакожъ чрезъ осязаніе становящіяся гораздо явственнѣе, каковыя на пр. суть: начертаніе (*figura*), разстояніе и такъ далѣе.

§. 227. Кромѣ сего осязаніе гораздо меньше прочихъ чувствъ подлежащихъ обманамъ; и чрезъ упражненіе до такой степени доходитъ, что бываетъ въ состояніи нѣкоторымъ образомъ попол-

нѣтъ (*) недостатковъ другихъ чувствъ, а наипаче видѣнія.

§. 228. Вообще же органомъ или орудіемъ (**) чувства сего поставляется кожа (cutis), о строеніи которой выше сего говорено было; ближайше же споспѣшествующѣ къ оному накожные чувствительныя сосочки, на разныхъ частяхъ тѣла различной видѣ имѣющія, а наипаче сосочки, бородавкѣ (***) подобныя, кои индѣ бывающѣ грибочныя (****), а индѣ на ниши (****) похожія и прочая, помощію коихъ конечности кожныхъ чувствительныхъ жилъ наподобіе мягкихъ кисточекъ окончиваются.

§. 229. Главнѣйшими же орудіями осязанія паче прочихъ поставляются руки (manus), коихъ кожа предѣ прочею совсѣмъ
отп-

(*) Cf. cl. Rol. Martin in Schwed. Abhandl. Vol. XXIX. a. 1777.

(**) E. De Riet de organo tactus. LB. 1743. 4. recu. in Halleri collect. anat. T. IV.

(***) Dav. Corn. de Courcelles icones musculor. capitis tab. I. fig. 2. 3.

(****) B. S. Albini annotat. Academ. L. III. tab. IV. fig. 1. 2.

(*****) Ruyfch thes. anat. III. tab. IV. fig. 1. thes. VII. tab. II. fig. 5.

B. S. Albinus l. c. L. VI. tab. II. fig. 3. 4.

опмѣнную имѣетъ особенность. То есть на ладоняхъ и на членосоединеніяхъ пальцевъ по обѣимъ сторонамъ для удобнѣйшаго згибанія кожа есть бороздчатая и безволосная; а конечности какъ ручныхъ, такъ и ножныхъ пальцевъ, съ исподимѣютъ весьма изящныя бразды, больше или меньше выпя (*); сверху ногтями, какъ бы нѣкими щипами, покрытая.

§. 230. Таковыя щипообразныя ногти (**) даны только человѣку и немногимъ грудью питающимся животнымъ, кои то есть также имѣютъ руки и хорошее (***) осязаніе, въ шѣмъ намѣреніемъ, дабы они сопрошивлялись давленію осязающихъ пальцевъ, и такимъ образомъ поспѣшествовали дѣйствію оныхъ.

Р 3

Ног-

(*) Grew in philos. Transact. n. 159.

(**) B. S. Albinus annotat. Acad. L. II. tab. VII. fig. 4. 5. 6.

(***) Наипаче просшья обезьяны, Павіаны, Лорисы или длинноползающія обезьяны (lemures). и многія изъ малыхъ Пановъ (segorittes), у коихъ всѣхъ концы пальцевъ на четырехъ ихъ рукахъ суть мягкіе и подобно человѣческимъ перстамъ выпятыми линіями раздѣленные.

Ногти суть рогового свойства, кои однакожъ съ кожицею сравнишь должно: ибо какъ Малпигіева сѣпочка подъ оными находится, копорая у Араповъ есть чернаго цвѣща, (*) такъ на концѣ обрѣщается подъ оною и кожа, крѣпко соединенная съ надкостною плевою конечныхъ рядовъ (phalanges) перстовъ: всѣ которыя составныя части ногтей звѣздообразно проведены въ длину; и заднимъ краемъ, который на рукахъ полулуіемъ означаетъ, сидятъ въ бороздочкѣ завороченной опшуда кожи, почему они, всякой день понемногу умножаясь, такъ подаются впрочемъ непримѣннымъ намъ образомъ въ передъ, что всякіе полгода со всѣмъ почти новые вырастаютъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XVIII.

О вкусѣ (de gustu)

§. 231. Всѣ роды вкусовъ ощущаются на языкъ и другихъ ближайшихъ къ нему кожею покрытыхъ частей во рту; а наипаче неба (palatum), щекъ и зевовъ, а иногда

(*) B. S. Albinus de habitu et colore Aethiopum fig. 3.

гда и самыхъ губъ, кои однакожъ части тогда только вкусъ ощущать могутъ, когда вкусныя вещи бывають очень остры и горьки (*).

§. 232. Самымъ же первымъ орудіемъ вкуса (*gustus*) почищается языкъ (**) (*lingua*), который есть весьма легокъ, гибокъ и удобопріемлющій разные виды; имѣющій достойное удивленія мясистое строеніе, которое нѣкоторымъ образомъ съ строеніемъ сердца сравнять можно.

§. 233. Языкъ покрытъ кожъ подобными покровами; то есть тоненькою плѣвочкою (*epithelium*), служащею ему вмѣсто кожицы; Малпигіевою (***) съплетеною оболочкою (*reticulum Malpighii*), и на концѣ чувственно-сосочною плевою, (*papillosa*), коея строеніе мало чѣмъ различается отъ строенія кожи.

Р 4

§. 234.

(*) Grew's anatomy of plants p. 284. fq.

Cl. Petr. Luchtman's de saporibus et gustu.

LB. 1758. 4. p. 58 fqq.

(**) Malpighii et Fracassati epistola de lingua.

Bonon. 1665. 12.

(***) У собакъ и овецъ, а наипаче пестрыхъ, я видѣлъ языкъ и зевы разноцвѣтною плевою покрытыя.

§. 234. На языкѣ примѣчается та разность, что покрывающая его тонкая плева вмѣсто шука, умащающего кожу, увлажняется и умащается склизью, изъ глухой Меибовой дыры (*) и прочихъ, вездѣ разсѣянныхъ, Моргагновыхъ (**) железъ, истекающею. Отъ прочихъ частей шѣла еще и шѣмъ различествуетъ языкъ, что чувствительныя сосочки имѣетъ туповидныя, коническія и какъ бы на ешебелькахъ висящія; (***) изъ коихъ первыя въ весьма маломъ количествѣ обрѣщаются наподобіе полулуція около корня языка насажденными, а прочія различной величины сосочки смѣшенно по поверхности языка, и особливо края и его конецъ, гдѣ то есть самое большее бываетъ ощущеніе вкуса, усаждающіе (****).

§. 235.

(*) Cf. Just. Schröder observat. et histor. e Harvaei L. de generat. animal. p. 186.

(**) Morgagnii adversar. anat. prima tab. I.

(***) Ruysch thes. anat. I. tab. IV. fig. 6.

B. S. Albini annotat. Acad. L. I. tab. I. fig. 6-11.

(****) Cf. Halleri egregia Linguae hominis vivae descriptio in Diction. Encycloped. ed. Ebrodun. Vol. XXII. p. 28.

§. 235. И въ сѣи - по сосочки все-
ляются конечныя нити язычной чув-
ствительной жилы, отъ пятой пары
(*) происходящей, изъ печенія конхъ
правдоподобнымъ кажется, что мы по-
мощію ихъ ощущаемъ вкусы.

Ибо девятая пара (**) чувстви-
тельныхъ жилъ, и входящая также въ
языкъ въ нѣтъ осьмой пары (***), кажется
больше споспѣшествующей къ многораз-
личнымъ движеніямъ языка, какъ - то,
жеванію, глотанію, произношенію рѣчи
и прочая, нежели къ ощущенію вкусовъ.

§. 236. Однакожъ должно, чтобы
языкъ для надлежащаго ощущенія вкусовъ
былъ всегда влаженъ, а вкушаемая су-
щества были жидки и исполнены уже
растворенными соляными часпицами(****);
ибо ежели самый языкъ, или пола-
Р 5 гае-

(*) Jo. Fr. Meckel de quinto pari nervorum ce-
rebri. Goetting. 1748. 4. pag. 27. fig. I. n. 80.

(**) Cl. Jo. F. w. Böhmer de nono pari nervo-
rum cerebri. Goetting. 1777. 4.

(***) V. Haller icon. anatom. fasc. II. tab. I.
lit g. cl. Monro on the nervous system, tab.
XXVI.

(****) Bellini gustus organum novissime depre-
henfum. Bonon. 1665. 12.

гаемыя на него вещества будутъ сухи; то въ такомъ случаѣ должно сказать, что онъ помощію осязанія, каковымъ онъ паче прочихъ частей отъ природы снабженъ, а не пособіемъ вкуса узнаваетъ свойства оныхъ.

Но когда языкъ имѣетъ чрезвычайный вкусъ, то чувствительныя сосочки, конецъ и края онаго усаждающія, подлинно нѣсколько приподнимаются въ верхъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XIX.

О обонянїи (de olfactu).

§ 232 Обоняніемъ ощущаемъ мы благовонныя изъ шлѣвъ изпеченія (effluvia), кои, будучи втянушы въ ноздри, поражающъ ту наипаче часть Шнейдеровой (*) (Schneideriana)

обо-

(*) Corn. Vict. Schneider de offe cribriformi et sensu ac organo odoratus. Vitteb. 1655. 12. Какое сочиненіе въ повѣствованїи чловѣкословія какъ бы нѣкоторую соспавляетъ эпоху не только потому, что первый онъ надлежаще опредѣлилъ въ немъ дѣйствіе обонянїя, но наипаче потому, что онъ мечтанїя древнихъ объ орудїи ономъ, якобы оно было чистилицемъ мозга, совершенно опровергнулъ.

оболочки, которая обѣ стороны носовой преграды и выпуклыя раковины носовыхъ поверхности облекаетъ.

§. 238. Ибо хотя и всѣ внутреннія (*) части ноздрей ближайшими къ онымъ пазухами (**), въ нихъ отверзающимися, подобною же влажною покрываются плесою; однако кажется, что она въ разныхъ сихъ мѣстахъ имѣетъ разное расположеніе и свойство.

Ибо та часть оболочки, которая принадлежитъ къ ноздрямъ, есть прочихъ сходственнѣе съ обыкновенною кожею, и какъ самыми железами, такъ и волосами, изъ нихъ рождающимися, усѣяна обрѣшается. Приросшая же къ преградѣ и раковинамъ носовая плева есть грибочетая и многими склизепочными пещерками исполнена.

На конецъ та, что покрываетъ внутренность пазухъ лобныхъ, клинообразныхъ, рѣшетчатыхъ и челюстныхъ костей, есть весьма нѣжная, безчисленными

(*) Sam. Aurivillius de naribus internis. Upsal. 1760. 4.

(**) Cf. Halleri icones anat. fasc. IV. tab. II.
Duverney oeuvr. anatom. Vol. I. tab. XIV.
Santorini tab. posth. IV.

ными кровеносными, росѣ подобную влагу изшочающими, сосудами усажденная.

§. 239. Что до пазухъ оныхъ, то главнѣйшее, или и единственное ихъ употребленіе кажется есть то (*), чшобы имѣ доставлять шакую водяную влажность, которая бы изливаясь прежде въ оныя при пробока ноздрей, опшуда мало по малу низшекала къ ближнимъ вышепомянутымъ обонянія орудіямъ и, орошая ихъ безпрестанно, доставляла имѣ ту влажность, безъ которой не можешъ обойтись остроша обонянія.

Для каковаго конда шакъ расположены сущъ различныя оныя пазухи, что въ какомъ бы положеніи ни находилась голова, однакожъ влажность оная изъ одной или другой пазухи можешъ низшекать въ орудіе обонянія.

§. 240.

(*) Ибо что сїи пазухи больше обонянїю, нежели какому либо произношенїю голоса и рѣчи служатъ, (какъ многіе думали Физїологи), сїе доказалъ я многими причинами (*prolus. de finibus frontalis. Goetting. 1779. 4.*), какъ изъ коснесловїя, шакъ сравнительнаго шруппоразниманїя и другихъ болѣзненныхъ явленїй почерпнувшими.

§. 240. Грибчатая же, какъ выше упомянуто, часть носовой пазухи, которую по естѣ мы больше обоняемъ, кромѣ того, что также безчисленнымъ множествомъ кровеносныхъ сосудовъ усѣяна, потому единственно примѣчанія достойна, что ни одна часть еѣла сполько не подвержена кровотеченіямъ, какъ она. Она имѣетъ еще и чувствительныя жилы, какъ первой пары (*), такъ и двѣ вѣточки пятой пары, изъ коихъ первыя только служатъ обонянію (**), а прочія общему оныхъ частей чувствованію, которое на пр. производитъ чиханіе и прочая,

§. 241.

(*) Cl. Metzger nervorum primi paris historia. Argent. 1766. 4. recens. in cl. Sandifori thesauro Vol. III.

Cf. cl. Monro on the nervous system tab. XXIV.

(**) Cf. cl. Loder, observatio tumoris scirrhusi in basi cranii cerebri. Jen. 1779. — 4. гдѣ представляетъ повѣствованіе о лишеніи обонянія (anosmia), послѣдовавшаго за сдавленіемъ первой пары чувствительныхъ жилъ. Кому можно противопоставить примѣчаніе Ив. Мери, который видѣлъ тѣ же самыя жилы поврежденными при цѣлости впрочемъ

обо-

§. 241. Что до конечностей оной первой пары; то онѣ не такъ какъ въ орудіяхъ осязанія и вкуса имѣютъ свое окончаніе, то есть не въ сосочки перемѣняющіяся, но кажется, какъ будто распускаются въ грибоватое кровопродѣ-живающее существо.

§. 242. Орудія обонянія въ новорожденныхъ суть шѣсны и несовершенны. Наипаче же почти никакихъ не находится въ нихъ вышеупомянутыхъ пазухъ; по чему они и обоняніе получаютъ позднѣе, тогда то есть, когда ноздри внутри въ надлежащее придутъ совершенство и стройность, которое обоняніе шѣмъ скорѣе

обонянія. Причины же, побудившія меня наибольшее споспѣшествованіе къ обонянію приписать первой парѣ, суть почерпнуты изъ сравнительной Анапоміи, то есть изъ разнѣманія шѣлъ самыхъ проницательныхъ млекопитабельныхъ животныхъ, коихъ черепы я имѣю у себя какъ то: Слона, Медвѣдя, Собаки, Быка, Ежа и проч. въ коихъ горизонтально проведенная пластинка рѣшеткообразной кости очень широкая и многими дырочками прободенная.

рѣе бываетъ, чѣмъ пространнѣе и совершеннѣе орудія (*) оныя бываютъ.

§. 243.

(*) Ибо какъ млекопитающія животныя, предъ прочими большее обоняніе имѣющія, каковыя выше сего упомянуты, суть снабженны весьма пространнымъ обонянiя орудіемъ, такъ и между породами чело-
вѣковъ нѣкоторые варварскіе проница-
тельные народы имѣютъ кажется про-
спраннѣйшія орудія обонянiя.

Черепъ Идѣйца Сѣверной Америки, ко-
торый за 30 предъ симъ лѣтъ въ (Фи-
ладельфiи казенъ былъ, копорый черепъ
я отъ Михаила получилъ въ свое чело-
вѣческихъ череповъ собраніе, имѣлъ внутри
весьма проспранныя ноздри такъ, что
среднія раковины или витыя косыи пред-
ставляли какъ бы надуныя проспран-
нѣйшіе пузырьки, въ коихъ особливыхъ
пазухъ, прежде всѣхъ Санкторіемъ при-
мѣченныхъ, столь великихъ никогда не
видалъ.

Почти такое же пространство имѣ-
ютъ внутренности ноздрей у Араповъ,
коихъ я имѣю при черепа хотя и раз-
личные между собою, однако довольно
проспранныя обонянiя орудія имѣющія,
каковыя въ нѣхъ людяхъ примѣтилъ и
Симмерингъ. über die körperl. verschiedenh.
des Negers &c. pag. 22.

Сіе

§. 243. Впрочемъ замѣчанія достойно то, что нѣтъ ни одного такого внѣшняго чувства, которое бы столько великое согласіе и какъ бы нѣкое владычество надъ чувствилищемъ и внутренними чувствами имѣло, какъ обоняніе.

Нѣтъ, говорю, никакого чувства больше подверженнаго особливымъ нѣкоторымъ расположеніямъ; нѣтъ никакого удобнѣе какъ къ причиненію, такъ и удаленію обмороковъ и прочая.

Нѣтъ также никакого чувства столько удобнаго къ ощущенію нѣжныхъ и пріятныхъ впечатлѣній, какъ обоняніе; такъ что Руссавъ весьма справедливо называлъ обоняніе *чувствомъ воображенія* (*sensus imaginationis*) (*).

И

Сіе самое подтверждающъ повѣствованія и разныхъ достоверныхъ свидѣтелей.

Объ Индейцахъ Сѣверной Америки послѣ прочихъ хорошо писалъ Урлспергеръ Nachr. von der Großbritann. Colonie Salzburg. Emigranten in America Vol. I. p. 862.

De Aethiopibus vero v. Journal des Savans a. 1667. p. 60.

(*) Emile T. I. pag. 367.

И кажется, что никакіе другіе виды чувствованій не рождаютъ столь живаго воспоминанія, какъ шѢ, кои особенными нѣкоплыми запахами приводятся на память.



ОТДѢЛЕНІЕ XX.

О слухѢ (*de auditu*).

§. 244. ЗвонѢ, дрожливымѢ другѢ о друга ударомѢ упругихѢ шѢлѢ произведенный и по воздуху разліянный, такѢ ощущается слухомѢ (*), что прежде улишководнымѢ хрящевымѢ виѢшнимѢ ухомѢ (**), у немногихѢ

С

гихѢ

(*) Cf. praeter tritissima Duvernei, Valsalvae et Casselbohmi de auditus organo scripta

J. Mery ap. Lamy explication des fonctions de l'ame sensitive. Paris. 1683. 12.

Vicussens de la structure de l'oreille Tolos.

1714. 4.

B. S. Albini annotat. Acad. L. IV. tab. I. II.

Le Cat theorie de l'ouie. Paris. 1768. 8.

Cl. Monro on the nervous system tab. XXVII.

XXXI.

(**) B. S. Albini annotat. I. IV.

гихъ изъ людей подвижимымъ (*) будучи воспріятъ, попомъ помощію ушной раковины собранъ и въ слуховой проходъ, желшою горьковашою машеріею (*amaricans aurigo*) умащенный (**), опнесенъ, поражаетъ барабанную перепонку (*membrana tympani*), наклонно расположенную, и какбы въ колѣпчешой бороздочкѣ височной кости утвержденную, копорая (перепонка) отдѣляетъ проходъ оный отъ средней внутренности уха.

§. 245. Позади барабанной перепонки находится середина уха или барабанная полость (*cauit tympani*), такъ устроенная, что дномъ вверхъ и при томъ внутрь обращенною находится.

Она содержитъ въ себѣ три (***) слуховыя косточки, изъ коихъ внѣшняя,
то

(*) V. Jo Rhodius ad Scribon. Largum p. 44 fq.

Jo. Alb. Fabricius de hominibus ortu non differentibus. Opusculor. pag. 441.

(**) Cf. Jo. Haugart in medical observ. and Inquiries Vol. IV.

(***) Ибо что четвертой косточки, со временъ Фран. Сильвія обыкновенно чечевичною (*lenticulare ossiculum*) называемой, ежели

то есть молошокъ (malleus) рукояткою своею соединяется съ барабанною перепонкою; опросткомъ заостреннымъ и въ передъ обращеннымъ, въ возмужаломъ челоуѣкѣ по большой части къ выше помянутой бороздочкѣ приростаеиъ; шаровидною же головкою своею совокупляеиъся съ шѣломъ наковальни (incus).

Самая же наковальня помощію длиннаго внѣшняго опростка своего, простирающагося почти до середины барабанной полосиы, соединяется съ головкою спремена (stapes), то есть косточки, видѣ спремена имѣющей.

А спремено, утверждаясь основаніемъ своимъ на продолговатой круглой дырѣ, яйцеобразнымъ окномъ называемой (foramen ovale), обращается видомъ къ преддверію Лавиринеа, куды звонъ, удаляющійся въ барабанную перепонку, помощію трехъ сихъ слуховыхъ косточекъ простираеиъся.

С 2

ф. 246.

ли разсмотрѣть самыя лучшія и при томъ многія височныя кости возрасшнаго челоуѣка, совсѣмъ не находится, сіе доказалъ я въ сочиненіи моемъ о родокоспій. 144. 19.

§. 246. Въ полость барабанную про-
ницаешь и Евстахїева труба (* (tuba
Eustachii), куды также отверзается
низшая лѣстница слуховаго блока,
(scala cochleae), отверзѣніе которой,
круглымъ окномъ (**) навываемое (fen-
estra rotunda), закрываетъ особенная пере-
понка, коихъ какое было бы употребле-
ніе, еще и по сіе время не довольно
извѣдано.

§. 247. На коней въ внутреннихъ
каменистой височной кости нѣдрахъ на-
ходится Лавиринѣъ, (labyrinthus), или
самая внутренность уха, изъ трехъ
частей состоящая: изъ коихъ первая
именуется преддверіемъ (vestibulum),
среди прочихъ частей находящимся, въ ко-
торое, кромѣ выше упомянутой округлой
дыры, какъ пять устъевъ полукружныхъ,
позади лежащихъ, каналовъ, такъ и выс-
шая лѣстница слуховаго блока, спереди
лежащаго, отверзаются.

§. 248. Самый же Лавиринѣъ со-
держитъ въ себѣ такъ называемую Ко-
шу-

(*) Eustachius de auditus organis. Opusculor. p.
161 sq.

(**) Cl. Scarpa de structura fenestras rotundae
&c. Mutin. 1772. S.

Котуніеву воду, которая, какъ утверждалъ Котуній, двумя протоками вбирается, кои протоки называлъ онъ *водотоками* (*) (*aqueductus*), а Мекелій водопроводами (**) (*diverticula*); изъ коихъ, по словамъ сочинителя, одинъ изъ самаго преддверія Лавиринеа, а другой отъ нижней дѣлщины слуховаго блока происходишь.

§. 249. Мягкая чувствительная жила седьмой пары вкупѣ съ твердою, проходящею послѣ чрезъ водонадъ Фаллоніевъ (***) , вышедши во внутренній слуховой проходъ, мозжечными нитями своими вселяется въ рѣшеткообразное дно (****) онаго, кои частію въ преддверіе Лавиринеа, частію въ полукружные каналы проникають, а наипаче въ самое основаніе блока шакъ вселяются, что на подо-

С 3

бѣ

(*) Cl. Cotunii de aquaeductibus auris humanae. Neap. 1760. 4.

(**) Cl. Ph. Fr. Meckel de labyrinthi auris contentis. Argent. 1777. 4.

(***) Cf. Brendelii analecta de concha auris humani. Goetting 1747. 4.

Fallopii observat. anatom. pag. 27 b sq. ed. Venet. 1561. 8.

Id. de auditu in apice conchae ib. eod. 4.

(****) Cf. Zinnii observat. botanic. Coetting. 1753. 4. p. 21 id.

біе мозжечнаго пояса, разносплешенными полосками изпещреннаго, между двухъ пластинокъ, блокъ раздѣляющей преграды, протекающъ (*).

§. 250. И такъ колеблющееся дрожаніе воздуха (*motus oscillatorius*), которое, какъ говорено было, даже до круглой дыры достигаетъ (§. 145), возвращаясь отъ дыры оныя, продолжается въ преддверіе Лавиринеа, гдѣ посредствомъ вышеупомянутой (§. 248) воды поражаетъ самыя слуховыя чувствительныя жилы, споль изящно по пещерамъ и излучинамъ Лавиринеа расположенныя.

§. 251. Къ умѣренію стремительнаго звона, въ барабанную перепонку ударяющагося и чрезъ полость барабана пространяющагося, кромѣ мышцъ (**), молотка и стремени, кои кажется по изволенію нашему натянуты или ослаблены (***) бытъ могутъ, споспѣшествуетъ еще и барабанная, промежъ ручьяшки молотка и длиннаго наковальни
опш-

(*) B. S. Albini tab. musculor. tab. XI. fig. 29.

(**) Eustach. de auditus organ. pag. 157.

Ch. Caldani institut. physiolog. pag. 245 sq.

(***) Jo. Fr. Meckel de quinto pari nervor. cerebri fig. I. x. 71.

отпроска, голенью именуемаго (crus incudis), проведенная шепива (*) (chorda tympani).



ОТДѢЛЕНІЕ XXI.

О видѣніи (*de visu*) (**)

§. 252. Глаза, (***) оныя орудія видѣнія или зрѣнія, суть обращаемыя шары, на зришельныхъ своихъ чувствительныхъ жилахъ вершящіяся, о взаимномъ коихъ жилъ пресѣченіи выше сего упомянуто (§. 205), подобно какъ бы на нѣкоторыхъ вѣпочкахъ утвержденныя, такъ, что
оныя

(*) Cl. Cotunni I. c. §. LXXXVIII.

Marherr praelect. in Boerh. institut. Vol. III p. 343.

(**) Cf ad hanc sectionem cl. Priestley history and present state of discoveries relating to vision &c. Lond 1772. II Vol. 4.

Et in tyronum usum cl. Haeseler Betrachtungen über das menschliche Auge. Hamburg. 1771 8.

(***) Rustachii tab. XL

Halleri icon fasc. VII. tab. VI.

Sed iustar omnium Zinnii quondam nostri descr. anat. oculi humani Goetting. 1755 4. -- recudi fecit cl. Wriberg collega coniunctissimus ib. 1780. 4.

онныя жилы не насупротивъ средоточія роговой и радужной оболочекъ, но позади воображаемой оси не много ближе къ носу вселяются въ глаза. (Таблиц. 11. фиг. 1. h.)

§. 253. Состоитъ же каждый глазной шаръ изъ разнородныхъ оболочекъ, кои содержатъ въ себѣ влаги различной густоты, такъ что отъ передняго, отверзнѣе имѣющаго, глазнаго полукружія даже до дна глаза, напрошивъ его лежащаго, лучамъ свѣта отверзнѣе спезя.

§. 254. Верхней покровъ глазнаго шара есть твердая оболочка (*sclerotica*), (Табл. 2. ф. 1. а. ф. 2 а -), коея переднее, такъ какъ бы нѣкоторое зѣніе по-полняеиъ прозрачная роговая оболочка (*cornea typica*), (ф. 1. б. -), изъ многихъ пластинокъ состоящая, больше или меньше выпуклая, выдающаяся (*) напередъ такъ какъ бы нѣкая отрѣзанная часть меньшаго шара (*segmentum globi*).

§. 255. По ней слѣдуетъ ликосоставная, впадину первой выстилающая, оболочка (*choroidea*), (ф. 1. с. -), исполненная
крово-

(*) Ab. Jul. Bose de morbis corneae ex fabrica eius declaratis. Lips. 1767. 4.

кровоносными сосудами, а наипаче крововозвратными, разнообразно извилисты, жилами; коея обѣ поверхности черною склизью покрыты, которая (склизь) со внутреннею оныя поверхностью слабо соединена.

§. 256. Подъ ликосоставною оною оболочкою находишся сѣшчетая (*) плева (retina), самая внутренняя глазная оболочка, которая естъ не что иное, какъ мозговатое преизряднаго устройства продолженіе зрительной чувствительной жилы (**), твердую и ликос-

(*) B. S. Albinus annotat. Academ. I. III. pag. 59 sq. L. IV pag. 75. sq. I. V. pag. 66 sq.

(**) Кровоносные сѣшчетой глазной оболочки сосуды преизряднаго устройства въ живой кошкѣ, утопленной въ водѣ, показывать училъ первый Ив. Мери in Mem. de l' Acad des Sc. de Paris, avant 1699. T. X. pag. 656. et a. 1704. pag. 268.

Преизрядный лучеобразный видъ глазной сѣшочки нѣкогда изъ заячьего глаза весьма хорошо изобразилъ Зинний Commentar. Soc. Scient. Goetting. Tom. IV. a. 1754. tab. VIII. fig. 3.

Изъ кроликоваго недавно Г. Фоншана sur le venin de la vipere. Vol. II. tab. V, fig. 12.

Преизрядно сложенную я самъ видѣлъ въ глазѣ совиномъ.

составную глазную оболочку прободящей (*).

§. 257. Передняя окружность линь-составной оболочки оканчивается и окружается клѣпчатымъ пояскомъ (ф. 1 d. -), называемымъ рѣсничнымъ кружкомъ (*orbiculus ciliaris*), помощію котораго плева сія съ подобною бороздочкою твердой глазной оболочки крѣпко соединяется, и отъ котораго двѣ еще другія разнаго рода плевы, то есть радужная, (*iris*) и рѣсничныя волокна, (*processus ciliares*), такъ какъ бы нѣкоторые разпростертые круги, происходятъ.

§. 258. [Радужная оная плева (*iris*), коея задняя сторона покрыта черноватою краскою, именуется ягодною глазною плевою (*uvea*), лежащая спереди и съ обѣихъ сторонъ водяною окружается влагою, которая къ роговой оболочкѣ есть не много вынуклая, къ носу^ууже, а къ вискамъ не много ширѣ. Она состоитъ изъ клѣпчатой плотной плевы и не имѣетъ никакихъ жилокъ мышечныхъ, и кажется, какъ давно уже утвер-

(*) V cl Walter de venis oculi &c. Berol. 1778. 4. tab. I. fig. 2. tab. II. fig. 2.

утверждалъ Г. Зинний, (*), что она есть своего рода оболочка, а не происходитъ отъ ликосоставной плевы; ея передняя сторона (ф. 1. е.) въ разныхъ людяхъ разнаго цвѣту бывающая, пока еще находится въ естественномъ здоровомъ состоянїи, косматой (flossa) или изъ волоковъ состоящей представляе-
етъ видъ.

§. 259. Подобнымъ образомъ кровеносные сосуды радужной плевы по большей части на передней сторонѣ распространяются и въ зародышѣ составляютъ (**), зѣвничную перепонку (membrana pupillaris ф. 2. d. -), коея употребленіе есть то, что бы содержать въ предѣлахъ расширяющуюся радужную оболочку въ то время, когда глазной шаръ съ чрезвычайною скоростію умножается, и такимъ
Т 2 обра-

(*) Commentar. Societ. Scientiar. Goettingens.
Tom. IV. pag 199.

(**) Хорошо устроенную перепонку сію первый примѣтилъ Франц. Сандисъ, славный оный шѣлоразнимательныхъ пріутошовленій художникъ Описалъ же оную и на картинѣ изобразилъ первый Евѣрь Яковъ Вашендорфъ *Commerc. litterar. Nor.*
з. 1740. hebd. 18.

образомъ учиняшь ея способною къ отпиранию будущаго движенія, что я въ другомъ мѣстѣ почти совершенно доказалъ (*).

На седьмомъ или осьмомъ мѣсяцѣ беременности, когда то есть шаръ глазной до значной уже доходитъ величины, выше упомянутая плева начинается раздвояться въ средоточіи своемъ; а излучистыя ея сосудовъ дуги мало по малу стягиваются, кои позади, ежели не ошибаюсь, составляютъ внутреннее радужной оболочки кольцо (*annulus iridis interior*), коего прежде сего времени въ зародышахъ никакихъ слѣдовъ обрѣсти я не могъ.

§. 260. Послѣдній изъ двухъ, выше упомянутыхъ (§. 257), круговъ называется связкою или шѣломъ рѣсничнымъ (*ligamentum f. corpus ciliare*), которое, уклоняясь назадъ, въ нѣкопоторомъ находящся разстояніи отъ радужной оболочки, которое внѣшнимъ своимъ толстѣйшимъ (**) краемъ (*limbus*) соединя-

(*) Commentar. Societ. Scient. Goettingens. Tom. VII.

(**) Чрезъ сей самый край въ глазахъ двухъ копытчатыхъ животныхъ проходитъ рѣсничныи

единяется съ рѣшничнымъ кружечкомъ (257), а внутреннимъ и припомъ тонкимъ окружаетъ сумочку кристальной влаги, чечевицею или горошиною главною именуемой (*lens*), который также черною исполненъ краскою.

Передняя онаго часть (ф. 1. f. -), обращенная къ ягодной оболочкѣ, есть полосата (*striata*), а задняя (- ф. 2. b. -), лежащая на стекловидной влагѣ, изпещренная семидесятью почти волокнистыми прекраснаго устройства згибами, самопочайшіе преизящнаго образованія сосуды имѣющими, которые згибы обыкновенно рѣшничными волокнами называютъ (*processus ciliares*).

§. 261. Содержащаяся же въ описываемомъ доселѣ глазномъ шарѣ влаги прякаго рода.

И вопервыхъ заднюю и припомъ самую большую пуспону глазнаго шара наполняетъ стекловидная влага (*humor vitreus*), которая неисчислимыми каплями

Т 3

въ

нишний каналъ, который прежде всѣхъ примѣнилъ сл. Фонтана (*sur le venin de la vipere* Vol. II. tab. VII. fig. 8. 9. 10.) et a v. cl. Adolph. Murray. curatius descriptus nov. act. Ups. Vol. III.

въ толикомъ же количествѣ пещерокъ ея окружающей плевы такъ раздѣлена, что вообще все сіе переполненоводное тѣло представляетъ особенный видъ дрожащаго густаго засытившаго вещества (*gelatina*).

§. 262. Сіе стекловидное тѣло или сія стекловидная влага имѣетъ спереди соединенную съ нею и окруженную рѣсничнымъ поясомъ (*zona ciliaris*) сумочку, въ которой содержится кристальная влага, зрительною горошиною именуемая (*lens crystallina*), которая Моргагновою водою окружается.

Впрочемъ и самая оная горошина состоитъ изъ весьма прозрачной клѣшечной плевы, гораздо плотнѣйшей той, что стеклянную окружаетъ влагу, которая ещѣ мало содержитъ въ себѣ влаги, что ежели ее взять пальцами, то она представляетъ весьма вязкій, удивительной прозрачности клей.

§. 263. На конецъ прочая пустая часть глаза наполняется весьма прозрачною водяною влагою (*humor aqueus*), которая часть разпростертымъ радужнымъ кружечкомъ на двѣ пещеры раздѣляется, на переднюю то есть довольно пространную, отдѣляющую роговую плеву

ву отъ радужной, и заднюю, которая передней есть уже, и ягодную плевую отъ рѣснишнаго тѣла отдѣляетъ.

§. 264. Всѣ же сѣи преизящныя части тѣла, кои старшій Плиній справедливо назвалъ глазами, какъ своимъ мѣстоположеніемъ, по которому онѣ скрываются во впадинахъ глазныхъ, пакъ и сшеорчешными вѣкъ покровами отъ, внѣшнихъ наглостей ограждаются и охраняются.

Между плевами вѣкъ находятся многоразличными рядами расположенныя сальныя Меибомовы (*) железы (folliculi sebacei Meibomiani), края же оныхъ, шрема или чешырьмя рядами (**) рѣсницъ (cilia) усѣянные, поддерживаются хрящевыми дужками (tagli cartilaginei), помощію которыхъ онѣ удобно двигаться могутъ по глазнымъ шарамъ.

Но возвышенности, сказать съ Цицерономъ, глазныхъ яминъ, обведенныя бровями (supercilia), отрѣваютъ потъ, съ головы и лба низтекающій, и нѣ-

Т 4

ко-

(*) H. Meibomii de vasis palpebrarum novis ep. Helmst. 1666. 4.

(**) B. S. Albini annotat. L. III. tab. III. fig. 4.

которымъ образомъ умѣряютъ чрезмѣрный свѣтъ.

§. 265. На конецъ къ учиненію глазъ скользскими, къ соблюденію ихъ ясности и вымыванію, впадшихъ въ оныя постороннихъ шѣлъ, споспѣшествуютъ слезы (lacrymae), коихъ главнѣйшій источникъ составляютъ слезоточныя железы, (glandula lachrymalis), въ верху глазной ямы къ вискамъ лежащія. Сіи железы имѣютъ многіе весьма узкіе испражнительные или слезоточныя пробои, кои, говорятъ, въ каждомъ глазу до двухъ унцій слезъ въ сутки изпочаютъ, кои (слезы) вбираютъ въ себя потомъ такъ называемыя слезныя точки (puncta lachrymalia), откуда онѣ чрезъ такъ называемыя рога носовыхъ улипокъ въ слезныя сумочки, а отсюда въ самые нижніе проходы ноздрей низпекаютъ.

§. 266. И сего довольно о строеніи орудій зрѣнія. Теперь надлежитъ приступить къ изслѣдованію самыхъ дѣйствій или причинъ зрѣнія.

Лучи свѣта, упавъ угломъ, меньше 48 градусовъ въ себѣ заключающимъ, на выпуклую поверхность роговой глазной оболочки, проникаютъ сквозь оную; и по мѣрѣ плотности и образованія сея пле-

плевъ, довольно близко, хотя впрочемъ въ водяной влагѣ и не споль много, къ оси преломляющся.

Попомъ сколько ни проходитъ сквозь зѣницу и упадаешъ на зрительную горошинку лучей свѣта; всѣ однакожъ шѣмъ больше преломляются, чѣмъ плотнѣе сія горошина прочихъ глазныхъ влагъ обрѣщается.

Но дабы лучи оные не соединялись въ почки очень скоро и близко; препящствомъ шому служишъ стекловидная, не сполько плотная, какъ кристальная, влага; почему лучи оные, совокупно простираясь далѣе, упадаютъ на конецъ на сѣтчатую плеву, составляющъ на ней почку зрѣнія и производятъ впечатлѣнія или образы внѣшнихъ предметовъ, обыкновенно превратнымъ образомъ.

§. 267. Таковая различная плотность средствъ, чрезъ которыя лучи свѣта простираются, весьма ясно доказываетъ чудное строеніе Божіе; ибо такимъ образомъ отвращено двоякое блужденіе лучей, какъ отъ различного преломленія цвѣтовъ, такъ и отъ различного образованія зрительныхъ горошинъ проис-

ходящаго, такъ что лучи свѣта всегда въ одной и тойже-точкѣ соединяются (*).

§. 268. Что до славнаго онаго запроса, почему то есть мы предметы видимъ прямыми, коихъ впрочемъ начертаніе превратно на свѣтцешой плевѣ изображается; то кажется, что разсуждающій съ подробностію удобно оной рѣшить можетъ, что то есть предметы превратными называются не иначе, какъ въ сравненіи съ другими прямыми предметами.

Откуда явствуетъ, что не нѣкоторыхъ только, но всѣхъ и каждой порознь видимыхъ вещей, равно какъ и самихъ нашихъ тѣлъ виды подобнымъ же образомъ на свѣтцешой плевѣ изображаются, и какъ положеніе, такъ и отношеніе всѣхъ тѣлъ одно другому бываетъ соотвѣтственно, власно какъ бы всѣ прямыми изображались такъ, что душа, (которой не самыя изображенія предметовъ, но токмо чувствованіе, оными производимое, сообщается), отъ всякой

(*) V. Leon. Euler sur la perfection des verres objectifs des lunettes in Mem. de l'Ac. des Sc. de Berlin. a. 1742. pag. 275.

кой погрѣшности смѣшенія предметовъ совершенно предохранена (*).

§. 269. А какъ къ хорошему и острому видѣнію весьма многія потребны обстоятельства; для того Премудрый Творецъ многоразличными часшей, глаза составляющихъ, дѣйствіями о томъ промысливъ благоволилъ.

И во первыхъ, поелику для яснаго видѣнія потребно довольное, однакожъ определенное, а не чрезвычайное, количество свѣта; для того двоякимъ здѣсь предохранено образомъ, чтобы то есть по мѣрѣ большаго и меньшаго свѣта, большее или меньшее количество лучей онаго упало на кристалловидную глазную влагу, а излишняя часть оныхъ и вредная для ясности зрѣнія инуды поглощалась бы.

Первое совершается движеніемъ радужной глазной оболочки, райкомъ иначе еще именуемой, а другое черною краскою или склизью, выше сего упомянушою.

§. 270. Радужная оболочка имѣетъ то вниманія достойное движеніе, по-
мо-

(*) Cf. cl. Grimm. de visu. Goetting. 1758. 4.

мощию котораго она такъ принаравливается къ состоянiю свѣта, что при сильномъ сiянiи онаго расширяется и ссужаетъ зѣницу, а при слабомъ и шускломъ спягивается, и шѣмъ поспѣшествуетъ разширенiю (*) зѣницы.

Сiе движенiе разнообразно изложитъ спарались Физiологи; изъ коихъ одни выводили оное изъ различнаго впечатенiя крови въ ея сосуды; другiе приписывали оное нѣкоторымъ на самомъ дѣлѣ не существующимъ ея мышцамъ и прочая. Но что ни которое изъ помянутыхъ положенiй здѣсь мѣста имѣть не можетъ, и что гораздо вѣроятнѣе и съ явленiями природы сходственнѣе кажется быть то, что движенiе радужной плевы происходитъ опъ собственной ея жизни; сiе доказалъ я въ особливомъ моемъ сочиненiи; дальнѣйшую же причину, какъ упомянуто выше (§. 255), производить можно развѣ опъ обратнаго дѣйствiя общаго чувствилища или мозга.

§. 271.

(*) Zinn de motu uveae 1757. in Commentar. Societat. Scientiar. Goettingens. Tom. I.

Cl. Fel. Fontana dei moti dell' iride. Lucc. 1765. 8.

§. 271. Чшо до шемноцвѣтной кра-
ски или оболочки, о кошорой уже не
однократно говорено было (§ §. 255.258.
260); то дѣйствіе оныя состоитъ въ
томъ, чшобы излишнее количество свѣ-
та поглощать, и шѣмъ споспѣшество-
вать къ хорошему и ясному видѣнію;
каковую важность и необходимость оныя
кромѣ прочихъ доводовъ, изъ разсѣченія
глазъ, разныхъ живошныхъ почер-
паемыхъ, премного доказываетъ бо-
лѣзненное сосшояніе бѣлыхъ Араповъ
(*Leucaethiopes*), кои отъ недостатка сея
черныя оболочки, съ досадою видятъ и
не могутъ терпѣть (*) большаго сія-
нія.

§. 272. Далѣе пошребно, чшобы
шочка (*focus*) преломляемыхъ лучей, со-
ставляющая зрѣніе, въ надлежащемъ раз-
стояніи отъ сѣшчешой оболочки находи-
лась, шакъ чшобы шочка оная ни
позади сѣшочки, простираясь далѣе
ни

(*) Много говорилъ я о семъ какъ въ К. о
природномъ разлчїи рода человѣческаго
(ед. 2. раз. 106 - 122.), шакъ и въ раз-
сужденїи моемъ о глазахъ бѣлыхъ Ара-
повъ (*Leucaethiopes*.)

ни напереди оныя, сокращаясь прежде-
временно, упала на стекловидную
елагу.

Послѣдній недоспашокъ зрѣнія есть
обыкновенный близорукимъ (myopes), вы-
пуклаѣ роговую оболочку и горбатѣ
зришельную горошинку (lens crystallina)
имѣющимъ.

А первый свойственъ есть зоркимъ
людямъ (praesbita), имѣющимъ прошив-
ное первому устройство глазъ.

§. 273. А какъ совершенно здоровый
глазъ всѣ вообще, какъ отдаленные
то есть, такъ и въ близи находящіяся
предметы, съ одинакою ясностію видѣть
можешъ; для того имѣть долженъ особли-
выя способности, помощію которыхъ могъ
бы (*) онъ къ разнымъ предметамъ, въ
разномъ разстояніи находящимся, при-
наравливаться. Каковыя перемѣны что
большую частію внутри глаза сжима-
ніемъ прямыхъ глазного шара мышцъ
совершаются; сіе кромѣ прочихъ доказа-
тельствъ весьма ясно узналъ я изъ
твер-

(*) Cl. H. w. Math. Olbers de oculi mutationi-
bus internis. Goetting. 1780. 4.

твердой, совсѣмъ опмѣнное строеніе и довольную гибкость имѣющей, твердой оболочки глаза Гренландскаго морскаго коша (phoca), которую оболочку благоразумная природа съ шѣмъ соорудила, (*) что сему двужизненному животному (amphibion) надлежало попеременно смотрѣть чрезъ средства, различную густоту имѣющія.

§. 274. Сими же самыми мышцами глаза у бдящаго человѣка почти безире-шанно, хотя впрочемъ и непримѣ-нымъ образомъ, движутся и къ оси прошивустоящихъ предметовъ прямо на-правляющся.

Ибо хотя вся сѣтчатая оболочка одарена чувствомъ; однако не во всѣхъ мѣстахъ способна къ воспріятію вне-чашлѣній предметныхъ.

Пошому что человѣческой (***) глазъ, какъ открывається изъ извѣстнаго опы-
та

(*) Commentar. Societ. Scient. Goettingens. Tom. VII pag. 62. fig. II. f. g. h.

(**) Человѣческой, говорю глазъ; ибо въ глазахъ нѣкоторыхъ животныхъ, кото-рыхъ я у себя имѣю, на пр. въ глазъ мор-
ска-

та Г. Маріюшши, при истинной оси своего шара, гдѣ то есть входитъ въ него чувствительная зрительная жила (nervus opticus), никакого зрѣнія не имѣетъ.

Прочей же сѣтчатой перепонки главнѣйшая почка, которую справедливо первымъ орудіемъ подробнаго зрѣнія почищать должно, упадаетъ на умовоображаемую глазнаго шара ось, соотвѣтствующую средоточію роговой оболочки и всего глаза; что однакожъ, какъ то не давно учинилъ примѣчаніе на Боергава Г. Кестнеръ, не въ такомъ смыслѣ приниматься должно, якобы при неподвижномъ состояніи глаза, одну только почку предмета ясно и подробно видѣть можно, и что якобы для обозрѣнія каждой почки надлежало всегда перемѣнять ось глаза, когда вопреки мнѣнію сему изображеніе предмета всегда цѣлымъ (*) впечатлѣвается въ душѣ.

§. 275.

скаго когн (plocа) и Дикобраза, настоящая и мнимая ось есть одна и та же, потому что зрительная чувствительная жила вселяется прямо въ средоточіе роговой оболочки и зѣницы.

(*) In optica quaedam Boerhaavii et Halleri Commentatar Abr. Gotth. Kaefner. Lips. 1785.
8. p. 7.

§. 275. Навыкъ же многовенно перемѣнять ось глаза и обращать оную къ обозрѣваемой вещи, пріобрѣщается употребленіемъ и упражненіемъ. Что подтверждаютъ какъ животныя, слѣпыми рождающіяся на свѣтъ, кои, пришедши въ совершенный возрастъ, получаютъ на конецъ зрѣніе (*), такъ и новорожденные младенцы, кои едва прежде трехъ мѣсяцовъ послѣ рожденія своего на свѣтъ получаютъ такую способность.

§. 276. Сей самой навыка и привычки силѣ кажется приписывать должно и то, что мы двумя глазами видимъ одинъ предметъ; ибо какъ новорожденнымъ младенцамъ предметы представляются двоякими, такъ и не однократно таковой недоспадокъ зрѣнія примѣченъ былъ послѣ разныхъ глазныхъ болѣзней, который однакожъ употребленіемъ и долговременнымъ упражненіемъ паки былъ исправленъ.

§. 277. Впрочемъ обоихъ глазъ соединенная остроша или зрѣніе, по утвержденію Юрина, cadaго въ особенно-

У

спи

(*) V. cl. Bortolazzi sopra una cieca nata guarita. Veron. 1781. p. 79 sq.

сти глаза видѣніе развѣ шринадцашою долею превышаеиъ.

. А Леонъ де Винчи, бывшій нѣкогда славный живописецъ, говоритъ, что къ сужденію о разстояніи и дальности предметовъ, лучше (*) употреблять одинъ глазъ.

§. 278. Вообще же для изряднаго видѣнія пошребно, чшобы уголъ онаго по крайней мѣрѣ былъ больше 34 секундъ; что преизящными опытами доказалъ почтеннѣйшій мужъ, Товія Мееръ, копорый величайшее человѣческаго глаза совершенство доказалъ шѣмъ, что предѣлъ оный видѣнія, при всякомъ сіяніи солнечномъ, или слабомъ свѣшѣ свѣшномъ, почти всегда одинаковъ бываетъ, шакъ что хоща иногда и много уменьшаеиъ свѣша, однако ясность зрѣнія едва какое либо прешерпѣваетъ уменьшеніе. (**)

§. 279. Ошкуда можно заключить къ безчисленному множеству впечатлѣній видимыхъ предметовъ, кои пред-
став-

(*) Cf. Lamberf sur. la partie photométrique de l' Art du peintre in Mêm. de l' Ac. des Scienc. de Berlin 2. 1768. pag. 80. fq.

(**) Tob. Mayer experimenta circa visus aciem in Commentar. Soc. Scient. Goettingens. Tom. IV

спаваяющся нашимъ глазамъ, и кои такъ сильно изображающся (*) на сѣпчешой оболочкѣ глаза, что при извѣстныхъ обстоятельствеахъ слѣды оныхъ оспающся еще и тогда, когда предметы уже больше не представляющся (**) глазамъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XXII.

*О внутреннихъ чувствахъ и прочихъ способностяхъ (***) душевныхъ.*

§. 280. И сїи-шо внѣшнїя чувства, коихъ изслѣдованїемъ доселѣ зани-

У 2

ма-

(*) De la Hire accidens de la vue pag. 375.

(**) Gassendi vita Petreskii pag. 175 sq. ed. Hagens. 1655. 4.

Cl. Francin's Litters on philos. subiects ad calcem EJ. Exper. on electricity. Lond. 1766. 4. p. 469 sq.

Cl. Rob. War. Darwin experimenta nova de spectris s. imaginibus ocularibus, quae obiectis lucidioribus antea visis, in oculo clauso vel averso percipiuntur. LB. 1785. 4.

Sed maxime cf. de hisce, multisque aliis affinis visus phaenomenis elegantissima observatissima cl. Meister in Hamburg. Magaz. Vol XXIII. p. III.

(***) Cf. classicas Sulzeri de animae facultatibus dissertationes, actis Berolinensibus sparsim infer-

мались, суть шѣ орудія, помощію которыхъ понятія и разныя впечатлѣнія въ главнѣйшей состава нашего части, то есть душѣ, изображаются; ибо, какъ гласитъ оное всѣмъ извѣстное положение, ничего не бываетъ въ смыслѣ, чтобы прежде не было постигнуто внѣшними чувствами, яснѣе сказать: всѣ впечатлѣнія въ душѣ человеческой происходятъ отъ внѣшнихъ предметовъ.

§. 281. Къ воспріятію и соблюденію понятій оныхъ, помощію чувствъ пріобрѣтаемыхъ, и къ хорошему и порядочному употребленію оныхъ не однѣ, но многоразличныя споспѣшествуютъ способности души, отъ жизненныхъ шѣлесныхъ силъ, о коихъ выше сего говорено было, совсѣмъ отличныя (§. 42), помощію же чувственножильнаго состава съ оными такъ связанныя, что опшуда происходитъ и сохраняется чудное соединеніе души съ шѣломъ.

§. 282.

tas; collectas in EJ. Vermischten philos. Schriften Vol. I. Lips. 1773. 8.

It. cl. E. Platner Anthropologie.

Et cl. Bonneti varia huius argumenti scripta, maxime autem EJ. Essai de psychologie cuius nuperima ed. extat T. VIII. collectionis operum viri amicissimi.

§. 282. Изъ способностей и свойствъ душевныхъ самая первая и прочимъ такъ какъ бы основаніемъ служащая, есть способность понимать (*facultas percipiendi*), чрезъ средство которыхъ душа извѣщается о впечатлѣніяхъ, внѣшними предметами въ чувственныхъ орудіяхъ производимыхъ.

§. 283. Сей понятія силѣ поспѣшествуетъ еще другая, ея гораздо преимущественнѣйшая способность, называемая вниманіемъ (*attentio*), которое душу въ возбужденномъ въ оной нѣкоторомъ впечатлѣніи такъ углубляетъ, что она объ одномъ токмо ономъ занимается размышленіемъ.

§. 284. Чтожъ до соблюденія, живѣйшаго возбужденія и порядочнаго и согласнаго соединенія понятій, то къ сему споспѣшествуютъ двѣ другія способности, внутренними чувствами называемыя, а именно: память и воображеніе (*memoria et phantasia*), кои хотя суть весьма близки и сходны между собою; однакожъ одна отъ другой такъ отличаются, что кажется память больше споспѣшествуетъ (*) къ

У 3

вос-

(*) G. Gorti. Richter de natura, labe, et praefidiis memoriae humanae, Goetting. 1852. 4.

воспріятію и сохраненію производи-
мыхъ признаковъ вещей; напрошивъ по-
то воображеніе (*phantasia*) возбуждаешъ
паче самыя впечатлѣнія и представ-
ляешъ и ясными ихъ содѣлываешъ, такъ
какъ бы онѣ были настоящія, а наипаче
шѣ, кои раждающъ удовольствіе, или
производятъ въ насъ чувствованіе огор-
ченія и досады.

§. 285. И вообще на самомъ семъ
пріятномъ или непріятномъ чувствован-
ніи различіи ушверждается способность
желашъ, или отворачаться; а еже-
ли подробнѣе вникнуть въ дѣло, то
и вся воля или изволеніе наше (*voluntas*)
на семъ же самомъ ушверждается осно-
ваніи.

§. 286. Воображеніе есть также
источникъ, откуда производишь должно
страсти или движенія, коимъ люди
взглядомъ великаго различія ихъ шѣло-
сложеній, различнымъ образомъ и под-
вержены бывающъ, и коихъ внутреннее
и скоропостижное съ многочисленными
шѣ-

шѣлесными ошправленіями согласіе, множайшими примѣрами такъ ясно (*) подтверждаются (§. 59), что нѣтъ почти ни одной страсти душевной, которая бы не могла имѣть вліянія либо въ движенія сердца, либо въ вождельніе пищи и состояніе варенія оныя; не упоминая уже о прочихъ особливыхъ случаяхъ, изъ коихъ открывается, что стыдъ дѣйствуетъ надъ лицомъ, причиняя рдѣніе въ ономъ, любовь или ненависть надъ дѣйствіемъ дѣпородныхъ членовъ, гнѣвъ надъ отдѣленіемъ въ великомъ количествѣ желчи; и такъ далѣе.

Почему взглядомъ дѣйствій оныхъ, которыя душевныя возмущенія производятъ въ тѣлоустройство нашемъ, вообще раздѣлить можно на возбуждающія и потушающія.

Къ первому отдѣленію числятся радость, любовь, надежда, гнѣвъ и прочая. А

къ послѣднему, страхъ, печаль, желаніе возвратиться въ свое отечество,
(по-

(*) Cf. desideratissime, de Marêes elegans de animi perturbationum in corpus potentia specim. Goett. 1775. 4.

(nostalgia), зависть и симъ подобныя движенія души.

§. 287. Изчисленные доселѣ способности души суть общи человѣку и скотамъ, хотя впрочемъ человѣкъ совершенствомъ оныхъ несравненно превышаетъ скотовъ; ибо ни одно животное не имѣетъ столь великаго обнятія памяти и столь крѣпкаго содержанія въ умѣ учиненныхъ впечатлѣній; ни одно, говорю, животное не имѣетъ столь живаго воображенія и столь сильной, а иногда и смертоносной наглости спрашей душевныхъ, какъ человѣкъ.

§. 288. Самое же большее человѣческой души преимущество предъ прочими животными состоитъ въ томъ, что она одна токмо одарена разумомъ (ratio), помощію котораго можетъ она рассуждать, образовывать и представлять себѣ отвлеченныя понятія и прочая, и помощію котораго она имѣетъ силу надъ всѣми прочими способностями своими; напротивъ того животнымъ вмѣсто разума даны однѣ внутреннія побужденія или слѣпыя стремленія къ отправленію дѣйствій, предиріятіямъ ихъ соотвѣствующимъ; изъ коихъ ежели исключить стремленіе къ любовожденію, едва

едва какія либо приличествуютъ чело-
вѣку.

§. 289. А что находится великое
различіе между слѣпыми побужденіями
скотскими и челоѣческимъ разумомъ
сіе всякъ узнать можетъ, ежели
только приметъ въ разсужденіе то, что
побужденія скотскія суть врожденные
способности; когда напротивъ того упо-
требленіе разума пріобрѣщается уче-
ніемъ и воспитаніемъ.

Что побужденія всегда одинаки бы-
ваютъ и никогда увеличены быть не
могутъ; напротивъ того разумъ
никакихъ предѣловъ не имѣетъ.

Что побужденія оныя всегда сооп-
вѣстственны бываютъ извѣстному со-
стоянію жизни какого либо рода живот-
ныхъ, также одной какой либо странѣ
и прочая: напротивъ того челоѣкъ
ни къ какому роду жизни не привязанъ,
но есть вольный всего земноводнаго ша-
ра обитатель. Отъ каковаго неограни-
ченности его преимущества многія про-
изпекаютъ необходимости, коихъ про-
стое побужденіе удовольствоваться не мо-
гло бы; напротивъ того разумъ совер-
шенно можетъ удовлетворишь всѣмъ

Ф

тако-

таковымъ многоразличнымъ желаніямъ и необходимостямъ человѣка.

На конецъ кромѣ разума человѣкъ имѣетъ еще и другое преимущество, непосредственно отъ разума его производящее, то есть словесность или рѣчь (*loquela uſus*), о которой выше сего говорено было (§. 154.), и которая одному только человѣку свойственна и природна, скотамъ же вмѣсто оныя данъ одинъ только голосъ (*vox*).



ОТДѢЛЕНІЕ XXIII.

О произвольныхъ дѣйствіяхъ теловѣческаго тѣла (de actionibus arbitrio voluntatis obnoxiiis).

§. 290. Выше сего видѣли мы (§. 214), что чувствительныя жилы двоякую отправляютъ должность, то есть 1) производятъ чувствованіе, 2) движеніе; о первой доселѣ разсуждено было. Остаются теперь о послѣдней нѣчто кратко предложить.

§. 291. Вообще же движенія частей человѣческаго тѣла раздѣляются на два отдѣленія шакъ, что одинъ изъ нихъ упра-

управляющіяся изволеніемъ нашимъ, а другія не подлежатъ оному; къ послѣднимъ обыкновенно числятся бѣеніе сердца, червообразное движеніе кишекъ (*motus peristalticus*) и прочая; а къ первымъ относятся многихъ мышцъ движенія и прочая.

Что касается до дыханія, чиханія, натягиванія перепонки слуховаго барабана и прочая: то о дѣйствіяхъ сихъ многіе сумнѣваются; изъ коихъ одни относятъ ихъ къ произвольнымъ дѣйствіямъ; другіе къ самодвижнымъ и непроизвольнымъ, иные наконецъ почитаютъ ихъ смѣшенными дѣйствіями.

§. 292. Впрочемъ, ежели подробнѣе вникнуть въ раздѣленіе оное дѣйствій человѣческихъ; то ясно усмотрѣть можно, что такое раздѣленіе великимъ подлежатъ затрудненіямъ, такъ что между двумя оными опредѣленіями дѣйствій точныхъ предѣловъ положить не возможно.

Ибо съ одной стороны не много можетъ произойти въ шлѣ нашемъ такихъ дѣйствій, про которыя можно бы было сказать, что воля не имѣетъ надъ ними никакой власти, наипаче, ежели принять въ разсужденіе взаимнообразный

союзъ и согласіе между воображеніемъ и душевными спраспами.

Съ другой стороны много находится примѣровъ такихъ мышечныхъ дѣйствій, которыя хотя по природѣ своей суть совершенно произвольны; однакъ силою привычки, (которая относительно до душевныхъ движеній премноговажною почитается), учиняются на конецъ почти естественными и произвольными.

§. 293. Сего послѣдняго рода дѣйствія суть тѣ движенія мышцъ, кои хотя впрочемъ волею управляются; однако при нѣкорыхъ обстоятельствеяхъ безъ всякаго свѣдѣнія или изволенія души совершаются.

Такъ *на пр.* прошивъ изволенія нашего происходишь у насъ миганіе (*nictatio*), когда кто либо изъ пріятелей нашихъ проспираетъ перстъ къ глазамъ нашимъ, хотя впрочемъ и не допрогивается до оныхъ; — или згибаніе четвертаго пальца, которое у многихъ за згибаніемъ мизинца вослѣдуешь и прочая.

Подобнымъ образомъ иногда двигаетъ мы члены нашего тѣла, будучи оягощены глубокимъ сномъ.

Кромѣ сего находятся еще примѣры такихъ мышцъ, кои хотя по большей части управляются волею; однакъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ сопротивляются ея велѣнію: куды на пр. можно отнести трудность рукою и ногою одной и той же стороны противнымъ направленіемъ очерпнуть кругъ, и другія сему подобныя движенія, которыя хотя суть и произвольны и весьма легко совершаются, ежели порознь управляются; однакъ, ежели соединишь (*) ихъ съ другими какими либо движеніями; то весьма трудно совершаются.

§. 294. Что до тѣхъ движеній, кои почитаются вовсе непроизвольными; то я кромѣ судорогъ, при родахъ случающихся, которыя обыкновенно пошугами или перехватами (*graspi ad partum*) называются, ни одного такого не знаю, которое бы изъ сего не имѣло исключенія, то есть было бы во все непричастно воли душевной.

Касательно движенія сердца находишь достойное замѣчанія повѣствованіе о нѣкоемъ Аглинскомъ Полковникѣ, про котораго говорятъ, такъ какъ самовид-

Ф 3

цы,

(*) Cf. Winslow in Mém. de l'Ac. des Scienc.
de Paris 1739.

цы, Бейнардъ и Чейней (*), славные
Аглинскіе Медики, что онѣ по произво-
лу своему могѣ останавливать движеніе
сердца и боевыхъ жилъ.

А что и желудка движеніе можетъ
быть произвольно; сіе кажется довольно
подтверждаетъ жвачка (*gummatiо*), кото-
рая, какъ я примѣнилъ въ одномъ че-
ловѣкѣ, есть совсѣмъ произвольна.

Движеніе радужной глазной оболоч-
ки, хотя у большаго количества людей
есть произвольное; однакъ я слышалъ
отъ знатныхъ мужей объ одномъ чело-
вѣкѣ, который, употребивши нѣкое осо-
бенное усиліе, могъ управлять онымъ, да
и самую даже зѣницу сжималъ въ шем-
номъ мѣстѣ.

Откуда явствуетъ, что много на-
ходишся плѣодвиженій, которыя хотя
по большей части и безъ всякаго велѣ-
нія душевнаго опправляются; однако
въ нѣкоторыхъ людяхъ бываютъ произ-
вольны, наипаче, ежели употребить на
то вниманіе (**), а усыпить вообра-
женіе.

(*) Cheine's Treat. of nervous diseases p. 307 sq.

(**) Cf. Rapport des Commissaires chargés par
le Roi de l'Examen du magnétisme animal.
Paris. 1784. 4. pag. 16.

женіе. Такимъ образомъ я зналъ людей, кои всякую минушу могли судорожное производить содрогновеніе тѣла, какъ скоро было припомнятъ какія либо непріятныя впечатлѣнія и такъ далѣе.

§. 295. Чего кажется другимъ образомъ изъяснить не можно, какъ развѣ вознмѣвши прибѣжище къ обратному дѣйствию общаго чувствилища, которое кажется удобно можетъ быть возбуждено, какъ воображеніемъ, представляющимъ душѣ побужденіе, надъ тѣломъ дѣйствующее, такъ и самымъ онымъ побужденіемъ, дѣйствующимъ надъ мозгомъ. И подлинно много находится въ животномъ тѣлочиніи (oecopotia animalis) явленій, кои таковому изложенію довольно соотвѣпствуютъ; куды принадлежатъ разныя причины, на пр. производящія возстаніе дѣтороднаго мужскаго члена, и такъ далѣе.

§. 296. О движеніяхъ, воѣ подлежащихъ, по еще замѣпши должно, что онѣ суть тѣ опличительные знаки и преимущества, кои царство животныхъ отъ царства растѣній опличаютъ, по тому что онѣ какъ съ одной стороны никакому растѣнію не приличествуютъ, такъ съ другой стороны всякому даже

самому простому роду животныхъ суть свойственны и общи.

§. 297. Въ самихъ же насъ движенія оныя весьма ясно подтверждають то согласіе, помощію котораго душа содѣйствуетъ тѣлу и на оборотъ, и которою можешь узнать всякъ, кто только приметъ въ разсужденіе по крайней мѣрѣ одну ту чрезвычайную скорость, съ каковою многоразличныя движенія перстовъ искуснаго Трубача, или орудій слова какого либо говорящаго челоука однѣ за другимъ послѣдуютъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XXIV.

О движеніи мышцъ (de motu musculorum).

§. 298. Самыя же близкія орудія множайшихъ движеній суть мышцы, кои между прочими первоначальными частями онаго большее число составляютъ.

§. 299. Мышцы отличаются отъ прочихъ первоначальныхъ частей тѣла нашего двоякимъ образомъ; 1) собственнымъ устройствомъ, 2) особливымъ нѣкоторымъ родомъ ихъ жизненной силы.

§. 300.

§. 300. Устройство (*) оныхъ изъ мясныхъ блѣднокрасноватыхъ жилокъ своего рода такъ составлено, что каждая мышца состоитъ изъ другихъ мышекъ, а сѣи изъ другихъ мышечекъ, мышечки же на концѣ состоятъ (**) изъ самыхъ малыхъ жилочекъ и волоконъ мясныхъ.

§. 301. Каждая мышца облекается клѣтчатымъ покровомъ, который, про- ницая въ самый составъ мышцы, и пере- плетаясь со всѣми нитями оныя, слу- жишь подпорою и огражденіемъ всѣмъ пучкамъ мышечнымъ, и ихъ мяснымъ жи- лочкамъ и волокнамъ.

§. 302. Кромѣ сего существо каждой мышцы исполнено безчисленнымъ множе- ствомъ кровеносныхъ сосудовъ и чувстви- тельныхъ жилъ, изъ коихъ послѣднія кажется превращающія въ невидимое мяг- кое существо, и весьма тѣсно съ мясны- ми жилочками соединяется; а первые

Ф 5

такъ

(*) B. S. Albinus hist. musculor. hominis L I.
(**) De microscopica harum fibrarum motricium indagine cf. Wyer. Gul. Muys de carnis muscu- lofæ structura. LB. 1730 4.

Cl. Prochaska de carne musculari. V. an. 1778. 8.

такъ совокупляюща сѣ мясными волокнами мышцъ , что отъ того происходитъ въ нихъ кровяной цвѣтъ , который , ежели изъ мышцы вылить кровь , превращается въ блѣдный , выше сего упомянутый (§. 300); которая блѣдность есть естественна мышцъ.

§. 303. На конецъ многія мышцы еще и ту имѣютъ особеннестъ , что превращаются въ сухія жилы (*tendines*), въ часпи , также изъ жилокъ состоящія , однакъ въ разсужденіи цвѣта , спроенія и упругости споль различное свойство (*) имѣющія , что таковое различіе между сихъ обѣихъ весьма удобно видѣть можно , коимъ отвергается мнѣніе тѣхъ Физіологовъ , кои не только думали , но и утверждали , что сухожильныя волокна мало по малу производятъ отъ мышечныхъ , будучи обмануты тѣмъ явленіемъ , что мышцы у младенцевъ , ежели ихъ сравнить съ мышцами возрастныхъ людей , имѣютъ гораздо больше мяснаго , нежели сухожильнаго вещества.

§. 304. Другой знакъ мышцъ , отъ прочихъ частей тѣла ихъ отличяющій (§. 299),
есть

(*) Cl. Adolph. Murray de fascia lata. Upsal. 1777. 4. pag. 6. fq.

есть раздражительность Галлерова (*) (irritabilitas Halleriana), коея различіе онѣ сжимательности выше сего показано (§. 44.), и которую здѣсь далѣе изслѣдовать должно.

§. 305. Раздражительность оная по силую мышечною, по другимъ свойствамъ природнымъ и однимъ мышцамъ собственнымъ нарицаемая, хотя всѣмъ мышечнымъ частямъ есть общая; однакъ не всѣ въ одинакой степени снабжены оною; ибо примѣчено;

(*) Галлеровою раздражительностію я называю не потому, якобы первый Галлеръ, Гештингенскаго училища украшеніе, изобрѣлъ оное, когда и самъ онъ споль часто приводилъ доводы предшественниковъ своихъ даже со временъ Глиссона о раздражительности; но что первый онъ надлежаще изслѣдовалъ оное и безчисленными живоразниманіями пояснилъ и распространилъ, и всего ученія имъ учрежденнаго чрезвычайную силу и дѣйствіе въ тѣлоустройство живошного весьма ясно доказалъ. Кромѣ сего для того Галлеровою раздражительностію называю, дабы отличить онѣ Гаубіевой, подѣ каковымъ словомъ Г. Гаубій разумѣлъ болѣзненную чувствительность швердыхъ частей тѣла.

но (*), что иныя части большею раздражительностію одарены, другія напротивъ того меньше оныя имѣютъ.

Касательно раздражительности такъ называемыя полныя мышцы, оппращенію жизненныхъ и естественныхъ дѣйствій служащія, имѣютъ большее предъ прочими преимущество, между коими, какъ выше упомянуто (§. 118), первое мѣсто занимаетъ сердце, коего внутренность весьма живою и весьма долго продолжающеюся одарена раздражительностію.

По сердцу слѣдуютъ кишки, а особливо тонкія, которыя въ человѣкѣ такъ какъ и въ животныхъ, горячую кровь имѣющихъ, даже по уничтоженіи движенія сердца раздражаются.

За-

(*) V. Haller de partibus c. h. irritabilibus in Commentar. Soc. Sc. Goetting. T. II.

Et de iisdem in Nov. Commentar. Goetting. T. IV.

О сей же самой матеріи изъ многихъ сочин. довольно представимъ:

Cl. Zimmerman de irritabilitate. Goett. 1751. 4.

Cl. Oeder de eadem. Hafn. 1752. 4.

Jac. Berh. Andreae (praef. Ph. Fr. Gmelin) de eadem. Tubing. 1758. 4.

Alios nonnullos iam passim diximus.

Vt & integras tres collectiones scriptorum ad eandem facientium (v. pag. 166.)

За ними послѣдуетъ желудокъ, по немъ мочевой пузырь и прочая.

Между прочими мышцами опять большую имѣютъ раздражительность тѣ, кои служатъ дыханію, каковыя на пр. суть: грудобрюшная перепонка (diaphragma), междуребрѣнные и треугольные грудной кости мышцы; по сихъ прочія мышцы.

Что до бѣоущихся жилъ, то хотя онѣ и имѣютъ раздражительность; однакъ не такъ великую, какъ прочія мышцы (§. 123).

Таковую же раздражительность имѣютъ и пни крововозвратныхъ жилъ, въ груди содержимые (84.).

Прочіе кровеносные сосуды весьма малую имѣютъ раздражительность, ежели токмо можно почесть ее за настоящую (§. 127.) раздражимость.

§. 306. Впрочемъ кажется мнѣ, что Г. Галлеръ, великій раздражительности защитникъ, несправедливо приписывалъ нѣкоторымъ частямъ раздражительность, изъ учиненія надъ которыми опытовъ я извѣдалъ, что хотя онѣ и снабжены сжимательностію (§. 50); однакъ никакой раздражительности не имѣютъ.

Сюды принадлежащѣ млеконосныя жилы (venae lactae), железы (glandulae, желчный пузырь (vesica fellea), матка (uterus), внутренняя ядрѣ плева (dartos) и дѣшпородный мужескѣй членѣ (hasta virilis).

Извѣдалѣ также я, что нѣкоторые Сочинители не съ большею правотою приписывающѣ раздражительность и радужной глазной оболочкѣ, поверхности легкихъ и прочая: коимѣ, ежели справедливо сужу, не больше приличествуешѣ раздражительность, какѣ и клѣшчешой плевѣ и всѣмѣ извѣ нея составленнымѣ частямѣ, общимѣ покровамѣ шѣла, мозговымѣ перепонкамѣ, подреберной плевѣ (pleura), брюшинѣ (peritoneum), надкостной оболочкѣ, костемозговой перепонкѣ (membrana medullaris), сухимѣ жиламѣ, сухожильнымѣ мышечнымѣ окончаніямѣ (aponegoses), внутренностямѣ, извѣ собственнаго сплетенія составленнымѣ (§. 27.), какѣ на пр. печени, селезенкѣ, почкамѣ, дѣшскому мѣспу (secundinae), мозгу и другому чувстввенножилъному составу и шѣла, кои всѣ вообще части какѣ нижнихъ мясныхъ жилочкѣ не имѣющѣ, такѣ и никакой, жилочкамѣ онымѣ единственно

ственно принадлежащей, не имѣющъ раздражительности.

§. 307. Но какъ съ одной стороны одни мышечную раздражительность смѣшивали въ жимательностію клѣпчепой плевы, такъ другіе съ противной стороны въ недавняя наипаче времена несправедливо числили ее къ силамъ чувствительныхъ жилъ (*).

Ибо хощя силы и дѣйствія чувствительныхъ жилъ надъ мышечными волокнами и самымъ движеніемъ мышцъ отвергать никакъ не можно; да и нѣтъ во всемъ составѣ тѣла нашего ни одной мышечной ниши, про которую можно бы было сказать, что она не имѣетъ въ себѣ чув-

(*) Сюды наипаче принадлежатъ славные споры о силѣ чувствительныхъ жилъ надъ движеніемъ сердца, о способѣ дѣйствованія оія надъ сердцемъ и чувствительными жилами и прочая.

Cfr. praeter alia scripta egregia, passim alias citata :

Rob Whytt's Essay on the vital and other in voluntary motions of animals. Edinb. 1751. 8. & auctius in operibus ib. 1768. 4.

Cl. Jo. Aug. Unzer erste Gründe einer Physiol. der eigentl. thierischen Natur thierischer Körper. Lips. 1771. 8.

чувствительножильнаго существа; однакъ никакъ не должно отвергать того, якобы раздражительности не надлежало почитать за силу своего рода, копорая такъ отъ чувствительной силы разнствуетъ, какъ и сжимательность; ибо съ одной стороны мы видимъ, что въ самыхъ тѣхъ частяхъ никакой не находится раздражительности, въ коихъ весьма много обрѣтается чувствительныхъ жилъ, какъ-выя на пр. сушь кожа, и другія многоизбыточествующія чувствительными жилами внутренности и прочая; съ другой стороны премногя встрѣчаются явленія, довольно ясно показывающія, что раздражительность однимъ только мышечнымъ частямъ свойственна, такъ что по однимъ симъ доказательствамъ кажется согласно съ разумомъ то, что всѣ особливя явленія оныя особливому и каждому порознь устройенію мясной нити приписывать должно, а не вмѣнять чувствительнымъ жиламъ, кои хощя премногимъ частямъ тѣла вкупѣ съ мышцами сушь общи; однакъ ни самаго слѣда какой нибудь раздражительности въ оныхъ не показывають. О прочихъ множайшихъ доказательствахъ я не упоминаю, кои подтверждаютъ,

что

что не можно примѣнить никакого отношенія между степенемъ раздражительности какой либо части, и множествомъ чувствительныхъ жилъ, къ оной части принадлежащихъ, и такъ далѣе.

§. 308. Самое же большее чувствительныхъ жилъ участіе, коимъ, какъ видѣли выше, дѣйствуютъ онѣ надъ мышцами, кажется клонится туды, что о нихъ можно судить такъ какъ о дальнѣйшихъ или побудительныхъ причинахъ мышечныхъ движеній, смѣшивать же ихъ съ ближайшею или дѣятельною причиною оныхъ, которую составляетъ одна каждой мышцѣ врожденная раздражительность, никакъ не должно.

Такъ на прим. дѣйствуютъ душевныя страсти надъ общимъ чувствилищемъ, а оное опротивительно дѣйствуетъ надъ чувствительными жилами сердца такъ, что онѣ возбуждаютъ въ немъ раздражительность, производящую въ немъ трепетаніе (*palpitatio*) и другія неправильныя движенія.

Воля дѣйствуетъ надъ чувствилищемъ, а чувствилище обратнымъ образомъ дѣйствуетъ надъ чувствительными жилами руки, кои потомъ такъ какъ дальнѣйшія причины производятъ движеніе въ

мышцахъ, единственно отъ ихъ раздражительности происходящее и прочая.

§. 309. Сему раздѣленію обоего рода причинъ, къ произведенію дѣйствія въ мышцахъ споспѣшествующихъ, довольно соотвѣстствуютъ всѣ шѣ опыты, кои чинимы были какъ надъ шѣми расслабленными частями шѣла, кои опнимаются (*) по пресѣченіи или перевязаніи чувствительныхъ жилъ, къ нимъ принадлежащихъ, такъ и надъ раздражительностію, которая и по опнятіи какихъ либо частей шѣла долго въ нихъ пребываетъ.

§. 310. Но какое бы дѣйствіе надъ мышцами имѣла кровь, коею онѣ исполнены (§. 802), того еще не доказано.

Чтожь до опыта Штенова (**), то онъ по большей части такое имѣетъ слѣдствіе, что за перевязаніемъ начальной боевой жилы, въ чревѣ содержимой, такое же послѣдуетъ расслабленіе ногъ (***),
ка-

(*) Jo H. v. Brunn experimenta circa ligaturas nervorum in vivis animalibus instituta. Goetting. 1753. 4.

(**) Stenonis elementor. myologiae spec. Florent. 1667. 4. pag. 86.

(***) V Courten in philos Transf. No. 335 p 500.
Haller in Commentar. Soc. Sc. Coetting.
T. IV. p. 293.

какое обыкновенно послѣдуетъ за поврежденіемъ чувствительныхъ жилъ.

§. 311. Кромѣ сихъ, доселѣ излагаемыхъ внутреннихъ и всѣмъ мышцамъ общихъ силъ, каждая мышца имѣетъ еще особливую и ей единственно принадлежащую силу, отъ различнаго ея устройства и положенія происходящую, каковыя каждой мышцы силы довольно соотвѣпствуютъ пому художеству (*mechanismus*), по которому онѣ составлены.

§. 312. Вообще же взглядомъ устройства своего, мышцы раздѣляются на твердыя и полныя (*musculi solidi & cavi*), изъ коихъ послѣдїя, какъ видѣли выше, не совершенно подвержены волѣ, но большіе принадлежатъ къ жизненнымъ и естественнымъ дѣйствїямъ; почему здѣсь рассуждать о нихъ не должно, имѣя слово о произвольныхъ, къ порядку по есть дѣйствїй животныхъ, надъ коими душа дѣйствуетъ, принадлежащихъ.

§. 313. Однакъ и между сими мышцами великое находится различїе; ибо, не упоминая о различной ихъ величинѣ, онѣ имѣютъ премногоразличное еще пучковъ своихъ расположенїе и волоконъ направленїе, особливой видъ и отношенїе мясныхъ частей къ сухожильнымъ,

и на конецъ различное состояніе и образъ продолженія, соединенія и прочая.

§. 314. Однако не взирая на то, многія мышцы имѣютъ еще продолговатый, верешену подобный, видъ такъ, что среднія ихъ мясныя части съ обѣихъ концовъ превращаются въ сухія жилы, подвижности и раздраженія не имѣющія, которыя, будучи прикрѣплены къ костямъ, движутъ ихъ подобно рычагамъ (*vestes*).

§. 315. Впрочемъ какъ весьма мало находится мышцъ, не имѣющихъ сухихъ жилъ, каковыя *на пр.* суть шейная, весьма широкая мышца, (*latissimus s. platysma musculus colli*) и прочая; такъ съ другой стороны прикрѣплены онѣ къ костямъ, хотя впрочемъ и не всѣ, каковая *на пр.* есть выше упомянутая шейная разпростертая мышца, также подъемножимательныя ящерицныя мышцы (*scapulars*), языковая безпарная мышца (*axugos uvulae*) и многія изъ мышцъ, глазной шаръ двигающихъ.

§. 316. Сими силами, общими то есть (§. 304 sq.) и особенными (§. 311 sq.), будучи снабжены мышцы, обрѣтаются способными къ отправленію своихъ дѣйствій, кои опять могутъ быть раздѣлены

ны на общія и особенныя , одной какой либо мышцъ свойственныя.

§. 317. Общія всѣмъ мышцамъ дѣйствія , отъ раздражительности ихъ происходящія , состоятъ въ томъ , что бы во время дѣйствія ихъ мясныя части становились короче , твердѣе , а иногда неравными и какъ бы угловатыми , и на конецъ , какъ открывается изъ опытовъ Глисоновыхъ (*), нѣкоторымъ образомъ тонъ учинялись.

Общей мѣры уменьшенія мышцъ съ Даниломъ Бернуллою и другими Медикоматематиками кромѣ прочихъ примѣровъ съ самаго перваго взгляду полагають не позволяетъ великое различіе между полыми и твердыми мышцами , также и между сими послѣдними , находящееся.

§. 318. Особенныя каждой мышцъ дѣйствія всегда совершаются соотвѣтственно собственнымъ ихъ силамъ и , какъ непосредственно отсюда произтекаетъ , столь многими перемѣняющяся

Х 3

обра-

(*) Glisson de ventriculo & intestinis pag. 191 sq.
Sed prior iam idem experimentum Lond nensі
Societatis. Societati exhibuerat Jonath. Gaddard.
v. Birch's hist. of the royal Society Vo. II.
p. 356. 411 sq.

образы, что имъ никакихъ общихъ законовъ положишь не можно.

Чтожъ до постановленія того правила, по которому всякая мышца во время дѣйствія своего припаявается къ часть, къ которой она прикрѣплена, къ другой неподвижной части, откуда она възпріемлетъ свое происхожденіе, то по напомнимъ Г. Винслова (*), не есть совершенное, но относительное и различнымъ ограниченіямъ подверженное, такъ что изъ двухъ оныхъ частей, по сія, по оная часть можетъ учиняться движимою, будучи поддерживаема дѣйствіемъ другихъ смѣжныхъ мышцъ.

И на оборотъ хотя дѣйствія сгибательныхъ мышцъ (*musculi flexores*) по большей части превышаютъ дѣйствія протягательныхъ, (*extensores*) такъ, что при совершенномъ покоѣ шѣла, руки и персты нѣсколько бываютъ согбенные; однакожъ обѣ оныхъ не по силѣ, каковую употребляютъ мышцы къ склоненію оному членовъ, но по большей части по произвольному послабленію протягательныхъ мышцъ, коимъ какъ бы сами мы пособствуемъ, судить должно.

§. 319.

(*) Mem. de l'Ac. des Scienc. de Paris 1720.

§. 319. Къ чему на конецъ присоеди-
нить можно и особенное каждой мышцы
устройство, которое всегда соразмѣрно (*)
бываетъ тѣмъ дѣйствіямъ и движеніямъ,
для коихъ оно ближайше опредѣлено.

Каковому устройству кромѣ обыкно-
веннаго всякой мышцѣ образованія поспѣ-
шествуютъ и другія многоразличныя
средства, каковыя на пр. суть: кольце-
образныя связи (*ligamenta annularia*), окру-
жающія и утверждающія нѣкоторыя
мышцы; шукъ или жиръ, коимъ многія
мышцы исполнены, пасочная влага, ко-
ею всѣ мышцы безизбѣжно орошают-
ся (*ros lymphaticus*), на конецъ самое со-
оруженіе остова (*sceletum*) касательно его
разныхъ отростковъ и соединенія чле-
новъ; слоботы: иныя цѣлыя кости, какъ
то, коленные чашки (*patellae*) и чече-
вицеобразныя косточки не для другаго
какого либо конца, какъ для удобнѣйша-
го нѣкоторыхъ мышцъ движенія сооруди-
ла природа.

§. 320. Такимъ образомъ вознаграж-
дается или по крайней мѣрѣ умень-
шается неизбѣжная оная силъ потеря,
которая изъ образованія и устройства все-
го

(*) Jo. Alph. Borellus de motu animalium. Rom.
1680 sq. II Vol. 4.

го шѣлеснаго состава непосредственно происходитъ, когда по причинѣ остраго угла, подѣ которымъ многія мышцы индѣ прикрѣпляются къ костямъ, или по причинѣ близости онаго угла къ неподвижной точкѣ (hipotoclium), гораздо больше силъ своихъ теряютъ мышцы, нежели какъ бы онѣ далѣе отъ неподвижной точки или подѣ тупымъ угломъ прикрѣплены были.

§. 321. Отъ такового устройства шѣла наше, почти 450 либо и большимъ числомъ мышцъ (судя по различію пола или самой человѣческой особы) обремененное, сугубую и при томъ весьма важную получаетъ пользу, то есть чрезвычайную дѣятельность и скорость, какъ въ членахъ, такъ и во всемъ тѣлѣ, и удивительную крѣпость въ снѣженіи многихъ трудовъ. Оба же вида пользы оныя зависяшъ частію отъ самаго совершенства мышцъ, до котораго, равно какъ и до совершенства костей съумноженіемъ лѣтъ достигаемъ, частію пріобрѣщается употребленіемъ и упражненіемъ, которое сколь много имѣетъ вліянія какъ въ укрѣпленіе, такъ и движеніе мышцъ, доказываютъ по примѣры танцующихъ по канатамъ на по-
зори-

зорищахъ людей, Бѣгуновъ, кулачныхъ Бойцевъ, Носильщиковъ, Варварскихъ народовъ, и всѣхъ шѣхъ человѣковъ, что жили въ древнія времена.



ОТДѢЛЕНІЕ XXV.

О снѣ (*de somno*).

§. 322. Дѣйствія обоого чувственно-жильнаго соспава, о коемъ доселѣ говорено было, чувствованія то есть и движенія, отъ долговременнаго дневнаго упражненія въ такое приходящъ изнеможеніе, что человѣкъ отъ того необходимую имѣетъ нужду въ ношномъ покоѣ, дабы опять собрать истощенныя силы, кои возстановляетъ оный образъ хладной смерти (*) сонъ.

§. 323. Есть же сонъ совершенно урочное дѣйствіе природы, которымъ союзъ души съ тѣломъ какъ бы пресѣкается, и котораго явленія, о коихъ порознь здѣсь говорить слѣдуетъ, ежели чему, то наипаче нѣкоей шончай-

Ц

шей

(*) Steph. Dickson de somno. Edinb. 1783. 8.
Rob. Cleghorn. de eodem argumento. ib.
eod. 8.

шей жидкости чувствительныхъ жилъ (fluidum nerveum) соотвѣтственны бытъ кажутся.

§. 324. Предшественниками и извѣстителями имѣющаго послѣдоваща сна суть тупость, мало по малу во внѣшнихъ чувствахъ умножающаяся, и разслабленіе многихъ мышцъ, воля подлежащихъ, а наипаче такъ называемыхъ длинныхъ; также скопленіе (congestio) крови къ сердцу чрезъ крововозвратныя жилы, и рождающаяся отъ того досада, которую облегчаетъ зѣвота (obscitatio); наконецъ нѣкоторый видъ забвенія и особливаго нѣкотораго брединыя (delirium), на послѣднемъ шагѣ бдѣнія и первомъ предѣлѣ сна или лучше сказать засыпанія послѣдующаго.

§. 325. Въ каковое время самыя явленія сна бывающъ таковы, что душевныя дѣйствія всѣ вообще пресѣкаются, а прочія тихо и медленно совершающіяся: ибо въ спящихъ бываетъ и біеніе жилъ медленнѣе, и теплоша въ тѣлѣ, при всякомъ впрочемъ его здоровьѣ, нѣсколько меньше, дыханіе умѣреннѣе, вареніе пищи не скорое, испражнений, (исключая одно рѣдкое изверженіе мужскаго сѣмени) (pollutio) ошановленіе и такъ далѣе.

§. 326. Что до дальнѣйшихъ причинъ, производящихъ сонъ, то ихъ находится премного: ибо, не упоминая объ усыпительныхъ лекарствахъ, принадлежащихъ сюда истощеніе душевныхъ силъ, отъ долговременныхъ дневныхъ трудовъ и бдѣнія происходящее; привычка когда либо спать и отъ того же почти самого источника почерпаящая силу наводитъ усыпленіе тѣма, молчаніе, тихость, покой и прочая. Причиняютъ также сонъ легкія, единообразныя и продолжительныя въ нѣкоторыхъ чувствахъ впечатлѣнія, каковыя на пр. суть: журчаніе ручьевъ или взираніе на колеблющуюся тонкимъ въперкомъ нашію (*arrestus fegetis*) и прочая. По сему употребленіе пищи передъ сномъ (*), окружающая поверхность тѣлесную спужа (**) и другія

II 2

кровь

(*) *Cl. Dan. Langhans de causis ortae a passu somnolentiae. Goetting. 1747. 4.*

(**) *Hinc periculi plenissima et tamen fere invincibilis totiesque lethifera somnolentia rigente feb. dia homines corripiciens, cuius placidissimi quidem, mortis generis numerosa lugubria monumenta in moribus St. Gotthardi cacuminibus vidi.*

кровь отъ мозга отвлекающія вещи, каковыя суть: теплыя ножныя ванны (pediluvia), промывательныя (clysmata) и на конецъ сильныя кровопеченія (hæmorrhagiæ) и прочая.

§. 327. Упомянутыя на послѣднемъ мѣстѣ причины могутъ руководствовать насъ къ самой ближайшей причинѣ сна; ибо ежели всѣ шаковыя причины сравнить вмѣстѣ, то кажется весьма правдоподобнымъ, что ближайшая причина сна состоитъ въ уменьшеніи количества крови, отъ сердца къ мозгу проливающейся.

Истинну сію подтверждаетъ особенное нѣкое явленіе, которое случилось мнѣ видѣть собственными глазами въ одномъ челоѣкѣ, выше сего мною упомянутомъ, у котораго, когда онъ спалъ, мозгъ осѣдалъ и опускался въ низъ, а когда находился въ бдѣніи, мозгъ вздувался отъ приращенія къ нему въ большемъ количествѣ крови.

Что

Similia pericula, quae cl. Bangs. cum Solandro aliisque focciis in terra del fuego subit graphice describuntur in priore Cookii orbis periplo apud cl. Hawkesworth Vol. II. pag. 47 fq.

Что также подтверждаетъ и безсонница (*pervigium*), которая обыкновенно бываетъ слѣдствіемъ большаго притеченія крови къ мозгу.

§. 328. Мѣра или долгоша сна зависитъ по большей части отъ различнаго состоянія лѣтъ, дородности или устройства тѣла и его сложенія; вообще же полагаютъ, что должайшій сонъ бываетъ либо спутникомъ слабости тѣла, какъ-то видимъ въ нѣжныхъ младенцахъ (*et in filicerniis*), либо источникомъ глупости и изсупленія.

§. 329. Ободрившись сномъ и упокоеніемъ тѣла опять пробуждаемся; какое пробужденіе или такъ сказать въ новую жизнь возвращеніе такими же явленіями сопровождается бываетъ, какими и склоненіе ко сну; оныя суть зѣвота, сопровождаемая по большей части потягошою (*randiculatio*), нѣкоторая небольшая шупость въ чувствахъ, и такъ далѣе.

§. 330. Чтожъ до причинъ, отвращающихъ и возмущающихъ сонъ, то кажется, что оныя суть весьма сходственны съ причинами, наводящими вождельніе покоя.

То есть : ближайшею причиною бессонницы поставляеяся большее прищеченіе крови къ мозгу.

А дальнѣйшими кромѣ привычки, которая въ семъ случаѣ великую имѣетъ силу, разныя раздраженія, кои либо наружныя уже усыпленные чувства, либо внутреннія возбуждающъ, и кои либо ближайше дѣйствующъ надъ самымъ шлѣомъ, какъ на пр. великое скопленіе мочи дѣйствуетъ надъ ея пузырями; либо посредствомъ воображенія дѣйствуютъ надъ чувствительными жилами и въ нихъ производятъ перемѣну, куды принадлежатъ сновидѣнія (*infornia*) и другія мечты, возмущающія кокой.

§. 331. Самыя же сновидѣнія суть не что иное, какъ такъ сказать игра воображенія (*lufus imaginationis*), посредствомъ которыхъ оно образы прежде видѣнныхъ вещей себѣ представляетъ, и кажется оными занимаеяся и упражняемо бываетъ.

Каковыхъ однакожъ сновидѣній въ младенцахъ прежде шрехъ мѣсяцовъ послѣ рожденія ихъ на свѣтъ я никакихъ слѣдовъ примѣнить не могъ.

Да

Да и находясь примѣры возрастныхъ людей, кои говорили о себѣ (*), что они никогда сновидѣній не имѣли. (**)

По большей же части таковыя мечтанія ночныя суть взбивчивы и непорядочны; хотя впрочемъ и случается, что онѣ иногда самаго разума показываютъ слѣды. (***)

Впрочемъ вообще замѣнить должно, что надъ произведеніемъ сновидѣній имѣющъ великое могущество тѣлесныя побужденія, на пр. великое скопленіе сѣмени въ своихъ хранилищахъ производитъ ношныя поползновенія и прочая; кромѣ

Ц 4

сего

(*) Et quod maxime mirandum inter eos homines vividissimae imaginationis! — Nam de summo v. c. viro Gotth. Ephr. Lessing hoc relatum legimus. (V. Götting. Magaz. 1781. P. I.)

Et ipse generosissimam novi foeminam maximi ingenii, de qua idem constabat.

Cf. Locke's Ess. concerning human understanding Vol. I. pag. 74. ed. Lond. 1726. 8.

(**) Cfr. v. c. quae de se ipso retulit huc facientia cl. Hollmann pneumatolog psycholog. e theol. natural. Goetting. 1780. 8. pag. 196.

(***) Cl. Beattie dissertations moral and critical. Lond. 1783. 4. p. 217.

Cf. Cloghern. l. c. p. 38 sq.

сего я слышалъ повѣствованіе объ одномъ человѣкѣ, въ которомъ пріятели его во время сна по произволу могли возбуждать сновидѣнія, подавая тихимъ съ нимъ разговоромъ матерію къ мечтаніямъ (*). Но сіе кажется должно относитъ къ смѣшенному состоянію сна и бдѣнія, куды также принадлежитъ болѣзненное состояніе Лунашиковъ или Ночеходцевъ (Nostambuli).

Локъ же и другіе сочинители всѣ сновидѣнія почитали за видъ смѣшеннаго состоянія сна.



ОТДѢЛЕНІЕ XXVI.

О лицѣ и вожделѣніи оныя (*de visu et appetentia ejus*)

§. 332. Какъ ущербъ душевныхъ силъ сномъ, такъ умаленіе естественныхъ дѣйствій и самыхъ составныхъ частей шѣла возстановляется пищею.

§. 333.

(*) G. Gottl. Richter de statu mixto somni et vigiliae, quo dormientes multa vigilantium munera obeunt. Goetting. 1756. 4.

§. 333. Самымъ же дѣйствишельнымъ образомъ къ пріобрѣшенію и вкушенію оныя побуждаютъ насъ хотя въпрочемъ разнородныя , однакъ въ разсужденіи общаго конца согласныя между собою , природы нашей побужденія , то есть съ одной стороны нестерпимыя помленія голода и жажды , а съ другой величайшее удовольствіе и пріятность , которыя ощущаемъ мы при вкушеніи брашенъ , и которыя въ снисканіе пищи имѣютъ великое вліяніе.

§. 334. Побужденіе голода иные полагали во взаимномъ шреніи морщиноватыхъ плевъ тощаго желудка , другіе напрошивъ того (что кажется бытъ основаніемъ всего дѣла) поспавляли оное не только въ обильнѣйшемъ собраніи въ желудкѣ внутреннихъ влагъ , а наипаче слинъ , желудочнаго соку (fissus seu liquor gastricus) , и желчи , но и въ оспрошѣ , раздраженіе въ желудкѣ производящей , которую помянушыя влаги обыкновенно получаютъ , ежели не ошвращать ее благовременнымъ употребленіемъ пищи.

§. 335. Но жажды причину (sitis) по большей части полагають должно въ несносной сухости зѣвовъ и пищепріемнаго горла

(æſorhagus), равно какъ и въ особливомъ поощреніи, отъ употребленія острыхъ, а наипаче соленыхъ, ѣствъ происходящемъ.

§. 336. Необходимость оба сіи побужденія природы въ разсужденіи различнаго состоянія возраста, сложенія и великую силу имѣющей привычки бываетъ различна такъ, что едва возможно что либо подлиннаго поставитъ объ оной. Вообще же кажется вся сила состоитъ въ томъ, что человекъ возрастныхъ лѣтъ, въ которомъ то есть ни пустымъ воображеніемъ, ни другими припадками вкусъ не испорченъ и не ошнято побужденіе къ ѣдѣ (*), ни одного дня безъ примѣтнаго уменія силъ, кольми паче безъ настоятельной опасности жизни, безъ пищи пребыть не можетъ.

§. 337. А что пищеніе (potus) при всемъ томъ, что оно весьма желанельно бываетъ, не есть столько необходимо къ
здра-

(*) Cf. post innumeros alios de diuturna inedia auctores: Jac. Barthol. Baccarius in Commentar. instituti Bononiens. T. II. P. I.

Jtem Flor. Jac. Veltelin memorab. apositiae septennis hist. LB. 1777. 8.

здравію и жизни, какъ пища, сіе доказы-
ваютъ какъ многочисленные роды горячую
кровь имѣющихъ животныхъ; каковыя сущь
мыши (*mures*), перепелки (*coturnices*) и прочая,
кои, никакой нужды въ питъѣ не имѣютъ,
такъ и многіе примѣры самыхъ людей,
кои, ошвыкнувъ ошъ всякаго рода пищя,
жили долго крѣпки и здоровы. (*)

§. 338. Что касается до пищи
(*victus*), коею мы внутреннимъ онымъ
побужденіямъ удовлетворяемъ; то спра-
шивается было, которое бы изъ двухъ
первоначальныхъ отдѣленій, животныхъ
то есть и растѣній, больше приличе-
ствовало спроенію человѣческаго шѣла,
и къ которому бы болѣе человѣкъ ошъ
природы былъ предопредѣленъ?

§. 339. Что человѣкъ по природѣ
своей есть травоядное животное (*her-
bivorum animal*), сіе кромѣ прочихъ
доказательствъ, почерпаемыхъ изъ об-
разованія зубовъ (**) и длины ки-
шекъ человѣческихъ (***), Г. Руссавъ
усильно

(*) V. cl. G. Baker in medical Transact. publ.
by the College of Physic. in Lond. Vol. II. p.
265 sq.

(**) Gassendi ep. ad Jo. Bart. v. Helmont. Oper.
ed. Florent. 1727. fol. T. VI. p. 17.

(***) Jo. Wallis in philos. Transact. No. 269.

усильно старался доказать изъ того, что женщина есть живородное (*vivipara*) животное, двумя грудями одаренное (*) и проч. Къ чему можно бы еще прижать случающіеся примѣры и жвачки человѣческой (*ruminatio*), пѣмъ паче, что дѣйствіе сіе есть свойственнo однимъ шокмо правояднымъ животнымъ.

Напрошивъ того поставляющіе съ Гельвеціемъ (**) челоѡка плошояднымъ животнымъ (*carnivorum*) ссылающся на глухую въ каждомъ чслоѡкѣ находящуюся кишку (*intestinum caecum*), и другія сему подобныя доказательства.

§. 340. Ежели же все обстоятельнѣе разобрать, то весьма яснымъ окажется, самымъ даже наблюденіямъ подтверждающимъ, что челоѡкѣ не къ одному роду пищи, но по большей части къ обоимъ отъ природы опредѣленъ; что какъ зубы его, а наипаче коренные (*dentes molares*), такъ и спроенїе кишекъ, о коемъ выше сего упомянуто, такъ какъ бы средину занимающъ меж-

(*) Sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes pag. 196 sq.

(**) De l'homme T. II. p. 17.

между устройствомъ частей плотоядныхъ и травоядныхъ животныхъ. Наипаче же преимущество его предъ прочими животными доказываетъ образъ членосоединенія нижней его челюсти съ височными костями.

§. 341. И ежели есть справедливо то, какъ и дѣйствительно справедливо есть, что сказалъ я о преимуществѣ человека, для котораго весь земноводный шаръ гораздо болѣе открытъ, нежели для всякаго другаго животного; то явствуетъ, что худо было бы промыслено о человекѣ, который вездѣ обитать можетъ, ежели бы къ пропитанію его одна какая либо была предопредѣлена пища.

§. 342. Впрочемъ человекъ всѣхъ животныхъ есть многояднѣе (*omnivorum*); ибо онъ съ одной стороны не только многоразличными, изъ обѣихъ царствъ, то есть животныхъ и растеній, получаемыми брашнами наслаждается и разнообразно роскошествовать въ состояніи, но онъ можетъ еще съ другой стороны и одною самопростѣйшею пищею жить здоровымъ и крѣпкимъ.

Такимъ образомъ въ наши даже времена многочисленные народы живутъ
одни-

одними расшѣніями, какъ то: земляными яблоками (tubera folani), каштанами (castanea), финиками (dactyli) и прочая, кои вещества отъ самаго начала мірозданія составляли пищу человѣковъ; ибо люди сперва жили одними только плодами и корнями, а по шомъ хлѣбомъ и огородными овощами (*) питахся начали.

Кочующіе Мавры, (Mavri Nomades) живутъ (**) почти одною Сенегальской камедью (gummi Senegal).

Камчадалы и другіе имъ подобные народы питаются одною рыбою.

А въ Европѣ народы, называемые Морлахи, живутъ однимъ почти мясомъ (***) .

Чтожъ до Варварскихъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ, народовъ; то они даже сырое мясо употребляютъ въ снѣдь. Что прежде можно было сказать о Самоѣдахъ

(*) Cf. coniectissimi Heune opuscula academica Vol. I. pag 366 sq.

(**) Cl. Adanson in mem. de l'Ac. des Scient. de Paris a. 1778.

(***) G us. Ant. Pujati reflessioni sul vitto Pitagorico Feltr. 1751. 4.

ѣдахъ (*), Есквимомахъ (**) и другихъ нѣкоторыхъ народахъ Южной Америки. (***)

Не меньшаго вниманія заслуживаютъ особенныя поведенія нѣкоторыхъ народовъ и въ разсужденіи пищи.

Такъ на пр. обитатели многихъ, а особливо между Поворотными солнца кругами (горісі) лежащихъ, острововъ большею же частію на Тихомъ Морѣ живущіе, сладкой воды вовсе не имѣютъ, а употребляютъ вмѣсто оныя шеколадное молоко.

Иные пьютъ одну морскую воду; да и много находится другихъ примѣровъ, кои доказываютъ, что человѣкъ есть животное всѣхъ прочихъ многояднѣе.



ОТ-

(*) (De Klingfaedt) Mem. sur les Samojedes et les Lapons 1762. 8.

(**) Petr. Kalm de Esquimaux, gente Americana. Aboae 1656. 4.

Cl. Curtis in Philos. Transact. Vol. LXIV. P. II. pag 381. 383.

(***) Jo Winter ap. Hakluyt principal navigations of the English nation. Vol. III. p. 751

ОТДѢЛЕНІЕ XXVII.

О жеваніи и глотаніи (*de masticatione et deglutitione*).

§. 343. Къ жеванію крѣпкой пищи по большей части споспѣшествуютъ челюсти, а наипаче нижняя, широкимъ родомъ зубовъ снабженная.

То есть 1) передними зубами, такъ называемыми рѣзцами (*incisores*), по причинѣ, что они у премногихъ (*) людей

(*) У премногихъ, говорю, народовъ; ибо, не упоминая о примѣрахъ особливыхъ людей, у коихъ иногда рѣзцы бывающъ тупые, можно напомнимъ, что я во многихъ черепахъ Мумій видѣлъ передніе зубы толстые и тупые такъ, что мало чемъ отличались они отъ коренныхъ зубовъ, и поелику черепы оныя, таковое доспомамятное различіе показывавшіе, относительно до всего начертанія и вида особой оной необманчивой древнѣйшей Египтянъ Физіогноміи были довольно соотвѣстственны, каковую видѣнь можно на Изваяніяхъ, Муміяхъ и Кумирахъ древняго Египта; то кажется вѣроятнымъ быть ~~но~~, что особенное сное начертаніе зубовъ древнѣйшимъ Египтянамъ было.

людей бывають рѣзамъ подобные и служатъ къ раскусыванію крѣпкихъ кусковъ вкушаемой пищи.

2) Твердыми заостренными, песьими обыкновенно называемыми (canini dentes), коими раскусываемъ твердѣйшія вещи, и наконецъ

3) Коренными, разную величину имѣющими (molares), кои служатъ къ сопренію и совершенному пережевыванію пищи.

§. 344. Нижняя челюсть съ прочими головными костями соединяется посредствомъ подвижныхъ членосовокупленій, занимающими средину между неглубоко-впалымъ (arthrodia) и взаимнообразнымъ, чашковымъ называемымъ, членосоединеніемъ (gynglimus), и будучи снабжено двумя хрящевыми довольно твердыми и упругими кружечками, поспѣшествуетъ удобному во всѣ стороны движенію челюсти.

Ц

Че-

до собственное такъ, что его можно почесть за отличительный знакъ, по которому самыхъ древнихъ и настоящихъ Мумій отъ подобныхъ позднѣйшаго вѣка отличать можно. — Пространнѣе о семъ говорилъ я in Göttingisch. Magaz. а. 1780. P. I

Челюсть сію, когда разѣваемъ ротъ, низводящъ укрѣпленныя къ ней мышцы, а особливо такъ называемыя двучревыя (*biventre*), къ чему споспѣшествуютъ нѣкоторымъ образомъ брадородязычныя и кореинозубозычныя мышцы (*musculi geniohyoidei et mylohyoidei*).

Возводящъ же оную и крѣпко прижимающъ къ верхней челюсти, когда мы что либо крѣпкое грыземъ или раскусываемъ, такъ называемыя жевательныя (*massetæ*) мышцы, совокупно съ височными (*scotaphites*).

На стороны движущъ оную во время жеванія внутреннія и внѣшнія мышцы клинообразной кости (*pterygoidei*), изъ коихъ послѣднія нѣкоторымъ образомъ и напередъ оную оповодить могутъ.

§. 345. Удерживается же и подвергается зубамъ содержимая во рту пища устными или ланщными (*compressatores*) мышцами и гибкимъ и во всѣ стороны удобообращаемымъ языкомъ (*volubilis lingua*).

§. 346. Въ то время, какъ вкушаемъ и жуемъ пищу, выжимается изъ источниковъ своихъ слина (*saliva*), которая есть нечто иное, какъ водяная, мыльное почти свойствомъ ющая, жидкость, содер-

держащая въ себѣ не много земли, пода-
вающей случай къ зарожденію нечистоты
на зубахъ и подъязычныхъ камышковъ;
которая по причинѣ всегдашняго упо-
требленія и привычки къ оной, никакого
вкуса на языкъ не производитъ, хотя
впрочемъ и содержишь въ себѣ немного
нашатырной, малаго міра именуемой, со-
ли (sal microscopicum), и которая имѣ-
етъ силу отражать гнилость (*) раз-
бивать и вещества изъ растѣній, а
наипаче мушное свойство имѣющія, при-
водитъ въ броженіе (**).

Ч 2

§. 347.

(*) Pringle on the diseases of the army. Append.
pag. XLVIII. L. LXI 8b. edit. Lond. 1665. 4.

(**) Macbride's experimental Essays p. 16.

Отсюда у нѣкоторыхъ дикихъ или
варварскихъ народовъ вошло въ употреб-
леніе приготавливать пищю изъ жеванныхъ
корней.

*Brafilienfium v. c. ex radicibus iatrophae
manihot. v. Hans staden warhaftig Historia und
Beschr. einer Landtschafft der wilden, nackten,
grimmigen Menschfresser Leuthen &c. Marburg.
1557 4. L. II. c. 15*

*Maris pacifici incolarum ex piperis met-
hyfici radicibus. of amicissimi G. Forster voya-
ge round the world Vol. I. p. 406 fq.*

*It de ultimo Cookii itinere ipsique fatali
splendidum opus Vol. I. p. 316 fq.*

§. 347. Источники слины суть железы просякаго рода, сгромаженными на зываемыя (*glandulae conglomeratae*), коими внутренность щекъ, а наипаче челюсти суть усажены.

Наибольшее же количество слины околоушныя (*parotides*) железы (пошому наипаче вниманія нашего достойны, что нерѣдко въ нихъ засѣдаетъ болѣзненная матерія), чрезъ протоки Штеноновы (*) съ обѣихъ сторонъ подлѣ прешьяго верхняго кореннаго зуба изливаютьъ въ ротъ.

Но та слина, которую изливаютьъ подчелюстные железы, низтекаетъ въ ротъ Вартоновыми протоками (**).

Изъ подъязычныхъ железъ слина изливается чрезъ многочисленные, Ривиномъ изобрѣшенныя, проходы (***).

§. 348. Изпеченіе слины, которая, какъ думаетъ (****) Нуккъ и другіе, почти до цѣлаго фунта отдѣляется въ .по-

(*) *Stenonis observationes anatomicae* p. 20.

(**) *Whartoni adenographia* p. 110.

(***) *Rivini de dysperfia*. Lips. 1673. 4.

Aug. Fr. Walther de lingua humana ib.

1714. 4.

(****) *Nuckii sialographia* p. 29 sq.

половину сушокъ , умножается какъ давлѣнїемъ механическимъ , такъ и содержимымъ во рту какимъ либо шѣломъ твердымъ , слинныя железы дающимъ.

Такимъ образомъ во время жеванія околоушныя железы (parotides) , лежащія при членосовокупленіяхъ нижней челюсти съ верхнею, отъ давлѣнія твердой пищи въ большемъ количествѣ източають слину , которою смягчается вкушаемая пища.

Чтожъ до побужденія или поощренія железъ , то оное бываетъ либо на самомъ дѣлѣ , когда то есть держимъ что нибудь острое во рту , чѣмъ оно отъ большаго пролипія слины растворяется и прищупывается ; либо причиняется воображеніемъ , куды относима и то изліянїе слины , которое послѣдуютъ за великимъ вожделѣніемъ пищи.

§. 349. Съ слиною смѣшивается какъ изъ зубныхъ и щечныхъ железъ исходящая (*) и покрывающая языкъ слизь ,

Ч 3

такъ

(*) De Courcelles icones musculor. capitis tab. IV. e. e. e.

такъ и та росовидная водица (*rosida aquila*), которую испочающъ мягкія устныя часши.

§. 350. И симъ-то смѣшеніемъ слины, съ прочими влагами помощію жеванія въ ротъ изливаемымъ, кусокъ принятой пищи размягчается и не только превращается въ мягкій и къ проглотенію удобный комъ (*bolus*), но еще и учиняется способнѣйшимъ къ дальнѣйшему сваренію въ желудкѣ и произведенію питательнаго сока.

§. 351. Самое же дѣйствіе или художество (*) глотанія хотя кажется есть премногосложно, и припомъ многихъ различного рода частей соединенными силами совершаемо; однакъ вообще состоишъ въ томъ, что сперва языкъ, будучи отвлеченъ мышцами своими къ корню своему и надувшись и какъ бы окрѣпнувъ, жолобоватымъ хребтомъ своимъ (*dorsum excavatum*) пріемлетъ проглатываемый комъ, откуда оный, низпадши въ перешеекъ зѣвовъ (*isthmus faucium*), разширеннымъ и какъ бы на встрѣчу ему возникающимъ пищепріемнаго горла отперзтіемъ, не

(*) Fr. Bern. Albinus de deglutitione LB. 1740 4.
Cf. etiam cl. Naafii musculi pharyngis velique palatini observationibus illustrati. Lipsi. 1784. 4.

не безъ особливаго нѣкотораго усилія, которое можно бы почестъ за особенную часпи сея жизнь, пріемлется, и наконецъ помощію трехъ мышцъ, сжимающихъ (*) пищепріемное горло (pharynx), проводится въ самый пищепроходный каналъ (œsophagus); что однакожъ въ весьма короткое время совершается.

§. 352. Къ разширенію сего пути и учиненію сего безопаснымъ, благопромыслительная природа многоразличныя употребила средства.

И во первыхъ движеніе языка въ семъ дѣлѣ великую важность имѣющее, умѣряетъ рогоязычная кость (os hyoideum).

А дабы какая либо частица изъ проглатываемой слѣди, уклоняясь отъ своего пути, не попала изъ рта либо въ ноздри, либо въ Эстахіевы трубы; то предохранено мягкимъ небомъ, (palatum molle), которое совокупно съ висящимъ на его дугоподобномъ сводѣ язычкомъ (uvula) особенными мышцами на-

пя-

(*) Eustachii tab. XLII. fig. 4. 6.

Santorini tab. posthum. VI. fig. 1.

B. S. Albinii tab. musculor. XII. fig. 23.

тягиваются и проходы оные замыкаются (*).

Что до горшани (glottis), то ее охраняетъ языкъ; ибо горшань, въ самое то время, когда силится чтолибо проглотить, приподнявшись къверху и напередъ, какъ бы скрывается подъ основаніемъ назадъ отвлеченнаго языка, и къ оному прижимается такъ, что отъ того она будучи не много сжата и хрящикомъ своимъ, надглошошнымъ именуемымъ (epiglottis), покрыта, отъ низпаденія въ нее спороннихъ вещей учиняется безопасною.

§. 353. На конецъ глотанію поспѣшествуетъ еще великое количество слизи, копорою весь путь оный смазывается, копорую слизь кромѣ язычныхъ, выше сего помянутыхъ, испочниковъ (§. 234), большею частію испочаютъ премногіе пузырьки (**) миндалевидныхъ, въ зѣвахъ около языка лежащихъ, железъ (tonsillae), равно какъ и тѣ премногія сли-

(*) Santorini tab. posthum. IV. — VI. fig. 2. — et VII.

B. S. Albini tab. muscutor. XII. fig. 11. 27. 8. 2.

(**) B. S. Albini annotat. acad. L. III. fig. 1. v.

слизепочныя железы, кои находятся въ самомъ пищепроходномъ каналѣ.

§. 354. Самый же пищепроходный каналъ (æſophagus), чрезъ который проглоченная пища прежде низшествія своего въ желудокъ проходить должна, есть мясистая труба небольшого пространства, однакъ очень крѣпкая и удобообразимая, и при томъ чрезвычайно чувствительная, которая состоитъ изъ оболочекъ такихъ, (*) какія имѣетъ и весь пищепроходный каналъ, исключая ихъ различную толщину, а именно:

Внѣшняя оболочка есть мясная, изъ жилокъ такого же рода какъ длинныхъ, такъ и поперечно-колѣчатыхъ состоящая.

Средняя чувствительная, съ обѣихъ сторонъ слабую имѣющая клѣпчатую плеву, помощію которой соединяется она какъ съ верхнею, такъ и нижнею оболочками.

Самая же нижняя или внутренняя оболочка пищепріемнаго канала весьма гладкою слизью смазывается.

III

§. 355.

(*) Matth. van Geuns in Verhandelingen van de Maatschappye te Harlem T. XI. p. 9 sq.

§. 355. Опъ такового устроенія канала сего происходитъ то, что онъ сперва пріемлетъ нисходящее въ него пищіе или пищу, а потомъ, сжавшись въ верху, прогоняетъ оныя въ низъ; ежели же что либо глошаемо бываетъ твердое; то онъ то подавляетъ внизъ до шѣхъ поръ, пока пройдетъ оно чрезъ грудобрюшную перепонку (diaphragma) и низпадетъ въ желудокъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XXVIII.

О вареніи желудка (de digestionе).

§. 356. Мѣсто варенія употребляемой нами пищи, есть желудокъ (ventriculus), который во всѣхъ животныхъ обрѣтается, и ежели по сему судить о его преимуществѣ; то онъ есть всѣхъ внутренностей первѣе и необходимѣе.

§. 357. Человѣческій желудокъ (*) имѣетъ видъ довольно пространнаго ко-
жа-

(*) Eustachii tab. X. fig. 1. 2. 3.

Kuysch thes. anat. II. tab. V. fig. 1.

Saxtorini tab. posth. XI.

жаного мѣха, который въ возрастномъ челоѣкѣ вмѣщаетъ три фунта либо и болѣе воды, и въ кошоромъ находится два отверзтія:

Одно верхнее, вообще лѣвымъ устьемъ желудка (cardia) называемое, и выходящее внутри зборы (plicae), которыми отверзтіемъ пищепріемный каналъ (aerophagus), подаваясь косвенно назадъ, въ самый отверзается желудокъ насупротивъ самаго его дна, по лѣвую сторону лежащаго:

А другое нижнее, которымъ правая и узкая сторона желудка оканчивается, и которое правымъ устьемъ желудка (pylorus) именуется, низходящимъ не множно въ соединенную съ нимъ двенадцатиперстную кишку (duodenum).

§. 358. Однакоъ желудокъ не всегда въ одинакомъ находится положеніи, судя пошому, какъ бываетъ тощъ или исполненъ пищею. Ибо онъ, будучи тощъ, такъ обвѣшивается во впадину брюха, что большой его кругъ виситъ въ низъ, а правое отверзтіе, будучи обращено въ верхъ, съ двенадцатипер-

спною кишкою составляетъ (*) складный уголъ (*angulus plicatus*).

Но когда онъ исполненъ бываетъ пищею; тогда большимъ сгибомъ своимъ обращается напередъ (**) такъ, что правое его устье прямее отверзается въ двенадцатиперстную кишку, лѣвое же напрошивъ того, будучи какъ бы въ уголъ согнуто, замыкается.

§. 359. Оболочекъ, составляющихъ желудокъ, главнѣйшихъ находится четыре, которыя отдѣляются одна отъ другой тремя другими, находящимися между ими, клѣпчатыми плевами.

Внѣшняя оболочка есть общая желудка и кишкамъ, хотя впрочемъ и не всѣмъ, которая проспирается въ сальники, ниже сего описываемые (*omenta*).

За сею послѣдуетъ, помощію клѣпчатой плевы соединенная съ оною, мышечная оболочка (*muscularis*), тѣмъ большаго вниманія достойная, что отъ нее зависятъ, какъ чрезвычайная раздражительность желудка, такъ и червообразное, ниже сего описываемое, его движеніе (*motus peristalticus*).

Со-

(*) *Vesalivs de c. h. fabrica L. V. fig. 14. 15.*

(**) *Id l. c. fig. 2,*

Состоитъ же оболочка сія изъ трехъ слоевъ или рядовъ мясныхъ жилокъ (*), кои обыкновенно на при порядка раздѣляются, то есть: на одинъ въ длину идущихъ, и на два круговыхъ волоконъ, кои, какъ открывается изъ опытовъ, столь многообразно перемѣняются, что ничего подлиннаго объ ихъ направленіи и раздѣленіи поставить не можно.

Третія и при томъ всѣхъ прочихъ главнѣйшая оболочка, есть чувствительно-жильная (nervosa), неправильно такъ называемая по тому, что она состоитъ изъ плотной клѣтчатой плевы, съ обѣихъ сторонъ слабое сплетеніе имѣющей, помощію котораго (сплешенія) соединяется она, какъ съ мышечною, такъ и ворсоватою, ниже ее лежащею, здѣсь же описываемую плѣвою, которая наконецъ составляетъ

самую внутреннюю оболочку, неправильно космашою или ворсоватою (villosa), называемую, которая есть весьма мягка и скважиновата, такъ какъ бы губчатое строеніе имѣющая, и столь многими згиба-

(*) Cf. post Hallerum Bertinus in Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris a. 1761.

ми (*) успланная, что обширность ея есть болѣе обширности всѣхъ прочихъ оболочекъ. Она вездѣ представляеиъ видѣ самомалѣйшихъ клѣпочекъ (**), нѣкоторымъ образомъ подобныхъ (***) тѣмъ большимъ клѣпочкамъ, кои находятся въ желудкахъ, жвачку жующихъ животныхъ (guminantia animalia).

Ея внутренняя поверхность уаще-на слизью, изъ слезепочныхъ железъ происходящую, кои железы подлѣ праваго опверзнія желудка довольно ясно видѣиъ можно.

8. збо. Желудокъ имѣеиъ весьма много чувствительныхъ жилъ (****); откуда должно производиъ какъ чрезвычайную его чувствительность, посредствомъ коихъ онъ опъ всякаго поощренія спрадаиъ можеиъ, хотя бы оное было наружное, каковая на пр. есть спужа и прочая,
или

(*) Ruysch thes. anat. II. tab. V. fig. 2.

(**) Id l. c. fig. 3. 4.

(***) Perault Essais de physique Vol. III. tab. XIV. fig. 1.

Cl. Buffon hist. naturelle Vol. IV. tab. XVII. fig. 2. 3.

(****) Cl. Walter tab. nervor. thorac. et abdom. tab. IV.

или внутреннее, внутренними то есть влагами причиняемое: такъ и шо удивительное его согласіе, кошорое имѣетъ онъ съ множайшими частями шѣла и ихъ опправленіями; куды наипаче принадлежитъ (*) какъ могущество всѣхъ спрашей и движеній душевныхъ надъ желудкомъ, такъ и вліяніе цѣлости сего орудія въ ясность мыслей и спокойствіе духа

§. 361. Но не меньше замѣчательно въ желудкѣ и множество кровеносныхъ сосудовъ и ихъ дѣйствіе; ибо бѣгущіяся его жилы, распроспираясь между клѣпчатыми его плевами безчисленными вѣшками, кажутся быть источниками, изъ коихъ чрезъ внутреннюю его поверхность безчисленными струями изпекаетъ въ полость его такъ называемый желудочный растворъ или сокъ (*fussus gastricus*).

§. 362. Вообще же сокъ сей походитъ на слину, исключая, какъ открывается изъ опытовъ Спалланцано-

Ш 4

выхъ

(*) Cf. cl. Jo. H. Rahn *mirum inter caput et viscera abdominis commercium*. Goetting. 1771. 4.

Did. Vogens de *sympathia inter ventriculum et caput*. LB. 1784. 4.

выхъ (*), одно то, что въ немъ не находится никакихъ способностей, броженіе или окисаніе производящихъ; касатель-но же свойства съ прочими слизистыми свойствами онъ имѣетъ также мыльное свойство, отражаетъ и унимаетъ гнилость, и есть весьма сильный разтворъ, который даже самое свернувшееся въ желудкѣ молоко мало по малу опять разтворяетъ (**).

§. 863. И кажется, что сему разтвору или соку первоначально приписывать должно вареніе желудка, который пишу, ежели она надлежаще пережевана и хорошо смѣшана съ слюною, болѣе и болѣе разтворяетъ и превращаетъ въ видъ жидкой кашицы, сѣрой цвѣтъ имѣющей, (***) (chymus).

§. 364.

(*) *Dissertationi de fisica animale e vegetabile.* Mutin. 1780. 8. Vol. I.

Galt. prodit. Genev. 1783. 8. c. praefat. cl. Senabier. experimenta cl. Goffe recensentis. quibus hic emeticis aëris atmosphaerici vires deprehendit, iisdemque ad ulteriorem succi gastrici indaginem feliciter usus est.

(**) Cl. Veratti in *Commentar. instituti Bononiensis.* Tom. VI.

(***) Да и въ самомъ мертвомъ тѣлѣ желудка, будучи не дѣйствителенъ и лиш-

шенъ

§. 364. Однакожъ многоважному сему ошправленію желудка поспѣшесивуютъ и другія многія спороннія и какъ бы вспомогащельныя силы, между кои ми первое занимаетъ мѣсто такъ называемое червообразное движеніе желудка (*motus peristalticus*), копорымъ принятая снѣдь ошъ безпрестаннаго колебанія больше и больше переработывается (*); каковое колебаніе и движеніе хотя и довольно велико; однакъ не таковую имѣетъ силу, каковую нѣкоторые Физіолого - математики оному приписывали; ибо не ошъ него, какъ нѣкоторые не справедливо думали, единственнo зависшъ вареніе желудка.

§. 365. Къ прочимъ подобнымъ способностямъ и вспомогащельнымъ силамъ ошносится еще какъ движеніе брюха, дѣйствующаго давленіемъ своимъ надъ желудкомъ, такъ и его весьма теплое мѣ-

III 5

сто-

шенъ своей жизненной силъ, кажется размачиваетъ и свариваетъ содержимую въ немъ пишу. Cf. cl. Jo. Hunter on the digestion of the stomach after death. in philos. Transact. Vol. LXII.

(*) Cf. Wepferi cicutae aquaticae historia et notae innumeris locis.

стоположеніе; ибо желудокъ какъ отъ великаго количества своихъ кровеносныхъ сосудовъ, такъ и отъ внутренностей въ окрестъ его лежащихъ безпрестанно согрѣвается; каковое согрѣваніе нѣкогда столь много почитали, что раздробленіе употребленной пищи называли совершеннымъ вареніемъ (*costio pro digestionē habita fuerit*).

§. 366. О разстояніи времени, въ которое принятая пища соединенными, доселѣ описываемыми, силами перемѣняется въ питательный сокъ, ничего съ точностію опредѣлить не можно, ежели разсудить, сколь много зависитъ сіе какъ отъ качества и количества самой пищи, такъ и отъ различнаго степени дѣйствія силъ, варенію оныя поспѣшествующихъ, равно какъ и отъ самаго жеванія, которымъ пріуготовляются снѣди и прочая.

Ибо въ здоровомъ человѣкѣ крѣпкій и неповрежденный желудокъ сваримыхъ частей пищи до тѣхъ поръ не изпускаетъ, пока не превратятся онѣ въ видъ кашицы. Откуда явствуетъ, что по взгляду различной пищи, различное потребно и время къ сваренію оныя (*),

ко-

(*) Cf. Jo. Walaevs de motu chyli pag. 534. ed. LB. 1651. 8.

которое однакожъ, естли только вообще что либо о немъ поставитъ можно, есть таково, что желудокъ принятую пищу въ теченіе прехъ или шести часовъ свариваетъ, и мало по малу чрезъ правое отверзтіе свое выпускаетъ въ кишки.

§. 367. Правое отверзтіе (*) желудка (pylorus) имѣетъ клетчатый край, который состоитъ не изъ одной подобно прочимъ згибамъ желудка ворсистой плёны, но входятъ въ составъ онаго особливя нѣкоторыя волокна какъ чувствительножильной, такъ и мышечной оболочки, кои-всѣ-вмѣстѣ составляютъ заостренный или коническій изходъ желудка, который подобно устью матки, зіяющему въ ея влагалище, отверзается въ двенадцатиперстную кишку и власно какъ бы объемлется оною.



ОТ-

(*) Cl. Leveling diff. fistens pylorum &. Argent. 1764. 4. recus. in cl. Sandifort thes. Vol. III.

ОТДѢЛЕНІЕ XXIX.

О сокѣ или жидкости поджелудочной
языкообразной железы (*de succo
pancreatis*).

§. 368. Переварившаяся въ желудкѣ пища, изшедши изъ онаго чрезъ правое его устье въ двенадцатиперстную (*), хотя крошечную, но весьма великую важность имѣющую, кишку, должна претерпѣвать новыя перемѣны прежде, нежели изъ нея можешъ опдѣлиться питательный сокъ (*chylus*); на каковый конецъ опять должны смѣшиваться съ оною различныя внутреннія влаги, изъ коихъ первое мѣсто занимающъ желчь и поджелудочной железы сокъ.

§. 369. Я буду говорить объ обѣихъ жидкостяхъ сихъ, и въ первыхъ о сокѣ поджелудочной железы, который кажется двумъ прочимъ разводицельнымъ жидкостямъ, о коихъ доселѣ го-
во-

(*) Laur Claussen de intestini duodeni situ et nexu. Lips. 1757. 4. recus. in cl. Sandifort thes. Vol III.

Et huius ipsius cl. Leidenfis Professoris tabulae intestini duodeni. LB. 1780. 4.

ворено было, слюнѣ по естѣ и желудочному разтвору, какѣ по свойству, такѣ и по опправленію кажется бытъ весьма подобнымѣ.

§. 370. Ибо хопя съ трудностію достпашъ можно изѣ здороваго живошпаго чистый и настоящій сокѣ поджелудочной железы; однакѣ все то, что шокмо презѣ опыты о свойствѣ онаго ни извѣдано, показывашъ то, что онѣ во всемѣ подобенѣ слинѣ. Почему теперь кажется и ненужно упоминать о несправедливыхѣ положеніяхѣ Франциска Сильвія (*) и послѣдователя его Регнера де Графа (**), Флоріана Шуиля (***) и другихѣ о мечпашельной и въ одномѣ только воображеніи существующей сел жидкости кислотѣ, кои положенія давно уже оппинушы славными мужами, какѣ то Г. Пехлиномѣ; (****)

Швам-

(*) De chyli a faecibus aluinis secretione. LB. 1659. 4.

(**) De succi pancreatici natura et usu. ib. 1664. 12.

(***) Pro veteri medicina ib. 1670. 12.

(****) De purgantium medicamentorum facultatibus ib. 1672. 8.

Шваммердамомъ (*) и Бруннеромъ, (**)
извѣщая по, что положенія оныя мо-
гушѣ служишѣ шѣмъ доказательствомъ,
сколь пагубною могла бы учиниться дѣ-
ятельная врачебная наука, ежели бы не
была основана на здоровомъ познаніи
человѣческаго естества!

§. 371. Источникомъ же описывае-
мая здѣсь жидкости, на пасоку и сли-
ну похожей, есть такъ называемая под-
желудочная железа (***) (pancreas), изъ
всѣхъ человѣческаго шѣла сгромажен-
ныхъ железъ величайшая, которая во
всемъ сходствуешѣ, а наипаче въ стро-
еніи своемъ, съ слюночными железа-
ми, потому что изпочищельные ея
прошoki, начинаясь въ ея составѣ само-
малѣйшими каналъцами, мало по малу
стекающся наконецъ въ общіи прошokъ,
Иваномъ Григоріемъ Вирсингомъ, въ
1642 году въ мершвомъ человѣческомъ
шѣ-

(*) *Observationum anatomicar. collegii privati
Amstelodamens. P. II. in quibus praecipue
de plicum pancreate eiusque succo agitur.
Amst. 1673. 12.*

(**) *Experimenta nova circa pancreas. Amst.
1687. 8.*

(***) *Santorini tab. posthum. XII. fig. 1.*

тѣлѣ изобрѣщенный и общему свѣдѣнію преданный (*).

Каюзый Вирсинговъ прошокъ (*ductus Wirſingii*), проницающій оболочки двенадцатиперстной кишки, почерпаемый имъ изъ поджелудочной своей железы, сокъ непрерывнымъ изкапаніемъ во внутренность кишки изливается.

§. 372. На концѣ кажется, что и изверженіе соку сего такими же вспомогается силами, какія упомянуты были при отдѣленіи и изліяніи слюны, давленіемъ то есть и поощреніемъ.

Давленіемъ сокъ сей выжимается иначе [тогда, когда желудокъ, будучи исполненъ пищею, возлагается на железу сію, подъ нимъ лежащую, и оную давитъ].

Чтожъ до поощреній, сокъ изъ поджелудочной железы изтекаеть понуждающихъ; то изъ нихъ суть: какъ самая не

(**) *Figura ductus ejusdem multiplicibus suis ramulis nouiter in pancreate a Jo Georg. Wirſing Phil. et Doct. in diuersis corporibus humanis obseruati. Paduae 1642. haec inscriptio est tabulae istius archetypae, sed impenſae raritatis, quam Wirſingius ipse fieri curauerat et cuius exemplo me donavit cl. Caldani.*

не совсѣмъ еще сварившаяся, пища, изъ желудка въ двенадцатиперстную кишку перешедшая, такъ и желчь, чрезъ то же самое низтекающая отверзтіе, чрезъ которое и сокъ изъ железы сея изливается въ кишки.

§. 373. Употребленіе и польза жидкости сея безъ сомнѣнія есть та, чтобы разтворять недоваренную въ желудкѣ пищу, когда она, смѣшавшись съ помянутою сырою пищею, болѣе и болѣе перевариваетъ оную, дѣлаетъ ее подобною внутреннимъ нашимъ влагамъ и учиняетъ способною къ выработыванію изъ нея питательнаго сока.



ОТДѢЛЕНІЕ XXX.

О желчи (*de bile*).

§. 374. Къ отдѣленію желчи опредѣлена отъ природы печень (*) (*hepar*), оная самая тяжелѣйшая и большая всѣхъ прочихъ внутренностей, которая въ младенцѣ, находящемся въ употребѣ, шѣмъ

(*) Eustachii tab. XI. fig. 3. 4.

Ruyisch thes. anat. IX. tab. IV.

Santorini tab. posth. XI.

пѣмъ болѣе бываетъ, чѣмъ ближе онъ къ своему зачатію, и которыя необходимость и преимущество въ строеніи человеческого пѣла открываются изъ того, что она всѣмъ вообще, красную кровь имѣющимъ, животнымъ такъ есть общая, какъ самое сердце.

§. 375. Печень имѣетъ существо совсѣмъ особливаго рода, которое при первомъ на него воззрѣніи ясно отличается отъ существа прочихъ внутреннихъ. Оно состоитъ изъ мягкаго грибоватаго и довольно нѣжнаго переплетенія (parenchyma), цвѣту всѣмъ извѣстнаго, которое усѣяно (*) чувствительными жилами, равно какъ и пасочными сосудами, а наипече на поверхностяхъ печени усматриваемыми (**), и снабжено желчными протоками и великимъ мно-

Щ

же-

(*) V. cl. Walter opus pluries iam citatum, maxime tab. IX.

(**) Maur. v. Reyerhorst de motu bilis circulari eiuſque morbis tab. I. fig. 1 2.

Ruyſch ep. problem. V. tab. VI.

Werner et Feller descriptio vaſor. lacteor. atque lymphaticor. Fascic. I. tab. III. et IV. etſi in eaſdem icones animaduertit cl. Fr. Aug. Walter annotat. academicar. p. 101 ſq.

жествомъ довольно пространныхъ кровеносныхъ (*) сосудовъ разнаго вида, о коихъ въ особенноти нѣчто предложить слѣдуетъ.

§. 376. И въпервыхъ о крововозвратной воронной жилѣ (vena porta), особливо въ которой и отъ всѣхъ прочихъ жилъ отличномъ видѣ и продолженіи уже нѣчто сказано въ §. 86, что по ея пень ея состоишь изъ весьма многихъ чревныхъ крововозвратныхъ жилъ, который, будучи облеченъ и укрѣпленъ клѣшчешымъ влагалищемъ, обыкновенно Глиссоною (**) сумочкою (capsula Glissonii) называемымъ, при самомъ входѣ своемъ въ печень раздѣляется на двѣ вѣтви, кои, проницая болѣе и болѣе въ существо печени, на безчисленныя и весьма мѣлкія раздѣляющіяся вѣтвочки, распространяющіяся по всему составу печени; по чему Галенъ давно уже раздѣленіе и связь оныхъ сравнилъ съ деревомъ, превратно насажденнымъ, коего

КО-

(*) V. Haller. icones anat. fascic. II. tab. II.

(**) Glissonii anatomia hepatis p. 305 sq. ed. 1659.

корни въ животѣ разпростерты, а въшви водружены въ печени (*).

§. 377. Другой родъ кровеносныхъ сосудовъ, коимъ благопробышлено печени, составляетъ печеночная бѣющая жила (arteria hepatica), отъ брюшной бѣющей жилы произходящая, которая въ разсужденіи величины своей и раздѣленій на части хощя воротной жилы и меньше; однакъ подобно оной раздѣляется на весьма мѣлкія жилочки, по всей печени распростирающіяся.

§. 378. Обоого же порядка кровеносныхъ сосудовъ самыя послѣдніе концы перемѣняются въ насшоящія крововозвратныя жилочки, кои, мало по малу стекаясь вмѣстѣ, составляютъ на конецъ большіе пни, въ полую крововозвратную жилу (cava vena) опверзающіеся.

§. 379. Концы сїи, коими въпочки крововозвратной печеночной и воротной жилы вселяются въ первоначальныя основанія крововозвратныя положія жилы, составляютъ весьма тонкіе сосуды, въ

Щ 2

само-

(*) De venar. arteriarumque dissectione p. 109. ed. Oper. Basil. 1562. Cl. I.

самомблчайшіе шарики свернутые (*), коими нѣкогда обманулся Малпагій пакъ, что почелъ (**) ихъ за шестіугольные полныя опдѣлительныя желѣзные зерна.

§. 380. Изъ шариковъ оныхъ кровеносныхъ печеночныхъ сосудовъ производящъ на конецъ желчныя протоки (rogі biliarіi), то есть весьма мѣлкія трубочки, кои опдѣляютъ изъ крови желчную влагу, и, соединившись въ одномъ общемъ протокъ, печеночнымъ обыкновенно называемомъ (ductus hepaticus), выводящъ на конецъ ее изъ печени.

§. 381. Спрашивано же было, изъ какой бы крови непосредственно опдѣлялась желчь, изъ боевожилъной, или изъ той, кую порую приносилъ въ печень воротная крововозвратная жила?

Первому запросу хотя кажешся съ перваго взгляду и удовлетворяешъ сходство прочихъ опдѣленій, кои обыкновенно къ бѣющимъ принадлежатъ жиламъ; однакъ ежели подробнѣе вникнуть

(*) Nesc. Maximow. Ambodick de hepate. Argent. 1775. 4.

(**) De viscerum structura pag 11. ed Lond. 1669.

нушь въ дѣло, по узнаемъ, что гораздо большее въ отдѣленіи желчи участіе имѣетъ воротная жила: потому что ея темноцвѣтная и горючимъ веществомъ исполненная кровь повсему соотвѣтственна естъ свойству желчи, которое отъ свойства крови печеночною бѣгущею жилою изъ брюшной жилы почерпаемая и въ печень приносимая естъ совсѣмъ отлично.

Чтожь принадлежитъ до доказательствъ, отъ сходства отдѣленій почерпаемыхъ, по само по себѣ явствуетъ, что воротная крововозвратная жила, поелику взглядомъ раздѣленія ея на вѣтви съ бѣгущею жилою сходствуетъ, можетъ также сравняться съ оною и въ разсужденіи отдѣленія желчи; сіе мнѣніе мое кажется подтверждаетъ и то сходство, которое находится между печенью и легкимъ, когда въ легкомъ великіе оныя легочные сосуды предопредѣлены къ совершенію дѣйствія легкаго, а бѣгущая напротивъ того жила, разпростирающаяся по духодвижнымъ его каналамъ, служитъ единственно питанію легкаго; куды, ежели не ошибюсь, кажется отнести должно и употребленіе печечной бѣгущей жи-

лы; хотя впрочемъ и не отвергаю того, что можетъ быть и бѣющая жила нѣкошорымъ маловажнымъ и недовольно яснымъ образомъ споспѣшествуетъ къ отдѣленію желчи.

§. 382. Отдѣленная она въ печени желчная влага хотя тихо, однакъ безпрерывно чрезъ печеночный протокъ изъ печени истекаетъ, и ежели двенадцатиперстная кишка бываетъ пуста; то вдругъ чрезъ общій желчный протокъ (*ductus cholidochus*) изливается въ оную; а когда кишка сія наполнена пищею, изъ желудка въ нее перешедшею; то желчь должна другимъ, а не симъ печени путемъ, то есть изъ желчного чрезъ пузырежелчный протокъ (*ductus cysticus*) должна она входить въ желчный пузырь (*vesica fellea f. cystis*), и въ такомъ случаѣ именоваться пузырною желчью (*bilis cystica*). (*).

§. 383.

(*) Въ быкахъ и другихъ скотахъ кромѣ выше упомянутыхъ находясь еще и другіе особенные протоки, печеночнопузырными называемые, коими желчная жидкость изъ самой печени истекаетъ въ желчный пузырь. V. observat. anat. collegii pri-

§. 383. Желчный пузырь есть не что иное, какъ мѣшечекъ, почти груши видъ имѣющій, съ печенью на сводоподобной ея сторонѣ соединенный, который составляютъ три оболочки, изъ коихъ

Внѣшняя, не вездѣ покрываетъ пузырь, и происходитъ отъ брюшины.

Средняя, чувствительножильною именуемая, доставляетъ пузырю такую крѣпость и твердость, какую доставляетъ подобная перепонка желудку, кишкамъ и мочевому пузырю..

За симъ слѣдуетъ самая внутренняя (*), со внутреннею желудочною плѣвою (§. 359) нѣкоторымъ образомъ сходствующая въ томъ, что она какъ много-

чи-

privati Amstelodamens. P. I. Amst. 1667. 12.
p. 16. fig. 7.

It. Ferrault Essais de Physique T. I. p.
339. tab. II.

И такъ напрасно таковые пропоки и
человѣческой печени приписывали нѣкоторые
мужи какъ по: de Haen in rat. me-
dendi contin. P. II. p. 46 sq. tab. X. fig. 1.

It Pitschel in anat. u. chirurg. Anmerk.
Dresd. 1784. 8. tab. I.

(*) Rayfch epist. problem. quinta tab. V. fig. 3.

численные кровеносные сосуды имѣетъ, такъ и многими усѣяна (*) морщинами, кои часто изображаютъ весьма изрядныя рѣшетообразныя клѣпочки.

§. 384. Пузыря сего шея имѣетъ видъ рожнеподобный или коническій, который на конецъ превращается въ желчный ея испокъ не прямо, но излучисто проспирающійся, который внутри снабженъ нѣкоторыми серпообразными за-
слоночками (**).

§. 385. Описываемый здѣсь пузырь содержитъ въ себѣ желчь до тѣхъ поръ, пока она чрезъ покатое направленіе, когда то есть человекъ ляжетъ навзничъ, сама собою не выпечетъ изъ онаго, или давленіемъ въ близи находящихся щелей и подвздошной кишокъ, также давленіемъ и ободочной, поперечъ чрева лежащей, кишки, во время прохожденія
чрезъ

(*) Cl. Calp. Fr. Wolff de vfulplicarum, quae in vesiculis felleis nonnulorum corporum inveniuntur. in Act. Acad. Scient. Petropol. a. 1679. P. II.

(**) Id. cl. Wolff de vesiculae felleae humanae ductusque humani cystici et choledochi superficialibus internis l. c.

It. cl. Fr. Aug. walter. l. c. tab. I.

чрезъ нее калу не вынудится (*) изъ пузыря въ близкую къ ей двенадцатиперстную кишку.

Могутъ также изъ пузыря вынудить желчь и находящіяся въ двенадцатиперстной кишкѣ какія либо поощренія (stimuli).

А что и самая сжимательность пузыря, изъ живоразниманій (vivisectiones) и болѣзненныхъ припадковъ довольно открывающаяся, хотя въ чемъ желчный пузырь и никакой раздражительности не имѣетъ (§. 306), можетъ также споспѣшествовать къ изхожденію оному желчи, сѣе кажется бытъ не мало въ рошнымъ, наипаче, когда желчь, содержащаяся въ пузырьѣ, учинится оспрокъ.

§. 386. Пузырная желчь, хотя вообще подобна естъ печеночной желчной влагѣ; однакъ отъ долгаго пребыванія своего въ пузырьѣ учиняется вязче и горьше, къ чему не мало споспѣшествуютъ пузырежелчныя пасочныя жилы (venæ lymphaticæ) (**), вбирающія въ
Ѣ
себя

(*) Cl. Caldani institut. physiolog. p. 364 sq. ed. Patav. 1778. 8.

(**) V. Reverhorst l. c. tab. II fig. 4.

Ruych. l. c. tab. v. fig. 4.

Werner & Feller l. c. tab. II. fig. 5.

себя водяныя части, въ желчи находящіяся.

§. 387. Теперь слѣдуетъ говорить о самой желчи, такъ какъ весьма важной влагѣ животной, о свойствѣхъ копоры и пользѣ изъ давнихъ временъ даже до селѣ гораздо больше происходило споровъ и письменныхъ прѣній, нежели о всякой другой человѣческой влагѣ.

Все же, что ни говорено будетъ о желчи, надлежитъ относить къ пузырьной, такъ какъ совершеннѣйшей предъ печеночною, и удобнѣйшей къ полученію оныя для изслѣдованія ея свойствъ.

§. 388. Желчь, вынутаая изъ свѣжаго трупа возрастныхъ лѣтъ и припомѣ здороваго человѣка, представляетъ влагу, нѣсколько вязкую, цвѣту изъ темнозеленаго (*) (*color brunneopraefinus*), не имѣющую запаха, но вкусу, ежели сравнить ее съ желчію животныхъ, нѣсколько горьковатаго.

§. 389. Хотя части, желчь составляющія, сами по себѣ такъ удобно, какъ части крови, однѣ отъ другихъ не
оп-

(*) De coloris in bile varietate v. Bordenave analyse ge la bile in Mem. presentes &c. T. VII. pag. 611.

опредѣляются; однакъ ихъ безъ дальняго труда изслѣдовать можно, и по истиннѣ кажется, что онѣ имѣютъ нѣкоторое, хотя впрочемъ несомнѣмъ еще доказанное, сходство съ первоначальными частями крови.

Ибо желчь, касательно ея первоначальныхъ частей, содержишь въ себѣ воданость, которую нѣкоторыя въ недавнемъ времени называли слинною частію (*salivalis pars*), которая съ водянымъ началомъ крови и нѣкоторымъ образомъ, хотя впрочемъ и не во всѣхъ отношеніяхъ, сравнена быть можетъ съ пасокою кровяною (*serum sanguinis*).

Далѣе изъ желчи можно достать немного и бѣлаго, нѣкоторую вязкость имѣющаго, вещества, которое имѣетъ, хотя впрочемъ и далекое, сходство съ клейкою кровяною пасокою (*lympha sanguinea*).

На конецъ, что всего замѣчательнѣе, находится въ желчи и горючее начало (*) (*phlogisticum principium*), отъ

Б 2

кро-

(*) De huius elementi summa in felle dignitate
v. Gul. Moore de bile. Edinb. 1780 8. p.
21 sq.

крови ворошной жилы, шаковымъ же началомъ исполненной, происходящее.

§. 390. Сему горючему началу, которое въ высушенной желчи, а наипаче въ желчныхъ камняхъ (cholelithi) (*) открывається шѣмъ, что они, ежели ихъ положишь на огонь, удобно загараются, должно приписывать шѣ особливя качества, кои опличаютъ ее отъ всякой другой внутренней влаги, каковыя качества суть: ея цвѣтъ, вкусъ и прочая; съ другой стороны кажется, что и силы желчи, ниже сего изчисляемыя, по большей части отъ горючести же производить должно.

§. 391. Свойство же желчи не есть шаково, чтобы ей подобно мылу одинаково съ водой, какъ и съ масломъ соединяться, и быть въ состоянїи сїи два про-

(*) Ибо хощя великое находися различіе между пузырежелчными камнями какъ въ разсужденїи ихъ вида, такъ кристаллизованїя и прочая; однакожъ сколько я ни изслѣдовалъ оныя, всегда находилъ такое между ими сходство, что отъ огня удобно загараются, и что составъ ихъ нѣкоторымъ образомъ сходствуетъ съ составомъ кишоваго жиру (fretta ceti).

противныя начала смѣшивать и соединять вмѣстѣ, каковая Боергава погрѣшность послѣ опытовъ, опъ Г. Шредера (*) надъ нею учиненныхъ и по томъ другими болѣе и болѣе подтвержденныхъ (**) и далѣе разпространенныхъ, опъ многихъ уже Физіологовъ оставлена; но что бы въ противномъ случаѣ, ежели начала оныя будущъ вмѣстѣ соединены и смѣшаны, опять отдѣляшь (***) ихъ одно опъ другаго, и хощя впрочемъ сама она и не есть целочная (****); однакъ кислошу и броженіе столько отвращашъ, сколько гнилость и шакъ далѣе.

Ъ 3

§. 392.

(*) EJ. experimentor. ad veriorem cyfficae bilis indolem explorandam captorum Sect. I. Goetting. 1764. 4.

(**) Paucos e multis citasse sufficiat:

Spielmann de natura bilis. Argent. 3767. 4.

Ger. Gyfb. Ten Haaf de bile cyffica LB.

1772. 4.

Seb. Goldwitz neue Vers. zu einer wahren Physiol. der Galle. Bamberg. 1785. 8.

Dav. Willink consideratio bilis. LB. 1778. 8.

(***) Marherr praelect in Boerhavi institut. Vol. I. p. 463. 478. ed. 1785.

(****) Cf. Curatas Wachendorfii et Woertmanni bilis bubulae analyses in Huj. diff. de bile, vtilissimo χηλοποιήσεως instrumento. Ultraj. 1745. 4.

§. 392. Откуда удобно познавается наспоющая и припомб великая и многоразличная польза, каковую въ выработываніи питательнаго сока имѣетъ желчь.

И вопервыхъ желчь изъ смѣшенной оной пищи, въ видѣ кашицы сбровашаго цвѣта (chymus) изъ желудка въ двенадцатиперстную кишку перешедшей и сокомъ поджелудочной железы больше и больше разтворенной, когда низойдетъ она въ тонкія кишки, мало по малу дрожжи или несваримыя части осаждаются на низъ, а питательную жидкость или сокъ воздымаетъ и отъ оныхъ отдѣляетъ.

Однакъ и самая желчь вмѣстѣ съ оными на двѣ раздѣляется части, по естѣ, на водяную и флогистическую или горючую; изъ коихъ послѣдняя, соединяясь съ упомянутыми частями, придаетъ имъ всеобщій извѣстный цвѣтъ, и по томъ извергается низомъ, а первая, смѣшавшись съ питательнымъ сокомъ, возвращается съ нимъ, ежели не ошибаюсь, въ пошокъ крови.

И такъ, тяжкая для крови горючаясь первѣе отнимается отъ нея
въ

въ печени, и употребляется къ совершенію особливыхъ весьма полезныхъ для пѣлоустройства влаги; по томъ, оправивши должность свою, такъ какъ непотребная и вредная здравію часть вмѣстѣ съ каломъ изъ пѣла извергается.

Кромѣ сего желчь твердый воздухъ (aër fixus), въ питательномъ сокѣ находящійся, отъ него отдѣляется и служитъ кишкамъ побужденіемъ къ лучшему совершенію червообразнаго своего движенія, не упоминая уже о прочихъ пользахъ, мнѣ не столько, какъ другихъ вѣроятными, кажущихся; каковыя на пр. суть: изліяніе ея въ шощій желудокъ и возбужденіе всалканія, что, какъ кажется, въ здоровомъ человѣкѣ едва случается, и прочая.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXI.

О дѣйстви селезенки (de functione lienis).

§. 393. Съ печенью какъ по союзу сосудовъ, такъ и по сходству дѣйствія въ недалекомъ разстояніи соединена селезенка, (*) по лѣвую сторону нату-

Ъ 4

про-

(*) Quicquid ad sua usque tempora de lienis innotuerat, studiose collegit, et succincte exhibi-

противъ оныя лежащая, продолговатое очертаніе (*) (*figura oblongata*) имѣющая, кошорая хопя вообще какъ бы примѣняется къ около лежащимъ внутренностямъ; однакъ, не взирая на сіе, многоразличнымъ подвержена бываетъ перемѣнамъ какъ въ разсужденіи начертанія или вида своего, такъ числа и другихъ, такъ ска-зашъ, игралищъ (**) природы.

§. 394. Селезенка есть цвѣшу синяго, спроеія же совсѣмъ опмѣннаго, мягкаго, кропкаго (*friabilis fructura*) и удобораздираемаго; почему облечена она сугубымъ покровомъ, однимъ ей собственнымъ, а другимъ такимъ, кошорый кажется отъ сальника производимъ.

§. 395. Положеніе и величина селезенки кромѣ шого, что онъ не рѣдко шоликимъ же подвержены перемѣнамъ

hibuit Car. Drelincourt fil. de lienosis ad calcem opusculor. Patris, ex ep. Boerhaavii p. 720 fq.

Tum vero cf. Chr. Lud. Roloff. de fabrica et functione lienis. Erf. ad Viadr. 1750. 4.

(*) Eustachii tab. XI. fig. 8. 2.

Bidloo vindiciae delineationum anat. contra animadv. Ruyschii LB. 1607. 4. tab. III. fig. 1.

(**) V. cl. Sandifort Natuur en genees-kundige Bibl. Vol. II. p. 345 fq.

намъ , какъ и ея очерченіе или видъ , еще бывающъ различны и по различному состоянію желудка ; то есть селезенка раздута бываетъ до тѣхъ поръ , пока желудокъ находится шощимъ и обвислымъ ; а когда желудокъ исполнится ѣствами ; тогда селезенка отъ него сдавливается и опраспывается.

Кромѣ сего она безпрестанное, хотя впрочемъ и легкое , однакъ равное, имѣетъ движеніе, послѣдующее дыханію , съ первѣйшимъ коего орудіемъ , грудобрюшною то есть преградою , въ весьма близкомъ находящися она разстояніи.

§. 396. Нѣкогда приписывали селезенкѣ клѣшчатое строеніе и сравнивали оное съ пещеристыми плѣлами дѣшпороднаго мужескаго члена , полагая основаніемъ таковому мнѣнію совсѣмъ ложное доказательство , которое подробнѣйшимъ человѣческія селезенки изслѣдованіемъ совершенно отвергается (*) : ибо изъ него научаемся мы , что внутренность сія почти вся состоитъ изъ кровеносныхъ сосудовъ , судя по умѣренной ея

Ъ 5

ве-

(*) V. Lobstein diff. nonnulla de liene sifens. Argent. 1774. 4.

величинѣ весьма пространныхъ такъ, что селезенка больше всѣхъ частей человеческого шѣла избыточествуетъ кровію.

§. 397. И во первыхъ бѣющая селезеночная жила (arteria lienalis) по великой плевы своея шонкости и купно крѣпости, опытами Г. Випрингама довольно подтвержденной, замѣчательная, раздѣляясь на безчисленные отрасли, представляющъ на конецъ видъ мякишу подобныхъ кисточекъ, изъ коихъ по томъ раждающіяся крововозвратныя селезеночныя жилочки, мало по малу въ весьма пространныхъ, слабыхъ и удоборазстягиваемыхъ пняхъ соединяющіяся.

§. 398. Соединяется же и утверждается великое сіе кровеносныхъ сосудовъ собраніе небольшимъ клѣпчатнымъ переплещеніемъ, откуда производящъ ласочныя возвратныя жилы, коихъ пни по большей части проспираются на вогнутой (fima facies) ея сторонѣ между вышепомянутыми ея перепончатыми(*) покровами.

§. 399.

(*) Особливый и нѣкопорымъ образомъ чудныя Невзона, мужа впрочемъ преизящнаго, мнѣ-

§. 399. Таковое мягкое и весьма много крови въ себѣ вмѣщающее селезенки устройство есть во всемъ соопвѣстственно тому, что выше (§. 395) сказалъ я о кровонадупии (tumor sanguineus) сея внутренности; скопленіе же и медленное обратно изпеченіе багряной жидкости изъ селезенки, принявъ вмѣстѣ въ разсужденіе свойство и союзныхъ съ нею внутренностей, поясняетъ особое качество селезеночной крови, которое на концѣ кажется ясно показывается и самое дѣйствіе сея гаданіямъ, подлежащія и поликократные споры производившія внутренности.

§. 400. Что до крови, изливаемой селезенкою; то она есть очень жидка и тонка, которая весьма прудно стущается и весьма прудно испускаетъ изъ себя свою водяность или пасоку (serum); цвѣтъ ея есть темносиній, каковой обыкновенно бываетъ въ зародышѣ; что все кажется показываетъ

ве-

мнѣнія о дѣйствіи селезенки, коея сосуды почищаетъ онъ за испражнительные протоки и прочая, смотри въ сочиненіи его, коему заглавіе *Experimental Inquiries R. the ad. Lond. 1777. 8. C. II. S. XLV sq. XV sq.*

великое избыточество горючаго начала (phlogiston): которое (начало) очень легко и при томъ необманчиво извѣдалъ я собственнымъ опытомъ, положивши кружками изрѣзанные кусочки человѣческой селезенки въ обезгорюченный воздухъ, отъ прикосновенія коего весьма живо краснѣлись помянутые селезеночные кусочки, и воздухъ, мало по малу лишаясь своихъ огненныхъ частицъ, съ противной стороны селезеночнымъ горючимъ веществомъ исполнялся.

§. 401. Теперь, принявъ въ разсужденіе все выше сказанное о селезенкѣ, когда разсуждаю я о томъ, что селезенка есть одна такого роду внутренность, которая кромѣ кровеносныхъ сосудовъ, къ печени простирающихся, никакого испражнительнаго прохода не имѣетъ; то кажется, что вся польза ея состоитъ въ томъ, чтобы служить печени касательнo ея дѣйствія, и купно споспѣшествовать къ пріуготовленію желчи, доставляя оной горючія части.

§. 402. Къ подтвержденію мнѣнія сего можно присоединить еще и новое премноговажное доказательство, полез-

лезнѣйшимъ для врачебной науки наблюденіемъ изобрѣшенное, изъ коего открывается, что пузырьная желчь въ тѣхъ животнохъ, изъ которыхъ прежде выпуща была селезенка (каковой опытъ изъ давнихъ временъ рѣдко повторяемъ былъ) часто блѣдною, (*) не имѣющею горячаго начала, оказывалась, коея припомъ пасочныя части ссѣдались и сгущались.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXII.

О дѣйстви сальника (*deſomenti functione*)

§. 403. желудочно - ободо - кишечный или большой сальникъ (**) (*omentum (gastrocolicum f. magnum)*), каковымъ именемъ означается онъ онъ малаго или печеночножелудочнаго сальника (*hepaticogastricum*)

(*) J. H. Schulze de splene, canibus exciso. Hal. 1735. 4.

(**) Eustachii tab. IX.

Halleri icones anat. fasc. I. tab. IV. K. M. - et colicam appendicem, quam ipse Goettingae. 3. 1740. indagauerat, ib. R.

Rob. Steph. Henrici descript. omenti c. icone noua. Hafn. 1748. 4.

сип omentum) (*), есть совсѣмъ оп-
мѣнное протяженіе брюшины, большею
•частью опъ внѣшняго покрова желудка
пронсходящее.

§. 404. Ибо хотя въ пустотѣ чрев-
ной почти безчисленные находяща про-
тяженія брюшины, и всѣ части, содер-
жимыя въ оной, объемлются и огражда-
ются оною такъ, что по вскрытіи брю-
ха ничего такого не оказывается, чтобы
не было покрыто оною, однакъ извѣ-
стно, что сіе различными совершающа
образы.

Ибо случается, что брюшина къ
нѣкимъ частямъ слегка шокмо прикасаеш-
ся; иныхъ нѣкоторую шокмо часть по-
крываешъ, чему подобное видимъ на поч-
кахъ, прямой заднепроходной кишкѣ,
мочевомъ пузырьѣ и нѣкоторымъ обра-
зомъ на поджелудочной языкообразной
железѣ и желчномъ пузырьѣ.

Иныя напротивъ того внутренности
хотя находяща у самыхъ стѣнъ чрев-
ной впадины; однакъ, подаваясь глубже
въ животъ, большею частью окружающ-
ся

(*) Eustachii tab. X. fig. I. G. H.
Haller I. c. Q.

ся брюшиною, что по справедливости сказать можно о печени, селезенкѣ, и даже о самомъ желудкѣ, мажкѣ и ядрахъ незрѣлаго зародыша мужескаго пола.

Различное опѣ сихъ состояніе есть кишекъ, исключая одну прямую кишку, конъ въ средину чрева проникающъ такъ, что весьма широкія протяженія брюшины съ собой увлекающъ, на коихъ онѣ висятъ, изъ коихъ протяженій одна брыжейкою или связкою тонкихъ, а другая брыжейкою или соединеніемъ полстныхъ кишекъ называется (*mesenterium et mesocolon*); къ каковымъ брюшины протяженіямъ должно причисать и широкія мажочныя связки (*ligamenta uteri lata*).

§. 405. Особливое и всѣхъ прочихъ брюшныхъ протяженій гораздо длиннѣйшее есть сальникъ (*omentum*), который есть нечто иное, какъ широкій и порожній нѣжнаго устройства мѣшокъ, висящій на большемъ згибѣ желудка, покрывающій большую часть тонкихъ кишекъ; который, присовокупляясь крѣпко къ излучинамъ кишекъ, вселяется въ ихъ промежутки.

§. 406. Сальникъ кромѣ кровеносныхъ, но немъ раздѣляющихся, сосудовъ имѣетъ еще

еще сальныя сѣшоподобныя полоски (retiformes tæniæ) (по причинѣ которыхъ перепонкѣ сей и имя таковое дано), кои въ жирныхъ людяхъ бывающъ такъ велики, что причиняющъ имъ досадную и небезопасную стягость, и коихъ вообще пучнымъ испареніемъ со всѣхъ сторонъ умащается сальникъ.

§. 407. Многіе знаменитые мужи думали, а Галлеръ даже спарался разными доказательствами подтвердить то, что сальниковый шукъ всасывается въ кровь и относится къ печени, дабы доставлять желчи масло и такъ далѣе. Но я о семъ премного сомнѣваюсь, будучи удостовѣренъ, что въ здоровой желчи никакого шука не находится, да и не могъ я даже въ жабахъ обрѣсти таковыхъ скважинъ, кои всасывали бы изъ сальника шукъ, и каковыя Малпигій (*) приписывалъ жабамъ; кольми же паче не находится ихъ въ человѣческомъ сальникѣ, о которомъ теперь идешъ слово.

§. 408. Справедливѣйшее же употребленіе и польза сальника, по общему согласію

(*) De omento, pinguedine et adiposis ductibus
pag. 26. ed. 1669.

гласію, кажется состоишь въ томъ, что бы доставлять мягкость кишкамъ, и слѣдственно поспѣшествовать всегдашнему ихъ движенію; каковое употребленіе кажется есть и другихъ подобныхъ сальнику небольшихъ сумочекъ, которыми ободанная (colon) (*) и заднепроходная кишка (rectum) (**) вездѣ обведены.

Кромѣ сего польза сальника есть еще и та, чтобы препятствовать сращенію кишекъ съ брюшиною, отъ чего по-длинно отправление первыхъ пище-проходныхъ дорогъ находилось бы въ замѣшательствѣ.

§. 409. Кромѣ сего не сходствуетъ кажется съ правдою и то общее мнѣніе, якобы то есть сальникъ данъ для отпрѣванія спужи отъ кишекъ; каковое употребленіе въ сальникѣ здороваго человѣка, который (сальникъ) никогда пукомъ исполненъ быть не долженъ, едва мѣсто имѣть можетъ.

Ы

Кро-

(*) Cl. Walter tab. nervor. thorac. et abdom. tab. II. m. m. m.

(**) Bidloo anatomia hum. corporis. tab. XXXIX. fig. 6. C. C. C. D D. D.

Кромѣ сего, ежели принявъ въ разсужденіе особливое строеніе сальниковъ, а наипаче печеночножелудочнаго; то не невѣроятнымъ покажется, что кромѣ выше показанныхъ пользъ есть еще и другая и припомъ можешъ быть самая первая, намъ еще неизвѣстная, польза сальника, которую далѣе изслѣдовать должно помощію сравнительнаго разнима-тія шѣлъ животныхъ (*Anatomia comparata*).



ОТДѢЛЕНІЕ XXXIII.

О дѣйствиіи кишекъ (*de functione intesti-
porum*).

§. 410. Кишечный каналъ, предъ коимъ протяженъ сальникъ, и въ ко-
рой, какъ видѣли выше (§. 367, 368),
сварившаяся въ желудкѣ пища пере-
ходишь съ шѣмъ, чтобы помощію даль-
нѣйшаго ея тамъ перемѣненія могъ оп-
дѣлиться отъ несваримыхъ частей пи-
тапельный сокъ (*chylus*), кишечный,
говору, каналъ раздѣляется на двѣ
главнѣйшія части, на тонкія и тол-
стыя кишки (*intestina tenuia et crassa*);
о дѣйствиіи коихъ порознь говоришь
имѣю.

§. 411.

§. 411. Тонкія (*) кишки раздѣляются на три части, на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку, (*intestinum duodenum, jejunum et ileum*).

Первой дано имя взглядомъ ея длины.

Второй по ея виду, то есть, что кишка сія въ свѣжѣмъ трупѣ оказывается сжавшеюся и какъ бы тощею, по тому, что въ то время она содержитъ въ себѣ кашлицѣ подобную жидкость, которая въ послѣдней изъ тонкихъ кишекъ дѣлаетъ отсѣдъ несваримыхъ ѣстественныхъ частей, и заключающійся въ нихъ твердый неупругій воздухъ (*aër fixus*) освобождаетъ и обнаруживаетъ такъ, что сія всѣхъ тонкихъ длинѣйшая кишка, по извиваніямъ своимъ во вздохахъ подвздошною названная, паче прочихъ надушою и даже подобно толстымъ кишкамъ въ разныхъ мѣстахъ на пузырьки раздѣленною представляется.

ЫІ 2

§. 412

(*) Chr. Bernh. Albini Specimen anat. exhibens novam tenuium hominis intestinorum descriptionem. LB. 1724. 8.

§. 412. Оболочки тонкихъ кишекъ вообще подобны сущь желудочнымъ выше-показаннымъ (§. 359) плевамъ.

Внѣшняя или наружная происходитъ отъ брыжейки.

Мышковая (*tunica muscularis*) состоитъ изъ двоякихъ волоконъ: то есть однихъ наружныхъ, вдоль простирающихся и внутренними пресѣкаемыхъ, а особливо на той части кишки, которая противоположена брыжейкѣ; а другихъ внутреннихъ кольцеобразныхъ или серповидныхъ (*falcatae fibrae*), пространство (*limen* кишечной трубы уменьшающихъ, когда напротивъ того первыя сокращающъ оную. Отъ обѣихъ волоконъ сихъ происходитъ та весьма живая и долго продолжающаяся раздражительность кишекъ, о которой выше сего (§. 305) говорено было.

Чувствительная оболочка (*nervosa*) состоитъ изъ плотной клѣпчатой плевы, которую легкимъ способомъ, а наипаче надуваніемъ, опять можно переменить какъ бы въ нѣкую пузырьную плеву (*). По сей самой плевѣ разпростерты на по-
добіе

(*) B. S. Albini annotat, Acad. L. II. tab. IV. fig. 1. 2.

добіе изящнѣйшихъ вѣничковъ или кусточковъ (*) кровоносные, отъ брыжейныхъ (**) происходящіе, сосуды, и она такуюже доставляетъ кишкамъ швердосць и крѣпосць, какую желудку.

За симъ послѣдуетъ самая внутренняя, по большей части въ тонкихъ кишкахъ, нежели въ прочемъ кишечномъ каналѣ ворсистой плевы (*villosa*) справедливое имя заслуживающая, оболочка, которая со внутреннею поверхностію чувствительною оболочки въ разныхъ мѣстахъ волнуется згибы и морщинныя складки составляетъ, которыя въ надутыхъ и высушенныхъ кишкахъ изображаютъ видъ серпа и называются Керкринговыми (***) заслонками (*valvulae Kerkringianae*).

§. 413. Самыя же волокна (*villi*), коихъ великимъ множествомъ (****) внут-

Ы 3

рен-

(*) B. S. Albini diff. de arteris et venis intestinorum hominis c. icon. colorib. distinct. LB. 1735. 4.

Ej. anotat. acad. L. III. tab. I. II.

(**) Eustachii tab. XXVII. fig. 2. 4.

(***) Kerkringii spicilegium anatomicum tab. XIV. fig. 1. 2.

(****) Circ. ad 500,000 contineri tenui intestino adulti hominis, Lieberkühnii ratio est.

ренная поверхность тонкихъ кишекъ усѣяна, и коихъ преизящное устройство, изъ весьма тонкихъ сосудовъ соспав-
ленное, подробнѣе излѣдовалъ Либер-
клинъ (*), когда не находясь въ кишкахъ
питательнаго сока, могутъ нѣкоторымъ
образомъ сравнены быть съ слабоотвѣ-
слыми пузырьками, мягкое ноздреватое
переплетеніе внутри имѣющими; а ко-
гда онѣ, напоясь онымъ кишечнымъ
млекомъ или питательнымъ сокомъ, и
отъ него раздуются; то, перемѣнивъ
образъ свой, почти сморчка (*phalus ascu-
lentus*) видъ представляющъ.

§. 414 Окружающа же сіи волокна
при основаніи своемъ безчисленными же-
лезистыми пузырьками, сидящими по
большей части въ чувствительно-
оболочкѣ, кои весьма малыми устьи-
щами отверзаясь въ кишечную полость
и въ оную изливаютъ свою слизь,
смазывающую весь кишечный каналъ (**).

Сіи

(*) De fabrica et actione villorum intestinorum
tenuium hominis. LB. 1745. 4.

(**) Jo Congr a Brun glandulae duodeni f. pan-
creas secundarium. Erf. 1715. 4. fig. 1.

Сѣ железы раздѣляются вообще на три отдѣленія: то есть 1) на Бруннеровы или большія (*glandulae Brunnerianae*) и при томъ раздѣльно сидящія, кои наипаче въ той части двенадцатиперстной кишки находятся, которая ближе къ нижнему устью желудка (*pylorus*).

2) На Пейеровы или меньшія, (*glandulae Peyerianae*), кучами сидящія, наипаче на другомъ краю тонкихъ кишекъ у заслонки ободочной кишки (*).

3) На Либеркиновы или самыя малыя, (*Lieberkühnianae*), про которыя утверждаетъ Либеркинъ (**), якобы ихъ до осьми у каждого волокна находится.

Но мнѣ кажется, что таковое слизеоточныхъ источниковъ раздѣленіе не на крѣпкомъ утверждено основаніи: потому что, ежели не ошибаюсь, какъ Бруннеровы, такъ и Пейеровы железы выше показанный видъ развѣ въ болѣзненномъ состояніи изображаютъ ;
ибо

(*) Jo. Conr. Peyer de glandulis intestinorum Scafsus. 1677 f. maxime fig. 3.

(**) Lieberkühn l. c. p. 17. tab. III.

ибо я сколько ни старался въ самыхъ даже здоровыхъ тонкихъ кишкахъ разнаго возраста людей обрѣсти таковыя грибовастыя, отверзшіе имѣющія, железы; однако никакихъ слѣдовъ ихъ примѣнить не могъ; напротивъ того въ спраждающихъ молошницею (arhta) людяхъ неоднократно видѣлъ я весь кишечный каналъ, усѣянный (*) безчисленнымъ множествомъ какъ особенныхъ, такъ и кучами сидящихъ железъ; изъ чего удостовѣренъ я, что изъ оныхъ железъ за настоящія почитать должно развѣ самыя малыя пшеновидныя слизепочныя железы, кои по осторожномъ снятіи мохнаповорсистой плевы на противной ей сторонѣ удобно видимы бывающъ, когда напротивъ того съ противоположащей стороны едва ихъ примѣнить можно.

§. 415. Кромѣ другихъ обыкновенныхъ изслѣдованій въ первые, ежели не ошиба-

(*) Сія кишечная молошница была совершенно подобна шѣмъ бугорочкамъ, кои сл. Шельдонъ въ ниже упоминаемомъ сочиненіи своемъ (tab. 1.) изобразилъ вмѣстѣ пузырьковъ, питательнымъ сокомъ исполненныхъ.

чрезъ кишки, волнистымъ и неправильнымъ сжиманіемъ больше перерабатывается и изъ двенадцатиперстной кишки въ полстѣя прогоняетъ: ибо хотя и не можно отвергать противочервообразнаго движенія кишекъ (*motus antiperistalticus*), концы кишки, всякъ двигаясь, стягиваются; однакъ оное въ здоровомъ человѣкѣ гораздо слабѣе, рѣжѣ и кратковременнѣе перваго.

§. 417. Отъ первоначальныхъ силъ, до селъ мною излагаемыхъ, то есть; какъ отъ недавно помянушаго движенія, такъ разводительныхъ соковъ (*tenstiva*) и внутреннихъ перемѣнятельныхъ влагъ, вездѣ съ питательносочною кашицею смѣшивающихся, такія достопамятныя въ кашицѣ оной происходятъ перемѣны, что она въ щей кишкѣ представляетъ одинакаго смѣшенія кашицу гораздо жиже, цвѣту почти сѣраго, а запаху кисловаго; а когда перейдетъ въ подвздошную; то начинаетъ раздѣляться на двѣ части; то есть: на отсѣдъ цвѣту изъ желтоблѣднотемнаго (*flavopallidobrunnei coloris*) (*),

а

(*) Уже сказано выше (§. 392), что желчный цвѣтъ испражнений должно производить

а запаху оператишельнаго, и на на-
стоящій питательный сокъ, поверхъ
отсѣду несваримыхъ частей плавающей,
изъ кашицы оной выработанный, посред-
ствомъ желчи отъ несваримыхъ оныхъ ча-
стей отдѣленный и ко всасыванію въ
млечные сосуды опредѣленный, который
въ послѣдующемъ отдѣленіи подробнѣе

Б 2

из-

дить отъ самыхъ же испражняемыхъ
частей желчи. Ибо хотя желчь, находясь въ
толщей кишкѣ цѣлою и съ кашницею ки-
шечною смѣшана и какъ бы разтворенна,
настоящаго своего цвѣту предсавить
не можетъ; однакъ, прошедши далѣе чрезъ
кишечный каналъ, когда раздѣлился на
двѣ части, то испражняемыя ея частицы,
смѣшавшись съ несваримыми бѣспренними
частями, и какъ бы опять усилившись,
показываютъ настоящій цвѣтъ, прида-
вая оный и испражненіямъ.

Но сл. Волфъ (in act. Petropol. 1779.
Р. II. Р. 245.) иныхъ мыслей о происхо-
жденіи желчнаго цвѣту испражненій, въ
подвздошной кишкѣ содержимыхъ, думая,
якобы новая часть желчи при концѣ то-
лщей кишки смѣшивается съ испражнені-
ями, выплывая изъ желчнаго пузыря и
проникая въ семь мѣстъ въ кишку и со-
дер-

изслѣдовать постараюсь; а теперь надлежитъ разсмотрѣть, какой путь проходить должны несваримыя и испражняемая бѣсѣнныя части?

§. 418.

держимую въ ней матерію, которая опмѣнно отъ желчи общаго протока не смѣшивается съ испражненіемъ, какъ она смѣшивается съ пищею, въ питательный сокъ превращающуюся, но цвѣтъ свой сохраняетъ даже до самаго прохода и пребываетъ одинакою.

Но кромѣ видимыхъ причинъ, для чего то есть цвѣтъ оный прежде раздѣленія питательносочной кашицы на свои части, примѣченъ бытъ не можемъ, я еще много сомнѣваюсь, можетъ ли въ живомъ и здоровомъ человѣкѣ желчь когда либо изъ своего пузыря выпрѣвать и въ ближнюю проницать кишку, когда я въ самыхъ свѣжихъ и почти теплыхъ трупяхъ не видалъ близкихъ къ печени кишекъ, желчью напоенныхъ, кои однакожъ кишки, по прошествіи нѣсколькихъ часовъ или дней по смерти, видѣлъ я довольно напоенными желчнымъ цвѣтомъ, когда то есть пузырь, будучи ослабленъ, содержимую въ себѣ желчь не могъ удерживать, которая, выпрѣвая сквозь пузырьныя плевы, смѣжныя части окрашивала своимъ цвѣтомъ.

§. 418. Онныя несваримыя части , по дальнѣйшемъ сгущеніи во время прохожденія своего чрезъ подвздошную кишку , должны наконецъ проходить сквозь заслонку ободочной кишки (*valvula coli*), и такимъ образомъ входить въ пуспону толстыхъ кишекъ ; для каковаго конца ближайшая крайность подвздошной кишки къ ободочной весьма многимъ количествомъ слизи внутри умащается, дабы тѣмъ удобнѣе могли онѣ чрезъ помянутую заслонку низходить въ подлежащее мѣсто.

§. 419. Есть же заслонка ободочной кишки (*), по имени изобрѣшателя своего справедливо Фаллопиевою (**) (*vulvula*

В 3

Fal-

(*) Haller de *valvula coli*. Goetting. 1742.

4. — *recus. in Oper. minor. T. I. p. 580 sq.*

Jo. Mich. Röderer. de *valvula coli*. Argent.

1763. 4.

(**) *Notissimi sunt de vero memorabilis huius valvulae inuentore auctorum dissensus, de quibus adeant, quorum interest, Halleri elementa T. VII. P. I. pag. 142.*

Впрочемъ я подлинно знаю , что изобрѣшеніе задолго до временъ тѣхъ , которымъ оно вообще приписывается , было совершенно извѣстно славному мужу , ешоль много разпространившему челове́че-

Fallorij) называемая, нечто иное, какъ короткое пропятие подвздошной кишки, низпускающей въ полость объемлющей ее толстой кишки, коего внѣшнія губы

ское шѣлоразниманіе, Гав. Фаллопійю; ибо находишся его нѣкопоярая любопытная книга въ Книгохранилищѣ нашей Академіи, въ коей кромѣ прочаго находишся раздробленіе (*anatomia*) обезьяны, въ которой онъ (*in demonstratione publica Patavii habita d. 2. Febr. a. 1553.*) строеніе и пользу ободощной заслонки слѣдующимъ изъясняетъ образомъ: Польза глухой кишки въ обезьянахъ есть та, что она препятствуетъ пищѣ возвращаться въ вышнія часны, потому что всѣ обезьяны наклоненно ходятъ; а что сія есть единственная польза, сіе открывается изъ того, что ежели впустишь воду въ проходную кишку или воздухъ, то онѣ доходятъ до глухой кишки, но далѣе оныя не проходятъ; но ежели влишь воду съверху; то проходятъ оныя. Причина сему есть та, что при соединеніи подвздошной кишки съ глухою находятся двѣ складки, которыя, при надушій и наполненіи какою либо матерію сжимаются такъ какъ въ сердцѣ, и препятствуютъ возвращенію оныя, почему ниже промывательныя могутъ доходить до часней оныхъ, такъ чтобъ чрезъ рвошу могли вышши вонъ, развѣ въ слабыхъ и недугомъ зараженныхъ кишкахъ.

бы съ выдающеюся глубже морщиною (ruga) ободочной кишки составлены (*) такъ, что не только подобно прочимъ таковымъ же складкамъ внутренняя только и чувствительножильная плеза, но даже и мышковой оболочки волокна входящъ въ сосавъ оныя, отъ чего производящъ сугубое дѣйствіе и употребленіе оныя, то есть: чтобы преняпствовать неправильному и безвременному изъ тонкихъ кишекъ прехожденію несваримыхъ ѣстныхъ частей въ толстыя, и обратному опшуда возвращенію въ тонкія.

§. 420. Толстая кишка, которую подобно тонкой на три части раздѣлили сочинители, воспріемлетъ начало отъ глухой (intestinum caecum), у которой находится червообразный отростокъ неизвѣстнаго (**) въ человѣкѣ

Б 4

упо.

(*) Recentis et intemeratae valvulae iconem exhibet B. S. Albinus annotat. Acad. I. III. tab. V. fig. 1.

Platu vero et exficcatione mutatam v. in Santorini tab. posth. XIV. fig. 1. 2.

(*) Lieberkühn de valvula coli et usu processus vermicularis. LB. 1739. 4.

Joach. Vossé de intestino caeco eiusque appendice vermiformi, Goetting. 1749. 4.

употребленія (*processus vermiformis*), и которая вообще изображаетъ весьма пространный жолобъ (*alveus*), устроенный съ шѣмъ, чтобы въ немъ калъ мало по малу собираться и до удобнаго изверженія содержаться могъ.

§. 421. Толстыя кишки какъ поперешикомъ или пространствомъ, такъ и толстою и крѣпостію оболочекъ своихъ превосходятъ тонкія, а наипаче мышковая оболочка шу имѣетъ особенность, что ея волокна, въ длину простирающіяся, исключая одну внѣшнюю часть прямой кишки (*intestinum rectum*), собраны въ три, такъ называемыя связи или полосы () ободочной кишки (*ligamenta coli*), раздѣляющія кишку какъ бы на пузыристыя доли. Что же до внутренней плевы, то она не столько волокнистоповорсавата, какъ въ тонкихъ, но больше сходствуетъ съ плевою, внутренность желудка выстилающею.

§. 422. Кажется, что толстыя кишки не столько живое имѣютъ извивно совершаемое движеніе, какъ тонкія; напротивъ того дѣйствіе брюшнаго

наго давленія надъ оными есть большее, нежели надъ тонкими, когда вся ободочная кишка весьма близко къ брюшину находится.

§. 423. Такимъ образомъ испражнимыя части употребленной пищи, содержаемыя въ полстыхъ кишкахъ, движущаяся медленно до тѣхъ поръ, пока на конецъ, перешедши въ прямую заднепроходную кишку (*intestinum rectum*), внутреннимъ поощреніемъ понуждая человѣка къ изверженію своему, которому поспѣшествуетъ недостатокъ въ сей кишкѣ поперечныхъ морщинъ, а наипаче великое изобиліе слизи, внутренность оная смазывающей.

Совершаетъ же изверженіе оное большею частію усиліе внизъ понуждающаго брюшнаго давленія (*prelum*), преодолевающаго сопротивленіе хвостцовой кости и обѣихъ сжимательныхъ заднепроходныхъ мышцъ (*sphincteres ani*), коихъ внутреннія волокна составляютъ значительный кольцеобразный пучекъ, внѣшнія же почти кожную изображаютъ мышку; по учиненіи чего и прекращеніи усилія опростаться отъ нечистотъ, подбемлющія задній проходъ мышцы (*levatorcs ani*) вовлекаетъ про-

ходную кишку внутрь, а сжиматель-
ныя замыкающъ (*) оную.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXIV.

О дѣйстви всасывательныхъ сосудовъ
(*de vasis absorbentibus*) (**).

§. 424. Изъ выше сказаннаго удобно
явствуетъ, что питательный сокъ, ко-
торый въ подвздошной кишкѣ опъ не-
сваримыхъ частей опдѣляется, состо-
итъ изъ многоразличныхъ влагъ. Но
что великое оное количество внутрен-
нихъ влагъ, то есть слины, желудочнаго
сока, также сока языкообразной железы,
кишекъ, желчи и прочая, кои, какъ вы-
ше видѣли, смѣшивающся съ превращаю-
щеюся въ питательный сокъ пищею, хо-
тя впрочемъ и не можетъ надлежаще быть
опре-

(*) V. omnes has partes ex utroque fexu in
Santorini tab. posth. XVI et XVII.

(**) Cf. ad hanc rictionem post sparsos antece-
ssorum labores:

W. Hewson's experimental Inquiries into
the lymphatic system Lond. 1774 3.

Cl. Sheldon et Werneri ac Felleri opera
alias citata.

It. cl. Mascagni prodrome d'un ouvrage sur
les vaisseaux lymphatiques &c. Senis. 1784. fol.

опредѣлено, однако жъ ту часть питательнаго сока, которая опредѣляется отъ ѣствъ, гораздо превышаетъ, сѣ кажется никакому сомнѣнію неподвержено. Откуда удобно рѣшенъ быть можетъ этотъ вопросъ, какимъ образомъ разнородныя ѣствы могутъ перемѣняться въ однородный, одинакій и съ природою животнаго сходный, млечноцвѣтный питательный сокъ?

§. 425. Пути, чрезъ кои протекають долженъ питательный сокъ, прежде нежели перейдетъ изъ кишекъ въ составъ кровяной, для коего онъ и опредѣленъ, составляютъ часть связи всасывательныхъ сосудовъ (*systema absorbens*), о коей до сихъ поръ развѣ кратко упоминаемо было, и о коей теперь нарочито говорить должно, которая заключаетъ въ себѣ четыре части, то есть: возвращныя, какъ млечныя, такъ и пасочныя жилы (*venæ lacteæ et lymphaticæ*), шаровидныя железы (*glandulæ conglobatæ*) и наконецъ грудной протокъ (*ductus thoracicus*), о коихъ всѣхъ порознь говорить слѣдуетъ.

§. 426. Что принадлежитъ до произхожденія изъ кишекъ млечныхъ сосудовъ, то почти никакого въ томъ не на-

находится сомнѣнїя, что они принадлежатъ къ вышепоказаннымъ внутренней плевы. волокнамъ; о томъ-то шокмо есть сомнѣнїе, изъ самыхъ ли оныхъ волоконъ непосредственно приходятъ они, или посредствомъ клѣпчатой плевы дальнѣйшее шокмо имѣющъ съ ними сообщенїе? Что до меня, то, сколько мнѣ извѣстно, ни я самъ, и никто другой даже доселѣ не могъ проникнуть да самыхъ крайностей млечныхъ сосудовъ такъ, чтобы могъ показатъ непосредственное оныхъ частей соединенїе; но кажется, что сосуды оныя вездѣ довольно великими пнями въ самыхъ кишечныхъ оболочкахъ начинаются, и, ежели догадываться можно, изъ клѣпчатой плевы ближней стороны пищевельный сокъ, прежде волокнами почерпнутый, въ себя вбирающъ и далѣе провозжающъ. Что самое не однократно удалось мнѣ примѣнить въ щенкахъ, въ коихъ я, сообразуясь съ опытомъ Г. Лиспера (*), за одинъ или за два часа до распластания оныхъ вливалъ Индѣйскую лазурь (*coeruleum Indicum*).

§. 427.

(*) Philos. Transact. N. 143. collato. N. 275.

§. 427. Самые же вышепомянутые пни млечныхъ сосудовъ сперва длиною нѣсколькихъ унцій на самой поверхности кишки подъ наружною ея оболочкою простирающаяся, а иногда угловатыми извилинами то идущъ впередъ, то возвращающаяся вспять, пока на концѣ вселятся въ брыжжейку.

§. 428. Въ самомъ же чрезъ брыжжейку печеніи въ разныхъ мѣстахъ входящъ въ брыжжейныя железы, кои можно раздѣлить на два рода; изъ коихъ однѣ близки къ кишкамъ и представляющъ разсѣянные небольшія, видъ Турецкаго бобу имѣющія, железы, а другія къ пріятелищу питательнаго сока (*resertaculum* f. *cisterna chyli*), состоящему изъ большихъ, вмѣстѣ соединенныхъ, железъ.

§. 429. Однако оба рода сѣи кажутся не иное что суть, какъ шарики млечныхъ сосудовъ, плотно содиненные, безчисленнымъ множествомъ кровеносныхъ сосудовъ переплетенные, (*), печеніе питательнаго сока замедливающіе на

(*) *Bæerhaavii et Ruyschii de fabrica glandular. opusculum* LB. 1722. 4. p. 81.

на потѣ можетъ быть конецъ, дабы онѣ отъ такого медленнаго теченія лучше совершенствовался, и, больше уподобляясь природѣ животнаго, такъ сказать приходилъ въ созрѣніе прежде, нежели внидетъ въ грудной прошокъ, а опшуда низольется въ мимошекущую кровь.

§. 430. Спрашиваемо было, имѣютъ ли и толстыя кишки млечныя жилы? что доказываемо и подтверждено было какъ дѣйствіемъ особливыхъ питательныхъ, или упоевательныхъ промываній (*clysteres inebriantes*) и прочая, такъ и тѣмъ, что испражняемая части употребляемой нами пищи чѣмъ долѣе пребываютъ въ толстыхъ кишкахъ, тѣмъ шверже и безсочнѣе учиняются.

Хотя доводы сїи ни коимъ образомъ не доказываютъ того, якобы нѣкоторый настоящій питательный сокъ изъ несваримыхъ ѣственныхъ частей, по протѣснѣи своемъ чрезъ Фаллопиеву заслонку, всасывался въ млечныя сосуды; однако симъ подтверждается то, что даже самымъ опытомъ извѣдано, что и толстыя кишки весьма великимъ количествомъ пасочныхъ возвращательныхъ жилъ снабжены, кои почти одинакія дѣй-

дѣйствія и устройство съ млечными сосудами имѣющъ такъ, что даже брѣжнейные млечные сосуды, когда долго не находятся въ кишкахъ пищеварительнаго сока, вбираютъ (*) въ себя пищу.

§. 431. Кромѣ вышепоказаннаго вопроса есть еще и другой большей важности и трудности къ рѣшенію, то есть: весь ли пищеварительный сокъ, поглощаемый тонкими кишками, обыкновеннымъ путемъ, то есть млечными сосудами и груднымъ протокомъ относится въ кровь, или находятся еще и другія, и при томъ каковыя сокровенныя дороги (*viæ clandestinæ*), коими также можетъ онъ вселиться въ потокъ кровяной?

Признаться должно, что всѣ доказательства оныя, коими старались поддѣрживать особенное нѣкоторое всасываніе пищеварительнаго сока кроносными возвращными жилами, не на твердомъ утверждены основаніи; почему Г. Руишя утвержденіе оное, якобы стягивается и затверждаетъ при нащупленіи спаросии брѣжнейныя железы такъ,
что

(*) V. Nuckii de inventis novis ep. anatomica
p. 146 fq.

что онѣ того учиняются неспособными къ дальнѣйшему опправленію своихъ дѣйствій, уже опринуто, и сверхъ того доказано, что и другія желѣзъ оныхъ приключенія, какъ то: затвердѣнія и прочая, несправедливо засореніями или завалами (*obstructiones*) называются, потому что и въ такомъ случаѣ большею частію пребывающѣ онѣ проходимы, и впускаемому въ нихъ живому серебру или ртуту дающѣ удобный входъ и проходъ.

Чтожъ до того явленія, изъ котораго открываеица, что теплая вода, будучи влипа въ вялыя крововозвращныя брыжжейныя жилы мертваго шѣла, проспунаетъ въ пусиоту кишекъ; то кажется, что оно никакой важности не имѣетъ къ доказательству выше помянушаго дѣйствія живаго шѣла; но меньше еще силы и важности имѣетъ та двуножная трубка, которую для подшверженія вышепоказаннаго мнѣнія изобрѣлъ Либеркинъ. Что же и до того ушверженія (*), якобы въ крововозвращныхъ брыжжейныхъ жилочкахъ видѣнъ былъ пишательный

(*) *Wagner et Feller l. c. p. 12 sq.*

ный сокъ; то кажется, что оно еще пребудетъ дальнѣйшаго изслѣдованія и подтвержденія такъ, что я и по сѣ время не удостоверенъ въ томъ, чтобы жилы сїи кромѣ крови, чрезвычайнымъ количествомъ горючей матерїи исполненной и къ отдѣленію желчи опредѣленной (*), что либо иное въ себѣ содержали.

Ъ

§. 432.

(*) Славный есть опытъ оный, который кажется съ перваго виду показываетъ сокровенные пуши питательнаго сока, и коего свѣдѣніемъ одолженъ я сл. Кальдану; то есть: когда ягненку или козлу прежде накормленному двоякую сдѣлашь перевязку, то есть перевязать крововозвратную жилу, которую онъ за лѣвую подключевую почитаетъ, и брызжейку у самаго ея происхожденія отъ поясничныхъ позвонковъ: то въ то время довольно явственными учиняются млечные и пасочные, между перевязокъ находящіеся, сосуды, также и шѣ, кои съ нижнихъ часней несутъ пасоку. Послѣ чего въ скоромъ времени вздуваются и млечные сосуды, въ брызжейкѣ между кишекъ и перевязокъ проходящіе, кои не много послѣ опоражниваются и исчезаютъ такъ, что совсѣмъ невидимыми учиняются

§. 432. Наконецъ самые пни млечныхъ жилъ равно какъ и другіе имъ весьма подобные, отъ спеченія и соединенія множайшихъ пасочныхъ сосудовъ начало свое воспріемлющіе (*), соединяются въ пріятелищъ питательнаго сока (*гесертасилум* f. *cisterna chyli*), каковымъ наименованіемъ обыкновенно отличаютъ его отъ низшей и проспаннѣйшей части груднаго, Пекветовымъ

на--

Однакожъ причину сего особливаго явленія кажется не столько отъ пошпаеннаго прехожденія питательнаго сока изъ млечныхъ сосудовъ въ крововозрашныя жилы, сколько отъ того, что производить должно, что млечные оныя сосуды не препятствующимъ заслонкамъ своимъ содержаемый въ себѣ питательный сокъ возвращаемъ движеніемъ, (каковымъ не давно удачно пояснилъ премногія болѣзненныя явленія сл. Дарвинъ) въ самую полость кишекъ прогоняютъ. Сіе пошому, что заслонки оныя не суть непреодолимы, но, какъ уже давно извѣстно, не совершенно замыкаютъ внутренность всасывательныхъ сосудовъ такъ, что не рѣдко при шѣлоразнимательныхъ пріуготовленіяхъ изъ пней къ вѣшамъ онымъ живое серебро удобно пенудить можно.

(*) Cl. Sheldon l. c. tab. V.

называемаго, (*ductus thoracicus* f. *Requetianus* ; протока.

§. 433. Грудной протокъ (*) есть перепоночный каналъ, тонкій, однако довольно крѣпкій, больше или меньше извистой, и часто удивительныя перемѣны, какъ направленія, такъ и раздѣленія претерпѣвающий, (**) который какъ мышковыхъ волоконъ, такъ и чувствительныхъ жилъ не имѣетъ, напрошивъ того снабженъ частыми заслоночками, который наконецъ почти при самомъ низшемъ шейномъ позвонкѣ, по прошествіи лѣвой подключевой крововозвратной жилы, и по обратномъ къ ней уклоненіи (***) , напоследокъ отверзается въ оную, имѣя въ самомъ отверзтіи своемъ особливаго устройства заслоночку.

Б 2

§. 434.

(*) V. Halleri observationes de ductu thoracico in theatro Gœttingensi factas. Gœtting. 1741. 4.

B. S. Albini tabula vasis chyliiferi. LB. 1757. fol. max.

(**) Cf. v. c. Jo Chrph. Böhli viae lacteae c. h. historia naturalis. Regiom. 1741. 4.

Cl. Sabatier. in Mem. de l'Ac. des Sc. de Paris. a. 1780.

(***) V. Halleri Opera minora Vol. I. tab. XII.

§. 434. Что до силъ, питательный сокъ какъ въ самыхъ млечныхъ жилахъ, такъ и грудномъ протокѣ прогоняющихъ; то кажется, что ихъ по большей части относить должно какъ къ сжимательности самыхъ млечнососудовъ, такъ и къ ихъ заслонкамъ; также къ силѣ, съзади понуждающей, и къ удареніямъ возлѣ лежащихъ боевыхъ жилъ.

§. 435. Что до употребленія вышепомянутой заслонки, у устья грудного протока находящейся, то вѣроятнымъ кажется, что она служишь не столько для воспятія входа крови въ оный, сколько для умѣренія прехожденія питательного сока въ подключевую жилу, въ кою онъ каплями изливается.

Ибо такимъ образомъ оберегается, что излишнее количество новоприходящаго питательного сока никогда не входитъ въ кровь; которое ежелибы входило, то не оптѣнно было бы должно внутреннія стѣны сердца сильно поощрять, и не надлежаще и при томъ съ большею трудностію быть перерабатываемо и перемѣняемо, пошому что свѣжій питательный сокъ состоитъ изъ началъ, соединенныхъ инородныхъ, не только изъ пер-
выхъ

выхъ путей посредствомъ млечныхъ жилъ, но и изъ всего шѣла чрезъ пасочные сосуды въ него перешедшихъ.

§. 436. Самыя же оныя пасочныя жилы (*) (*venæ lymphaticæ*), претію часть всасывательныхъ сосудовъ совершающія, хотя вообще какъ успроеніемъ своимъ, такъ и опправленіемъ сходствуя съ млечными сосудами; однако сущъ гораздо пространнѣе оныхъ, и можешъ быть по всему распростиравшися шѣлу; (**) большею же частію воспріемающъ онѣ происхожденіе свое отъ внѣшнихъ покрововъ; отъ подреберной плевры и брюшины (*pleura et peritoneum*), и отъ внутренностей, въ груди и брюхѣ содержимыхъ.

§. 437. Раждаются пасочные сосуды подобно млечнымъ, отъ кишекъ произходящимъ сосудамъ, такъ, что каждый пасочнаго сосуда корешокъ изъ возлѣ находя-

Ѣ 3 .

щей-

(*) Cf. preter alios passim citatos et adhuc citandos: Jo. Fr. Meckel. de vasis lymphaticis glandisque conglobatis. Berol. 1757. 4.

Cl. Alex. Moaro fil. de venis lymphaticis valvulosis. ib. eod. 8.

(**) W. Hunter's medical commentaries p. I. P. 5 sq.

шейся клѣпчатой плевы, такъ какъ бы изъ нѣкаго помѣстья своего (*territorium*) росоподобную влагу, въ оной содержащую, въ себя вбираетъ и далѣе прогоняетъ.

§. 438. Пасочные сосуды, въ печенѣи своемъ снабженные чаще или рѣже, смотря по ихъ мѣстоположенію, сугубыми заслоночками (*binæ valvulae*), вселяющіяся, хотя впрочемъ и не вездѣ, въ шаровидныя железы, будучи же одни къ другимъ въ близкомъ разстояніи часто взаимобразными соединяющіяся устьицами (*aperturæ*); распростёртые же на поверхности какой либо внутренности на пр. легкаго, печени и прочая, изображающъ преизящнаго устройенія сѣткподобныя сплетенія (*reticula elegantissima*).

§. 439. Отправленію и дѣйствію ихъ кромѣ выше упомянутыхъ силъ, весьма много пособивающъ ихъ сжимаемость и съ тонкостію ихъ плевъ соединенная крѣпость, - кою онѣ даже при шѣлоразнимательныхъ прѣугошвленіяхъ (*anatomicæ præparationes*) сполну живаго серебра, въ нихъ вливаемого, довольно сопротивляться могутъ; также и движеніе мышцъ, а наипаче при членосовокупленіяхъ (*articulationes*), которое, разнообразно ихъ сжимая и какъ бы зда-

вливая, довольно умножаетъ крѣпость оныхъ.

§. 440. О послѣднихъ конечностяхъ пасочныхъ сосудовъ въ недавнія времена разнообразно разсуждаемо было, когда съ одной стороны утверждаемо было, что онѣ всѣ спекаются въ грудномъ протокѣ, такъ какъ крововозвратныя жилы въ большихъ пологихъ жилахъ; съ другой стороны поставляемо было, что по крайней мѣрѣ праваго рама и праваго бока шеи пасочные сосуды не въ грудной протокѣ, но въ подключевую (*) того же бока жилу отверзаются; одни полагали, что пасочные сосуды по крайней мѣрѣ въ шаровидныхъ пасочныхъ железахъ съ кровеносными жилами (**) соединяются; другіе напротивъ того и при томъ не безъ нѣкотораго вида справедливости думали, что пасочные сосуды отверзаются въ тѣ дороги, кои между кишечною трубою и мочешворными орудіями находятся (игороетиса органа).

§. 441. Изъ того, что пасочные сосуды во всемъ почти находятся тѣлѣ, а наипаче изъ того, что не многіе

(*) Cf. v. cl. Sébaster et. Mascagni ll. cc.

(**) Cf. Nevfoni opus posthumum p. 37. not.

гѣе изъ нихъ изъ самой поверхности шѣла жидкія вещества, къ оной прикасающіяся, въ себя вбирають могутъ, довольно ясно открывающіяся, сколь много различно должно быть свойство пасоки, вблизи всосанной, каковое различіе даже въ мершвыхъ шѣлахъ подробнѣйшее испытаніе довольно явно подтверждаетъ, когда на пр. жидкость, содержащая въ печеночныхъ или селезеночныхъ всасывательныхъ жилахъ при испытаніи своемъ оказывается совсѣмъ опмѣнною опъ жидкости той, которая находится въ подобныхъ сосудахъ, къ машкѣ проспирающихся и такъ далѣе.

§. 442. Главнѣйшее же употребленіе и польза шаровидныхъ железъ (*glandulae conglobatae*), составляющихъ наконецъ послѣднюю часть пасочнаго состава, кажется состоить въ томъ, чтобы влаги столь различнаго свойства, а наипаче чрезъ кожу всасываемыя, медленнымъ движеніемъ и нѣжкопорымъ въ оныхъ косненіемъ (*мога*) (а можетъ быть и присовокупленіемъ къ онымъ новой жидкости изъ самыхъ бѣющихся жилокъ происходящей) больше и больше совершались и природѣ животной уподоблялись, а шѣмъ самымъ охранено было, чтобы совсѣмъ сырыя вла-

ги (*), смѣшавшись неблаговременно съ кровію, не причиняли вредоносныхъ побужденій въ сердцѣ.

§. 443. Что принадлежитъ до прочаго; то самыя сіи железы, по всему почши шѣлу разсѣяныя (**), вездѣ какъ на пр. въ подчеревокѣ и подъ мышками кучами сидящія, всѣ вообще брыжжейнымъ железамъ суть премного

Э

по-

(*) Ежели кто съ одной стороны приметъ въ разсужденіе тѣ излучистыя пуши, кои благопромыслишельная природа употребляетъ къ перемѣненію и преобращенію всосанныхъ влагъ, прежде нежели смѣшаются онѣ съ потокомъ кровавымъ; а съ другой представитъ себѣ тѣ ужасныя явленія, кои за впусценіемъ даже самой малой частицы впрочемъ вѣжнѣйшей жидкости въ кровь; тогда совершенно удостовѣренъ быть можетъ, что крововозвратныя жилы никакой споронней власти въ себя не вбираютъ, кромѣ одной крови (на пр. въ возстаніи дѣтородныхъ членовъ, дѣйствіи дѣтскаго мѣста, зардѣннѣи лица, и проч.), и что всасыванія онѣя, кои Галлеръ спарался приписать крововозвратнымъ жиламъ. *de s. h. functionibus* Vol. I. p. 281 sq принадлежатъ къ связи пасочныхъ сосудовъ.

(**) *Nuckii adenographia curiosa*. LB. 1696. 8.

подобны, пошому что онѣ также состоятъ изъ совокупленія самыхъ всасывательныхъ сосудовъ, великаго множества кровеносныхъ жилъ, и такимъ же болѣзненнымъ припадкамъ подвержены, какъ и брыжжейныя.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXV.

О кровотовореніи (de sanguificatione).

§. 444. Почти не нужно напоминать, что слово кровотоворенія здѣсь берется въ такомъ смыслѣ, чтобы чрезъ оное означить перемѣненіе питательнаго сока въ кровь и чрезъ посредство онаго возстановленіе той непрерывной ея утраты, которую она повсемѣстно претерпѣваетъ.

§. 445. Ибо раздѣленіе всѣхъ влагъ тѣла нашего на три отдѣленія (§. 4. 5), то есть, сырыхъ кровяныхъ и отдѣленныхъ, состоитъ въ томъ, чтобы среднія изъ оныхъ составляли томъ первоначальный жизненной влаги источникъ, отъ котораго многочисленныя соки непрерывно отдѣляются, и съ которыми такимъ же образомъ, то есть съ одной стороны безпрестанное приращеніе

много-

многочисленными всасывательнаго состава ручьями питательный сокъ, съ а другой пасочными сосудами почерпаемая влаги соединяются.

§. 446. Поелику же кровь есть со всѣмъ особливая и въ своемъ родѣ единственная влага, копорой подобныя не находяшся во всей природѣ (§. 6); для того само по себѣ разумѣется, что разныя потребны пособія и средства, помощію копорыхъ разнородныя оныя влаги, изъ протока груднаго приходящія и съ кровію соединяющіяся, съ оною смѣшивались бы и въ самую ее превращались.

§. 447. И впервыхъ кажется принадлежатъ сюды шѣ извилины, о коихъ неоднократно говорено было, и коими какъ млечныя, такъ и пасочныя жилы, а наипаче въ брыжжейныхъ и другихъ шаровидныхъ железахъ, со всѣхъ сторонъ стекаются и сквозь нихъ протекають, гдѣ больше и больше живоотною внутреннею напоеваются и насыщаются влагою.

§. 448. Далѣе надлежитъ принять въ разсужденіе то, что великая часть той пасоки, копорая, смѣшавшись съ кишечнымъ питательнымъ сокомъ въ грудномъ про-

шокъ, изливается въ подключевую крововозвратную жилу, изъ самихъ такъ сказать сокровенныхъ хранилищъ внутренностей и другихъ мягкихъ частей почерпаемой, прежде отдѣляется отъ самой крови, и слѣдственно вся она напоена живопнымъ свойствомъ, и безъ сомнѣнiя весьма легко съ кровянымъ потокомъ, къ которому она возвращается, паки смѣшивается.

§. 449. Къ чему также присоединить, должно вышепомянутое тихое и капельное питательнаго сока въ кровь прехожденiе, который (сокъ) сквозь послѣднюю груднаго проποка заслонку въ подключевую крововозвратную жилу по каплямъ низпадаетъ такъ, что чрезъ то малѣйшiя частицы оныя весьма шѣсно съ кровiю смѣшиваться могутъ.

§. 450. Но кажется, что и самое внутреннее сердца устройство шуды клонится, чтобы кровь, новымъ питательнымъ сокомъ обремененная, удивительными оными соскообразными мышками (*musculi papillares*), коими полости его снабжены, взбивалась, гораздо перемѣшивалась и сгущалась.

§. 451. А что и легкiя, кровь, сѣжимъ питательнымъ сокомъ обремененную,

ную, воспріемлющія, и дыханіе въ превращеніи питательнаго сока въ кровь великое имѣютъ участіе, сіе всякъ легко увидѣть можешь, кто покло приметъ въ разсужденіе какъ удивительное ихъ строеніе, изъ сосудовъ состоящее (§. 135), такъ и ихъ всегдашнее и равное движеніе.

§. 452. Наконецъ оспальное кроотовореніе совершается, обращеніемъ чрезъ все тѣло и споспѣшествующими оному силами, а наипаче движеніемъ мышцъ и прочая.

§. 453. А хощя столь многими и, столь различными средствами споспѣшествуется соединенію питательнаго сока съ кровію, и кажется, что и самой питательный сокъ, судя по его составнымъ частямъ, имѣетъ нѣкоторое сходство съ кровію: однакъ вообще поспавляется, что весьма много потребно шаковыхъ пособій прежде, нежели питательный сокъ, лишившись своего млечнаго цвѣта, получитъ видъ и свойство пурпуровой жидкости, для которой онъ опредѣленъ; къ подтвержденію котораго доказательства, кромѣ прочихъ доводовъ, употребляютъ обыкновенно и то еще доказательство, изъ науки о болѣзняхъ (Патологія) почерпаемое, по

которому неоднократно оказалось , что по прошествіи многихъ часовъ послѣ варенія пищи въ желудкѣ, изъ открытой жилы совершенный выходилъ питательный сокъ : каковое явленіе мнѣ самому случилось нѣкогда видѣть, въ которое однакожъ время ясно оказалось, что кровь оная горючимъ расположеніемъ, противнымъ претворенію питательнаго сока въ кровь, спрдадала такъ, что я почелъ за достовѣрное, что изъ оказательства онаго къ здоровому состоянію шѣла, которымъ все Человѣкословіе занимается, никакого заключенія имѣть не можно.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXVI.

О питаніи (de nutritione).

§. 454. Кромѣ того дѣйствія крови, которое выше изслѣдываемо было, то есть чтобы огненное начало по всему шѣлу разноситъ, а горючее показаннымъ образомъ извергать изъ шѣла, главнѣйшая и самая первая должность оныя состоятъ въ томъ, чтобы шѣлу питаніе, а отдѣлительнымъ сосудамъ особенную, которую они отъ нее отдѣляютъ, доставля-

спавлять жидкость , о каковой ея сугубой должности слѣдуетъ теперь говорить , и впервые о питаніи.

§. 455. Питаніе есть самое великое природы преимущество и общее и первѣйшее право всѣхъ и каждаго порознь обою цѣрства членосоставныхъ шѣлъ (*corpora organica*), коими онѣ всѣ прочія орудія и самодвижныя машины (*автомата*), художествомъ человѣческимъ устроеныя, при первомъ взглядѣ несравненно превосходятъ ; по тому что никакой художникъ не можетъ вселить въ нихъ, или дать имъ такого свойства, по которому бы онѣ могли , не говорю , умножаться, расти и самихъ себя больше и больше совершенствовать , но ниже собственною такъ сказать дѣятельностію себя сохранять, шреніемъ своихъ частей причиненную себѣ утрату вознаграждать и прочая никоимъ образомъ не могутъ.

§. 456. И сія - то самая шѣла нашего питательная способность есть та сила, коею всѣ величайшія и удивленія достойныя дѣйствія шѣла нашего совершаются , то есть помощію копорыя отъ самаго начала зачатія нашего мы умножаемся и растемъ , и посредствомъ копоры

до послѣдняго издыханія тѣло наше по разрушается и какъ бы умаляется, но паки умножается и увеличивается.

§. 457. Но о состоянїи утраты онѣя разнообразныя происходили споры, а наипаче о томъ, претерпѣваютъ ли оную и твердыя части тѣла нашего (*), или паче части сїи (какое мнѣніе (**)) было подлинно оспраго ума мужей), достигши надлежащаго совершенства, пребываютъ навсегда цѣлыми и невредимыми?

§. 458. О нѣкоторыхъ однородныхъ твердыхъ частяхъ, какъ то: окожицѣ (epidermis), ногтяхъ и прочая, почти ника-

(*) См. сл. мужа Ив. Бернуллїя разсужденїе о питанїи (Groning 1669 4.), въ которомъ всегдашнее оное, хотя впрочемъ и нечувствительное питанїе споль великимъ почишаетъ, что можно сказать, что по крайней мѣрѣ чрезъ каждыя три года все тѣло наше по разрушается, но опять возобновляется.

(**) V. cl. Kemme Beurtheilung eines Beweises vor die Immaterialität der Seele aus der Medicin. Hal. 1776. 8.

It. Ej. Zweifel n. Erinnerungen wider die Lehre der Aerzte von der Ernährung der festen Theile. ibid. 1778. 8.

какого сомнѣнія не находится, что онѣ мало по малу разрушаются и паки возсπανовляются; а что сѣ и съ самыми костями происходитъ; сѣ всякъ увидѣшь можешь, кто только приметъ въ разсужденіе оныя всѣмъ извѣстные опыты, надъ живопными, корнями Кизлярской маріоны (*radices rubiae tintorum*) питающимися, производимые, либо плоскія кости, а наипаче головнаго черепа, кои въ глубокой спарости, по причинѣ недоспащочнаго питанія, удивительнымъ образомъ утоньчаются и прочая.

§. 459. Вообще же, ежели справедливо сужу, швердья оныя шѣла нашего части, кажется, нечувствительнымъ образомъ по шрапятся, по посредствомъ питанія опять возспановляются, кои кромѣ питательнаго могущества имѣютъ еще и новопроизращательную силу (*vis reproductionis*), то есть удивительную способность, не токмо всегдашнее оное шончайшихъ и самамалѣйшихъ частей своихъ сопреніе и разрушеніе, но и большихъ внезапную ушрапу, а наипаче виѣшними непріязненными случаями, какъ-то ранами и прочая, нанесенную, пополнять и ушраченное существо совершенно почти возспановлять;

влять; каковую способность собственное очезрънїе наше (ауторїа) въ костяхъ (*) и не многихъ другихъ, выше упомянутыхъ, частяхъ ясно подтверждаетъ.

§. 460. Напротивъ того сея ново-произращательныя силы, сколько я могъ заключить изъ множайшихъ опытовъ, на сей самой конецъ мною учиненныхъ, въ человѣкѣ и другихъ горячей крови животныхъ, кажется, не дано ни одной швердой однородной части, которая (часть) кромѣ сжимательности снабжена еще и другимъ родомъ жизненной силы; то есть или раздражительностию, или чувствительностию, или собственною жизнью (**).

§. 461.

(*) V. post' alios curatissima G. L. Koeleri nostri experimenta circa regenerationem ossium. Goetting. 1786. 8.

(**) Кромѣ сего вообще не понимаю я силы доказательства, которое Г. Галлеръ къ доказательству описываемой здѣсь утраты и возобновленія мягкихъ частей человеческого тѣла употребляетъ, говоря: Elem. tom. VIII. p. II. p. 54. Ежели кости и зубы возобновляются, ежели по сему старыя части уничтожаются, и на мѣ-

§. 461. Почему кажется, что въ сихъ частяхъ, жизненными вышшаго степени силами одаренныхъ, одно и тоже всегда пребываетъ переплешеніе (parenchyma), основаніе ихъ составляющее; копорое нѣкоторой перемѣнѣ подлежитъ съ тѣмъ, чтобы при недоврежденномъ питаніи клѣшчешыа промежности оною питательносоставительною (plastica) кровяною масокою непрерывно наполнялись; а при худомъ питаніи, лишаясь пасоки оныя, спятивались, а части, изъ нихъ стоящія, изсыхали.

§. 462. Ибо вязкая или производительная пасока оная, о преимуществѣ копорыа въ другихъ мѣстахъ много говорено было, какъ сама удобно премѣняется въ клѣшчешую плеву, такъ кажется вообще составляетъ первоначальное питательное тѣла нашего вещество, безчисленными кровяными сосудами по всему тѣлу разносимое.

§. 463.

сно ихъ послѣдующіа новыа; то о прочихъ частяхъ не только швердыхъ сомнѣваться не должно.

§. 463. Кажется, что во время умноженія шѣла и собственныя его дѣйствующей силы, помощію копорыхъ пасока, изъ конечностей кровеносныхъ сосудовъ въ клѣшечную плеву процѣживающаяся, надлежаще раздѣляется по оной, и въ собственное ея переплетеніе (*parenchima*) совершенно превращается и прочая; куды, ежели не ошибаюсь, принадлежитъ частію нѣкопорый законъ сродства или припяганія, помощію котораго однородныя части сами къ себѣ одинакія и по виду съ ними сходныя начала припягивающъ; частію же по образовательное стремленіе (*vis formativa*), о которомъ ниже сего больше говорено бытъ имѣетъ, и которому основнаго сего вещества, доселѣ никакого вида не имѣваго, надлежащее присоединеніе и въ опредѣленный образъ приведеніе приписывать должно.

§. 464. Къ обѣимъ силамъ симъ, ежели справедливо сужу, надлежитъ относитьъ питаніе и шѣхъ однородныхъ частей, къ коимъ кровеносные сосуды близко не принадлежатъ, каковыя на пр. сущь: ногти (*ungues*), волосы (*pilae*) и прочая, кои однакожъ сильнѣйшимъ онымъ и постояннымъ стремленіемъ

возраждаются, распушѣ и чрезѣ всю жизнь питаются; и наконецѣ, ежели по какому либо случаю упрощаются, весьма удобно и скоро возраждаются.

§. 465. Какѣ съ одной стороны состояніе питанія вообще -кажется есть таково, каковое доселѣ изображаемо было; такѣ съ другой стороны извѣстно, что между степенемѣ и образомѣ онаго многоразличныя находящіяся перемѣны, когда кажется, что опѣ слабѣйшаго или тѣснѣйшаго присоединенія питательнаго вещества разное и самыхѣ однородныхѣ частей плотнѣйшее или нѣжнѣйшее сложеніе, а опшуда разная всего тѣлеснаго сооруженія особливая (*) происходитѣ тяжестѣ, по копорой явствуетѣ, что какѣ человекѣ опѣ человека, такѣ цѣлыя нѣкоторые народы опѣ народовѣ различествуютѣ. Въ доказательство чего довольно привесть по крайней мѣрѣ одинѣ примѣрѣ нѣкоторыхѣ сѣверныхѣ народовѣ, какѣ то: жителей Якушскія области, Бурашовѣ и прочая, кои имѣютѣ совсѣмѣ опмѣненную опѣ прочихѣ народовѣ легкостѣ.



ОТ-

(*) Robertſon on the ſpecific gravity of living men. in philoſ. Tranſact. Vol. I. P. I. p. 30 ſq.

ОТДѢЛЕНІЕ XXXVII.

Объ отдѣленіи (de secretione)

§. 466. Кромѣ питательныхъ соковъ еще и другія многоразличнаго состоянія влаги для разныхъ концовъ помощію отдѣленія извлекаются изъ состава кровянаго, о которомъ (отдѣленіи) послѣ многихъ другихъ сочинителей съ справедливымъ сожалѣніемъ говорилъ Галлеръ, что ничего темнѣе отъ онаго не находишь въ наукѣ о естествѣ человѣческомъ.

§. 467. И по справедливости отдѣлившіяся отъ крови влаги съ одной стороны кажется такое различіе, а съ другой такое сродство и таковое между собою соединеніе имѣютъ, что ихъ развѣ на самыя произвольныя отдѣленія разпорядить можно. Вообще однакожъ, ежели желательно знать какое нибудь состояніе мало или великоважнаго переменія и видопріятія (*modificatio*), какое начала оныхъ, въ кровяномъ составѣ содержимыя, въ отдѣлительныхъ орудіяхъ претерпѣваютъ, то кажется должно изчислить ихъ слѣдующимъ порядкомъ, то есть:

Первое мѣсто между ими занимаетъ молоко (lact), которое нѣкопрымъ образомъ можно почесать за питательный сокъ, прежній видъ получившій, которое кажется самымъ простымъ поступкомъ отдѣляется отъ крови, съ которою недавно смѣшался питательный сокъ.

За малокомъ послѣдуютъ водяныя жидкости (humores aquei), куда принадлежатъ глазныя влаги и слезы; также потъ (sudor), и вообще паръ (vapor), въ промежуткахъ клапчатой плевы и въ пустотахъ груди и брюха содержаемый, отъ котораго не много кажется различествуетъ жидкость околосердечной сумы (pericardii liquor), равно какъ и та влага, коею орошаются пустыри мозга и мокротныя черепныя пазухи (sinus pituitarii).

Къ водянымъ жидкостямъ обыкновенно причисляется и моча (urina), хотя впрочемъ жидкость сія особенное имѣетъ свойство.

Слинные же жидкости, служащія жеванію, пищеваренію и творенію питательнаго сока, кажутся быть больше прочихъ сложными (decompositi).

За водяными слѣдуютъ слизистыя мокроты (*humores mucosi*), полости многихъ внутреннихъ, принадлежащихъ къ естественнымъ и дѣшроднымъ дѣйствіямъ, также какъ и воздухопроходныя ноздри, кадыка и духодвижнаго канала пупи, орошающія.

Опъ сихъ кажется не много оплещается влага, внутренніе углы глаза умащающая, также и та, что подъ кожейю находится.

Жирными или пучными влагами кромѣ обыкновеннаго шукъ впервыхъ составляющія костный мозгъ (*medulla*) и жиръ (*sebum*), умащающій кожу.

Съ пучными влагами кажется сходствуемъ и та жирная мокрота, копорая возлѣ вѣнца мужескаго дѣшроднаго члена подъ крайнею плошью (*præputium*), и подъ наружными покровами срамошныхъ часшей женскихъ опдѣляется.

Таковый же есть и шопъ шукъ, копорый такъ называемыми Мейбомовыми железами опдѣляется и глазныя вѣка смазываетъ.

Свѣшлогустоватыми влагами (*gelatinoſi humores*) вообще называющіяся жидкостъ зародышевой внутренней сорочки и членосоставная масть (*liquor amnii et unguentum arti-*

articulare s. fupovia), коихъ однакожъ свойство еще не совсѣмъ изслѣдовано, равно какъ не совсѣмъ еще извѣданы и пѣ мокроты, копорыя изъ срамошныхъ женскихъ часпей во время совокупленія изливаются.

Подвержено также сомнѣнью свойство и той влаги, копорая въ первые мѣсяцы послѣ зачатія между верхнею и внутреннею сорочкою зародыша, также въ пузырькъ зародышевой пуповины и между трехъ кровеносныхъ ея сосудовъ обрѣщается.

Находящаяся же въ Граафѣевыхъ женскаго яишника пузырькахъ (*vesiculae Graafianae*), и въ сердцеобразнопредстоятельносѣменной железн (*glandula proflata*) есть совершенно сукровичная (*serosus*).

Что же до мужескаго сѣмени; то оно есть жидкость своего рода, съ кою никакая другая сравниться не можетъ.

Что самое можно сказать и о желчи.

§. 468. Отсюда удобно разумѣется, что отдѣленные влаги, столькое различіе между собою имѣющія, не одинакимъ образомъ и не одного рода орудіями оп-

дѣляются отъ кровянаго состава, и великое различіе ихъ открывається даже изъ одного того, что инныя влаги самокращайшимъ пушемъ, другія напротивъ того должайшими и премногоискривленными дорогами отъ крови отдѣляются и далѣе прѣугошовляются.

§. 469. Самымъ же простымъ изъ оныхъ способовъ отдѣленія должно почесть потъ, по которому отдѣляемая жидкость чрезъ раздѣіе, какъ говорятъ (*diapedesis*), скважинокъ боевожилныхъ плевъ проступаетъ; чему нѣчто подобное поставляется и объ отдѣленіи жира, костнаго мозга (*medulla*) и прочая; отъ котораго можетъ быть не много различествуетъ и потъ образъ, по которому въ перепончныя внутренности изпочаюся соки; куды относятся желудочный разтворъ (*succus gastricus*), кишечный сокъ (*liquor entericus*) и такъ далѣе.

§. 470. Гораздо же сложнѣе кажется бытъ художество того отдѣленія, которое помощію железь совершается; куды вообще числятъ пузырьки и пещерки, каковыя на пр. удобно видѣтъ должно въ зевахъ, и которыя обыкновенно на-

зываются самопростѣйшими железами (*glandula simplicissima*).

Собственное же имя отдѣлишельныхъ железъ заслуживаютъ тѣ, кои для различенія отъ шаровидныхъ пасочныхъ многосложными (*gonglomeratae*) называются; куды относятся слинныя железы (*glandulae salivales*), языкообразная поджелудочная железа (*pancreas*), слезопочивыя железы и груди (*mammae*); кои, будучи снабжены извергательными протоками (*ductus excretorii*), состоятъ изъ большихъ, а сіи изъ меньшихъ долей, о коихъ внутреннемъ устроеніи нѣкогда производили въ училищахъ брачебныхъ великіе споры. Малпигій (*) просоподобныя железы (*glandulae miliares*), изъ коихъ многія легкимъ поспупкомъ оказываются, почиталъ за зерна (*asina*), внутри пещеру или пустоту имѣющія. Руишъ напротивъ того утверждалъ, что вымышленныя оныя, впадины внутри имѣющія, зерна, суть не что иное, какъ шарики, изъ крове-

Ю 2

но-

(*) *Libellis passim citatis tum diff. de glandulis conglobatis. Lond. 1689. 4.*

Sed maxime cf. EJ. opera posthuma ib. 1697. fol. et alias edita.

носныхъ сосудовъ сплешенные, каковое мнѣніе Руишіево что съ природою больше перваго сходствуесть, доказываютъ то шѣлоразнимапельныя пріугошвленія, а наипаче. пончайшее наливаніе и увеличительныя спекла.

§. 471. Не много кажется отъ сего устроенія, изключая собственное переплешеніе, различествуесть или паче поясняетъ нѣкоторыхъ отдѣлительныхъ внутренностей, а особливо печени и почекъ, устроеніе, изъ коихъ наипаче послѣднія довольно ясно показываютъ таковыя Руишіевы шарики или зерна Малпигіевы. Ибо въ коркѣ сихъ внутренностей съ боковъ волосныхъ бѣющихся жилокъ происходятъ вѣпочки, въ сосудисныхъ шарикахъ соединяющіеся, кои наподобіе зеренъ на оныхъ вѣпочкахъ власно какъ бы на нѣкихъ стебелькахъ висящими представляются; изъ сихъ боевожилыхъ шариковъ сперва производятъ самопончайшіе безувѣшныя и прозрачныя отдѣлительныя сосуды, (о произхожденіи коихъ изъ послѣднихъ концевъ бѣющихся жилъ мимоходомъ нѣгдѣ упомянуто (§. 79. 81); по томъ раждающія и кореники крововозвратныхъ жилокъ, въ кошторы превращающіяся самыя боевыя жил-

жилки, и копорыя оспальную кровь, неспособную къ отдѣленію какой либо жидкости, относяшъ (*) въ пни крово-возвращныхъ жилъ.

§. 472. Наконецъ, другія нѣкоторыя отдѣлительныя орудія опять другое и совсѣмъ опмѣнное имѣющъ устройство, каковыя на пр. суть: ядра (testes), кои совсѣмъ состояшъ изъ плѣсныхъ сплещеній предлинныхъ и многочисленныхъ сосудовъ.

§. 473. Теперь приступаю къ изслѣдованію причинъ, дѣйствіемъ коихъ совершается то, что извѣстныя вла-ти отдѣляются въ определенныхъ имъ орудіяхъ, кокое однакожъ изслѣдованіе всего ученіа объ отдѣленіи есть гораздо труднѣе, будучи подвержено премногимъ сомнѣніямъ.

§. 474. Одно то несомнѣннымъ кажется, что главнѣйшую и большую премногихъ отдѣленій причину должно искать во внутреннемъ устройствѣ отдѣлительныхъ орудій; куды въ железахъ, въ кучу собранныхъ, и отдѣлительныхъ внутренностей первоначально

Ю 3

при-

(*) См. Г. Шумлянского о строеніи почекъ. Argent. 1782. 4. tab. II.

принадлежитъ какъ особенное самыхъ конечностей кровеносныхъ сосудовъ, изъ коихъ отдѣляются влаги, направленіе и раздѣленіе, такъ и переплетеніе, каждой отдѣлительной внутренности столько свойственное, что его во многихъ внутренностяхъ при первомъ взглядѣ узнать и отъ прочихъ мясныхъ частей отличить можно (§. 27).

§. 475. Невѣроятнымъ кажется бытъ и то, на что неоднократно на многихъ мѣстахъ довольно убѣдительныя предложены были доказательства, что отдѣлительныя внутренности имѣютъ какъ особое устройство, такъ и особливую, имѣ собственную, жизнь, то есть видъ особенной жизненной силы, которую отъ общихъ жизненныхъ силъ, то есть: сжимательности, раздражительности и чувствительности отличать должно.

§. 476. Далѣе, ежели не ошибаюсь, великое кажется имѣетъ участіе въ соблюденіи отдѣленій и всасывательный составъ или всѣ вообще всасывательныя сосуды, кои изъ всѣхъ и каждыхъ порознь отдѣлительныхъ внутренностей ту жидкость въ себя вбираютъ и крови сообщаютъ, которая особливымъ свойствомъ
влаги,

влаги, въ нихъ отдѣляемой, какъ бы заражается и напоевается, на примѣръ: желчную изъ печени, сѣменную изъ ядръ и прочая.

Такимъ образомъ непрерывное въ отдѣлительномъ сославъ кругообращеніе кажется сохраняется такъ, что кровяному пошoku начала отдѣляемыхъ влагъ самыми отдѣлительными орудіями непрерывно доставляются, кои опять по смѣшеніи своемъ съ онимъ пошокомъ крови, возвратившись къ тѣмъ же самымъ орудіямъ, по нѣкоторому закону сходства или сродства, паки оними прихитивающа и части, съ ними единообразныя, съ собою изъ крови увлекающъ.

§. 477. Отдѣленію нѣкоторыхъ влагъ поспѣшествуеиъ и самое нѣкое особенное свойство крови, изъ коихъ онѣ непосредственно отдѣляются, чему нѣчто подобное видѣли мы при излѣдованіи желчи, изъ крови воротной жилы отдѣляемой, коюрой жилы кровь въ самыхъ своихъ источникахъ, откуда она свое воспріемлеиъ произнесеніе, весьма многимъ количествомъ горячаго вещества напоявается и обременяется.

§. 478. О другихъ пособіяхъ, поспѣшествующихъ особливимъ нѣкоторымъ
опт.

опдѣленіямъ на пр. о скопленіи и приведеніи (*congestio et derivatio*), кои въ опдѣленіи молока въ грудяхъ столь явствен-но усматриваются, и другихъ подобныхъ имъ средствахъ, уже ничего не упоминаю.

§. 479. Между самыми же влагами, выше показанными орудіями и силами опдѣленными, такое еще находишся различіе, что нѣкоторыя изъ нихъ пошчасъ изъ самыхъ опдѣлительныхъ орудій въ то самое мѣсто, для котораго онѣ опредѣлены, и въ которомъ совершающъ свои дѣйствія, изливаются; нѣкоторыя изъ нихъ сперва переходящъ въ особливья нѣкія хранилища (*resertacula*), гдѣ онѣ на нѣкоторое время сберегаются и больше и больше пріуготовляются, прежде нежели извержены бывающъ; куды принадлежишъ молоко, въ протокахъ своихъ содержащее, также моча, желчь, и мужское сѣмя, въ своихъ пузырькахъ содержащія, и нѣкоторымъ образомъ водянистость или сукровица, въ Граафіевыхъ яичниковъ пузырькахъ (*Graafianis ovariorum vesiculis*) находящаяся.



ОТДѢЛЕНІЕ XXXVIII.

О уринѣ. (*de urina*).

§. 480. Отъ крови кромѣ питательныхъ соковъ и внутреннихъ влагъ (§. 4) отдѣляются еще и другія непошребныя и излишнія жидкости (вообще испражненіями вшораго варенія называемыя (*excrementa secundæ coctionis*), кои суть двоякаго рода; то есть однѣ такія, кои испареніемъ изъ шѣла изшребляются, а другія такія, кои сквозь почки процѣживаются, и называющіяся мочео или уриноо (*urina, lotium.*)

§. 481. Почки же (*renes*) (*) суть не что иное, какъ двѣ внутренности, съ обѣихъ сторонъ шѣла надъ поясницею позади брюшины находящіяся; нѣсколько сдавленные, видомъ и числомъ чаще всякой другой внутренности человеческого шѣла перемѣняющіяся; (**) кои на сосу-

Я
дахъ

(*) V. cl. Schumlansky l. c.

(**) V. Ger. Blasii renum monstrorum exempla ad calcem Bellini de structura et usu renum edit. Amstel. 1665. 12.

дахъ, такъ называемыхъ почечныхъ (*) (*vasa emulgentia*), въ сравненіи съ внутренностями своими, въ кои онѣ вселяющіяся, довольно пространными, повѣшены и салу подобнымъ шукомъ (§. 83) обведены.

§. 482. Онѣ окружены собственно изрядно соспавленною сосудистою плевою, и каждая изъ нихъ, а особливо въ младенческомъ шѣлѣ, кажется состояишъ почти изъ осьми или и большаго числа почечекъ, про которыя утверждалъ Феррейнъ, что каждая изъ нихъ - состояишъ изъ семидесяти или осмидесяти мясныхъ лучей, кои называлъ онѣ бѣловатыми пирамидами (*albidae pyramides*).

§. 483. Почка, будучи разрѣзана съ выпуклаго ея хребта до вогнутого шаза, представляетъ двоякое существо: одно, окружность почки составляющее, которое называютъ коркою (*cortex*), а другое внутреннее, мозговымъ называемое (*medulla*).

Оба

(*) Eustachii tabulae I. V. quae quidem ad classificam E.J. de renibus tractationem pertinent. с. rel. summi viri opusc. anatomicis Vener. 1564. 4. editam. it. tab. XII.

Оба же существа оныя изобилуютъ крововозвратными и бѣущими-ся жилами; сверхъ сего корковое существо снабжено самопнчайшими прозрачными, (*) мочеопдѣлительными, а мозговое мочевыводительными сосудами (*vasa fecernentia et efferentia*),

Опдѣлительные оныя проточки выше-писаннымъ образомъ (б. 471) производятъ отъ бѣущихся жилъ, въ узлы или шары свернутыхъ, кои, заключааясь въ почечной коркѣ, составляютъ самую большую часть оныя, и особливимъ своимъ излучистымъ направлениемъ отъ выводительныхъ или Беллиновыхъ мочепочныхъ трубочекъ (*tubuli Belliniani*) удобно опдѣляются, хотя впрочемъ и переходятъ въ оныя, кои, простираясь прямо отъ коркового существа къ мозговому, вселяются въ оное, составляя самую

Я 2

больш-

(*) Сии опдѣлительные протоки обманули Феррена такъ, что онъ почелъ ихъ со-всѣмъ за новый родъ сосудовъ, которые называлъ онъ чувствителносочными или бѣлыми трубочками, про которые говорилъ, что изъ оныхъ состоитъ каждая почка, и что онъ суть столь тонки, что длина тѣхъ, кои въ каждой почкѣ находятся, равняется 10000 *orgyiarum*, seu 5 *leucarum stadium*.

мую большую часть онаго; кои по нѣ-
околькокрапномъ соединеніи въ меньшіе
совокупляющіяся пни, и (*) наконецъ по-
добно рѣшету прободающъ устьицами сво-
ими сосочки (papillæ), въ пазу почечномъ
содержимыя.

§. 484. Число сосочковъ оныхъ по
большей части бываетъ соразмѣрно чи-
слу долей, изъ коихъ состоишь каждая
почка, кои (сосочки) отдѣленную въ кор-
ковыхъ прозрачныхъ сосудахъ и Беллино-
выми прубочками далѣе проведенную мо-
чу изливаютъ въ свои вороночки (infun-
dibula), въ общемъ пазѣ почки (pelvis)
содержимыя.

§. 485. Тазъ оный продолжается въ
мочепочники (ureteres), то есть перепоноч-
ные каналы, чрезвычайно чувствитель-
ные, слизью внутри обведенные и весь-
ма удобно разширяемые, кои въ человѣ-
кѣ не вездѣ одинакое имѣющъ проши-
ранство (**), и кои наконецъ сзади въ
низшую часть мочевого пузыря такъ
вселяющъ, что не вдругъ бока онаго
прободающъ, но сперва между мышковою
и чувственною онаго плевами (кои въ
томъ

(*) Eustachii tab. XI. fig. 10.

(**) V. Nuck adenographia fig. 32. 34. 35.

помѣ мѣстѣ имѣющѣ большую толсто-
ту) не много глубже низпускающа, и
по помѣ въ самую полость онаго косыми
отверзающа устьями; каковымъ устро-
еніемъ предохранено, что моча, чрезъ
мочепочники въ пузырь низтекающая,
всплывъ въ оныя возвратиться не можетъ.

§. 486. Мочевой пузырь (*vesica*) (*) въ
человѣкѣ возрастныхъ лѣтъ по большей
части около двухъ фунтовъ воды въ
себѣ вмѣщаетъ; дно его въ зародышѣ
вселяется въ мочевой шупой каналъ
(*urachus*), задняя же его сторона покрыва-
ется брюшиною; чтожъ до прочихъ его
перепонокъ; то онѣ подобны желудочнымъ.

Мышковая (*musculosa*) состоитъ изъ
полосокъ, мочевой пузырь окружаю-
щихъ (**), кои различнымъ направ-
леніемъ мясныхъ жилокъ, въ разныхъ
людяхъ разнo простирающихся, пересѣ-
кающа; которую обыкновенно называющъ
мочеспускательною мышцею (*detrusor
urinae*); круговыя же волокна, несовершен-
но окружающія шейку мочевого пузыря,
кои какъ происхожденіе, такъ и видъ не-
постоянный имѣющъ, называюща сжи-
мательною мышцею (*sphincter*).

Я 3

Чте

(*) D'atney Oeuvr. anatom. Vol. II. tab. I-IV.

(**) Santorini tab. posth. XV.

Что до чувствительножильной оболочки (pervea tunica), то она и сей внутренности первоначальную доставляетъ крѣпость.

За коею наконецъ послѣдуетъ внутренняя плева, отъ кожицы происходящая, и вездѣ, а наипаче у шейки, смазываемая превеликимъ количествомъ слизи.

§. 487. Многія кажется явленія подтверждающъ, что кромѣ обыкновенныхъ вышепомянутыхъ мочевыхъ путей находятся еще и другія сокровенныя дороги, непосредственно изъ кишекъ къ мочетворнымъ орудіямъ простирающіяся; ибо скорое пищевъ чрезъ мочевый пузырь изхожденіе, и моча какъ запахомъ, такъ и цвѣтомъ особенное нѣкоторое снѣдей и пищевъ свойство показывающая, едва позволяющъ вѣрить, чтобы онѣ столь долгой чрезъ протокъ питательнаго сока и кровеносные сосуды путь свой совершали; кромѣ сего читаемъ въ бытописаніяхъ, что масло, съ промывательнымъ впущенное въ испражнятельную кишку, плавало поверхъ выпущенной мочи. Кромѣ сего суть довольно извѣстны многія, и при томъ большія взаимнообразныя со-
единенія

диненія, между пасочными сосудами кишекъ и почекъ находящіяся. Наконецъ самыми живоразсѣченіями доказано, что у собаки, которой перевязаны были мочепочники и опростанъ мочевый пузырь, чрезъ три часа опять моча накопилась въ пузырь, хотя ей обыкновенный путь чрезъ мочепочники и заключенъ былъ; ибо мочепочники выше перевязокъ пренного распянушы были (*).

§. 488. Впрочемъ, какими бы путями ни собиралась моча въ своемъ пузырь; однакъ отъ накопленія своего мало по малу досадною учиняется и понуждаетъ (§. 330) человека къ испражненію своему, для котораго испражненія исходящемъ (emissarium) опредѣленъ стволъ (uctra), который, судя по различію половъ, различенъ бываетъ; почему дальнѣйшее его изслѣдываніе оставляея до описанія обоепольныхъ дѣйствій.

§. 489. Опрасываея же мочевый пузырь попреодолѣніи сжатія стѣсняющей его шею мышцы (sphincter), какъ помощію собственной, вышепомянутой (§. 486) извергательной мышцы (detrusor urinæ), такъ

Я 4

и

(*) Philos. Transact. No. 67.

и пособіемъ брюшнаго давленія и дыханія; къ чему наконецъ присоединяется въ муштинахъ дѣйствіе и мочеускоряшельныхъ мышцъ (acceleratores), кои и послѣднія капли мочи, въ луковицѣ (bulbus) мочеиспускашельнаго ствола остающіяся, вынуждаютъ.

§. 490. Чпожъ до свойства самая мочи, шо она многообразна (*) бываешъ какъ въ разсужденіи лѣшъ, такъ и погоды, а особливо въ разсужденіи крашчайшаго или должайшаго времени, въ которое она послѣ ѣды и пишя испускаешся; также въ разсужденіи качествъ употребляемыхъ ѣствъ и прочая. Однакожъ вообще, ежели разсмотрѣшь мочу взрослого человѣка, послѣ спокойнаго сна вдругъ испущенную; шо она оказываешся водяною жидкостію запаху промзглаго (nidorosi odoris), цвѣту желшаго, въ водяности коея такъ какъ общемъ разтворѣ (vehiculum) различныя, въ однихъ сѣи, и въ другихъ другія въ большемъ или меньшемъ количествѣ.

об-

(*) V. cl. Halle sur les phénomènes et les variations, que presente l'Urine, considérée dans l'état de santé, in Mém. de la Soc. de Médéc. Vol. III. p. 462 sq.

обрѣшающагося начала, а наипаче земляныя и соляныя. Въ первыхъ по большей части находится извѣстковая земля, которая также обрѣшается и въ камняхъ, на мочеиспускательныхъ путяхъ иногда зараждающихся, въ различномъ однакожъ количествѣ (*). Чѣмъ до солей, по достойнѣйшая изъ нихъ замѣчанія есть та, которую существенною и природною (**) мочевою, также солью малаго мѣра (*microscopicum sal*), или пловучею (*sal fusibile*), перловою (*sal perlatum*) и прочая называютъ, и которая больше прочихъ шѣлесныхъ частей содержишь въ себѣ славной оной фосфорической (свѣтоносной), лепучею щелочною солью пресыщенной, кислоты (***) (*acidum phosphoreum*).

Я 5

ОТ-

(*) Cf. cl. Pickel. *experimenta ap. Jo. Jac. Hartenkeil de vesicae urinariae calculo*. Wirzb. 1785. 4. pag. 27.

(**) Cf. post alios Jo. Alb. Schloffer de *sale urinae humanae nativo*. LB. 1758. 4.

Jos. Wenc. Tichy de *arenulis in lotio apparentibus ut infallibili, salutari morborum euentus, signo prognostico*. Prag. 1774. 8. p. 59 sq.

(*) Vid. cl. Bertholet in *Mem. de l'Ac. des Sc. de Par. a. 1780. p. 10 sq.*

CL

ОТДѢЛЕНІЕ XXXIX.

О разлитіи половъ вообще (*de sexuum diffinitione*).

§. 491. Дѣйствія пола человѣческаго, о коихъ до селѣ говорено было, хотя суть обоему полу общія; однакожъ, судя по образу, по которому нѣкоторыя изъ нихъ совершаются, не малое между ими въ различномъ полѣ находится различіе (*), коего главнѣйшіе виды, прежде нежели приступимъ къ изложенію каждому полу свойственныхъ дѣйствій, кратко изобразить за нужное починая.

§. 492. И вообще каждый полъ имѣетъ особый, отъ другаго пола отличный, видъ (*habitus*): который въ рожденномъ на свѣтѣ человѣкѣ ясно усматривается; въ нѣжнѣйшихъ же зародышахъ едва съ перваго взгляду разпознавается; у которыхъ самыя даже дѣтородныя внѣшнія части едва раз-

Cl. Th. Lauth (praes. Spielmann) de analysi urinae et acido phosphoreo. Arg. 1781. 4.
(*) F Thierry E. praeter genitalia sexus inter se discrepant. Paris. 1750. 4.

различествуютъ между собою, по крайнѣй мѣрѣ, ежели смотрѣть на нихъ безъ всякаго вниманія; ибо у находящагося въ утробѣ младенца женскаго пола язычекъ (clitoris) въ соразмѣрности къ его тѣлу бываетъ очень великъ (*) и видимъ снаружи; у зародыша же мужскаго пола шуляпная мошна (scrotum) едва примѣтна (**) ^бываетъ.

§. 493. Однако и въ самомъ даже младенческомъ возрастѣ оное всего тѣлеснаго вида въ разсужденіи разнаго пола различіе не совсѣмъ ощутительно бываетъ, но мало по малу учиняется примѣтнымъ въ юношескія лѣта; въ ка-

(*) Langguth embryo $3\frac{1}{2}$ menfium qua faciem, externam. Viteb. 1751. 4.

Jac. Parsons in philos. Transact. Vol. XLVII.
P. 143.

(**) Что я недавно видѣлъ въ 16 недѣльныхъ выкинутыхъ двойняхъ разнаго пола, кои хотя довольно красивы и въ разсужденіи своего нѣжнаго возраста все-совершенно изображенны были; однакъ различіе дѣтородныхъ частей едва по испытномъ изслѣдованіи оказалось. Чтожъ до прочихъ частей, до всего то есть ихъ начертанія, лицезображенія и мѣры поясницъ, и прочая; то онѣ во всемъ между собою сходны были.

какое время стройность, нѣжность и меньшей ростъ всего тѣла женскаго, будучи сравнены съ мужескимъ тѣломъ плотнымъ и крѣпкимъ; весьма ясно показываютъ (*) различіе, между мужескимъ и женскимъ поломъ находящееся.

§. 494. Подобное различіе оному, между внѣшнимъ тѣлеснымъ видомъ въ обоимъ полѣ находящемуся, замѣчается и въ самыхъ костяхъ; ибо извѣстно, что кости у женщинъ суть гораздо глаже и круглѣе, нежели у мужчинъ, особливо же круглыя или цилиндрическія кости у женщинъ суть меньше, нежели у мужчинъ, а широкія или плоскія тоньше; не упоминая уже о различіи каждой кости, а наипаче грудныхъ и шавовыхъ; также дужекъ или грудныхъ распорокъ (*claviculae*), бедръ (*femora*) (**) и проч.

§. 495.

(*) Cf. celebres virilis femineique corporis binas figuras, procul dubio ab ipso Titiano, pictore summo profectas, in Vesalii epitome suor. libror. de c. h. anatome. Basil. 1542. fol.

(**) Curatius eas per singulas sceleti partes enarravi opere osteologico pag. 81 sq.

§. 495. Чѣмъ касается до мягкихъ частей шѣла, то въ женщинахъ клѣшечная плева находящаяся слабѣе и нѣжнѣе, дабы во время бѣременности удобнѣе растягиваться могла, а кожа мягче и, по причинѣ находящагося подъ нею жира, бѣлѣе.

Волосы на головѣ у женщинъ по большей части бывають длиннѣе, нежели у мужчинъ; напрошивъ того другія части, кои у мужчинъ находятся покрытыя волосами, у женщинъ бывають либо совсѣмъ гладки, какъ то подбородокъ и грудь; либо покрайней мѣрѣ покрыты самыми нѣжными волосками, какъ на пр. плеча и бедра (сига).

§. 496. Разсуждая о различіи особенныхъ дѣйствій, каждому полу свойственныхъ, должно упомянуть и о бѣеніи жилъ (pulsus), которое у женщинъ взглядомъ обстоятельство есть чаще (§. 109), грудь же, а особливо верхнюю частью, подвижнѣе; также рогоязычная кость (os hyoideum) у женщинъ есть менѣе, нежели у мужчинъ; дыхательное горло шѣснѣе, а по сему и голосъ не столько грубый, какъ у мужчинъ.

§. 497. Чѣмъ касается до душевныхъ дѣйствій, то вообще женщины имѣють
предъ

предѣ мущинами гораздо большую пропагандельность (mobilitas) и нѣжность чувствительныхъ жилъ: онѣ также раздражительнѣе и удобопреклоннѣе къ душевнымъ страстямъ.

§. 498. Наконецъ взглядомъ естественныхъ дѣйствій въ женскомъ полѣ влзлканіе или побужденіе къ ѣдѣ замѣчается меньшее; а умноженіе шѣла, скорѣйшее; почему онѣ ранѣе мужчинъ достигаютъ возмужалости и юношества.

§. 499. Самое же большее и главнѣйшее различіе половъ состоитъ въ дѣшгородныхъ дѣйствіяхъ, по силѣ которыхъ муштина одаренъ способностью оплодороджать, а женщина зачинаетъ въ утробѣ; кои дѣйствія слѣдуетъ теперь далѣе описывать.



ОТДѢЛЕНІЕ LX.

О родотворныхъ дѣйствіяхъ мужскаго пола (*de functione genitali sexus virilis*).

§. 500. Родотворная или дѣшгородная мужская жидкость пріуготовляется двумя ядрами (testes), на сѣменныхъ своихъ канашникахъ (funiculi spermatici) въ мошонкѣ висѣщихъ, которыя кромѣ многихъ

гихъ пасочныхъ жилъ, состоятъ болъшею частію изъ сосудовъ проякаго рода.

То есть 1) изъ сѣменной бѣющей жилы (*arteria spermatica*), которая, въ соразмѣрности ея весьма малаго пространства, всѣхъ бѣющихся жилъ длиннѣйшею починается, и по большей части близко къ ядрамъ получаетъ кровь отъ начальственной боевой жилы (*aorta*), и оную имъ доставляетъ; 2) изъ относящаго (*vas deferens*) сосуда, который отдѣленное въ ядрахъ изъ крови сѣмя относитъ къ сѣменнымъ пузырькамъ (*vesiculae seminales*); наконецъ 3) изъ такъ называемаго винограднолистоподобнаго сплешенія крововозвратныхъ жилъ (*plexus venarum racemiformis*), которое, принимая въ себя остальную кровь, переноситъ въ полую или почечную возвращательную жилу (*cava vel renalis vena tradit*).

§. 501. Однакожъ ядра не съ самаго начала обрѣтаются вцѣлыми въ мошонкѣ; но въ мужескомъ несовершенномъ зародышѣ совсѣмъ въ другомъ положеніи находящаяся, коего состояніе и постепенныя перемѣны сперва Г. Галлеромъ въ 1749 году въ Геттингенѣ

изслѣдованны были (*), а по томъ разнообразно изъясняемы и взглядомъ разныхъ содержаній разно доказываемы были; коихъ краткое начертаніе, съ самою природою сходствующее, можно показать такое, какое имѣю я въ достойномъ замѣчанія собраніи мужескихъ зародышей, на самый сей конецъ мною разниманныхъ.

§. 502. Такимъ образомъ при вскрытіи подчеревка недовольно зрѣлаго зародыша представляется зрѣнію въ обоихъ пахахъ (*inguen*) подлѣ такъ называемаго кольца косвенныхъ, чревныхъ мышцъ, весьма узкое устьице въ брюшинѣ (таб. III. фиг. 1. е. и фиг. 2 -), низводящее къ нѣкоторому проходу, видѣ какъ бы узкаго влагалища имѣющему (*angustus*), которое сквозь самое оное кольцо проходитъ и перемѣняется въ особый пузырисной мѣшечекъ (фиг. 1.), въ брюшной впадины простирающійся въ мошонку, который состоитъ изъ клѣшчатыхъ волоконъ и заключающъ въ себѣ ядро.

§. 503.

(* (Halleri progr. de herniis congenitis recens. in EJ. opusc. patholog. p. 311 sq. Vol III. operum minor.

§. 503. Далѣе отъ самаго задняго края онаго чревнаго устья происходитъ другое продолженіе брюшины, вверхъ проспирающееся, которое въ зародышѣ (фиг. 2) большею частію представляетъ не что иное, какъ продолговатую складку (plica), изъ основанія которой воздымается не большой цилиндръ или лучше сказать обращенной конусъ, который потомъ верхнею своею частію, коею онъ обращенъ къ нижнему краю почки, оканчивается пузыремъ, въ коемъ содержится самое ядро съ своимъ прибавочкомъ (epididymis) (фиг. 1. а и фиг. 2 -.) такъ, что оно даже при первомъ взглядѣ представляетъ какъ бы нѣкоторую ягоду, утѣвержденную на своемъ стебелькѣ, и почти подобно печени или селезенкѣ кажется свободно висѣть во впадинѣ брюшной (§. 404).

§. 504. Въ семъ возрастѣ позади нѣжнѣйшей и почти прозрачной брюшины проходящіе сосуды, изъ коихъ послѣ составляется сѣменный канатикъ (funiculus spermaticus) видны такъ, что бѣющая и крововозвратная сѣменная жилы (фиг. 1. b. f), низпускаясь по сторонамъ хребетной кости, а относящій сѣмя сосудъ внутри къ шей мочевого

пузыря (- с. g. -) простирающійся, въ слабой клетчатой плевѣ, позади брюшины находящейся, вмѣстѣ продолжаются, и въ выше упомянутой складкѣ или згибѣ брюшномъ въ самое ядро вселяются.

§. 505. Потомъ почти около половины беременности, ядра мало по малу опускаются внизъ такъ, что часъ отъ часу ближе спайваются къ вышеноянутому устью брюшины, въ которое время и складка оная брюшины соединяется съ своимъ цилиндромъ до шѣхъ поръ, пока наконецъ ядро не возляжетъ на самомъ устьи ложеобразнаго онаго брюшины прохода (angiportus).

§. 506. А когда уже ядро въ зрѣлѣйшемъ зародышѣ гошовой бываетъ опуститься на низъ; въ то время устье, бывшее до сего времени шѣснымъ, разширяется столько, что оно можетъ перейти какъ сквозь самое оное устье, такъ и окружающее его чревное кольцо, и сквозь весь оный узкій проходъ, и такимъ образомъ низпуститься въ пузырьчатой, выше сего упомянутый, мышечикъ; послѣ чего устье оное брюшины вдругъ крѣпко замыкается, и потомъ въ короткое время со всѣмъ срастается такъ, что едва слѣды онаго при-

примѣнны бывающѣ въ возрастѣ опровер-
ческомъ.

§. 507. Чѣмъ медленнѣе бываетъ
низхожденіе ядра еще во впадинѣ чрева
къ оному опверзшю, тѣмъ кажется
скорѣе и какъ бы въ одно мгновеніе ока-
совершается переселеніе онаго чрезъ объ-
емлящую его пещлю; ибо извѣстно,
что по вскрытіи зрѣлыхъ зародышевъ
ядро усматривается либо лежащимъ въ
самомъ еще устьѣ брюшины; либо
по прошествіи сквозь кольцо оныя уже
содержимымъ въ паху: мнѣ же однажды
шюкмо къ щастію моему случилось уви-
дѣть, что во впадинѣ брюшной одного
близнеца, коего для сей самой причины и
предлагаю изображеніе (*), правое ядро
въ то самое мгновеніе, въ кѣторое оно

Θ 2

на-

(*) Cf. cum hac icone aliae hactenus editae
viz.

Cl. Jo. Hunteri in fratris Guil. medical com-
mentaries.

Cl. Camperi in Verhandlungen von der
Matschappye v. Haarlem VII D. 1 St.

Cl. Girardi in appendice ad tab. posth. San-
torini.

Et cl. Vicq. D'Azyr in Mem. de l'Ac. des
Sc. de Par. 1780.

находось среди онаго узкаго прохода, коимъ оно весьма крѣпко обѣято было, (ф. 1. а -) казалось бытъ гошовымъ низойти въ мѣшечекъ; что самое уже и совершилось съ лѣвымъ ядромъ, которое въ то время уже вышло изъ онаго, и его устье въ брюшину накрѣпко замкнуто было.

§. 508. Впрочемъ хотя таковаго достойнаго замѣчанія переходенія ядръ изъ брюха чрезъ пахи никакъ опредѣлить не можно; однакоже кажется, что оно по большей части на осьмомъ мѣсяцѣ беременности совершается: хотя и нерѣдко случается, что оно въ новорожденныхъ младенцахъ находится либо въ самой еще впадинѣ брюха, либо въ верху пахъ; ибо по извѣстїи изъ брюха ядру должно проходить еще новое поприще своего пути, дабы изъ паха купно съ своимъ мѣшечкомъ, въ которомъ оно заключено, низойти въ мошонку.

§. 509. А что ядра имѣютъ точно постепенное до сихъ мѣстъ описываемое изъ впадины брюшной въ мошонку прежденіе; сіе открывається изъ неоднократно учиненныхъ наблюденій. Но каковыя были бы причины и силы, коими удивительный ихъ совершается путь; сіе

се опредѣлишь весьма трудно. И я сегодня на день паче и паче удостаиваюсь въ томъ, что ни одна изъ тѣхъ силъ, коимъ обыкновенно до сихъ временъ приписывали оное ядръ низхождение, каковыя на пр. суть: дѣйствія мышцъ, поднимающихъ ядра (*cremasteres*), или движеніе грудобрюшной преграды, либо сжимаемость клѣпчатой плевы, сухожильными волокнами переплетенной, копорая находится въ оныхъ продолженіяхъ брюшины, и копорую обыкновенно называютъ Гунперовымъ жолобомъ (*gubernaculum Hunteri*), ни одна, говорю, недовольна къ изложенію столь опмѣннаго движенія ядръ, особливо ежели принять въ разсужденіе самое прохожденіе ядра сквозь неоднократно упомянутое брюшное паховое кольцо: все же напрошивъ того произшествіе се представляетъ, естли не иное что, то весьма ясный примѣръ собственнй жизни (*vita propria*), безъ коея особливаго нѣкопорого вспомошествованія столь досщопамяшнаго и единственнаго въ своемъ родѣ пуши, коему во всемъ тѣлоустройствѣ не находится подобнаго дѣйствія, едва мысленно постигнуть можно.

§. 510. Покровы, коими ядра по низшествіи своемъ въ мошонку облекающіяся, прилично могутъ раздѣлены быть на общія обоимъ ядрамъ и собственныя каждому въ особливости. Общимъ покровомъ ядрамъ служитъ мошонка (*scrotum*), составленная изъ тонкой кожи, подъ которою находится небольшое количество жиру, и которая предъ прочими общими покровами плѣсными ту имѣетъ опмѣнность, что видъ свой удивительно перемѣняетъ. Ибо иногда виситъ она слабою и какъ бы вялою, а иногда (особливо во всея любовожденія или стужи) спягивается и твердѣетъ, и въ то время представляется морщиноватою и борозднатою (*rugosum et fulcatum*).

§. 511. Между собственными каждому ядру покровами, первую составляетъ красная плева (*dartos*), непосредственно подъ кожей мошонки находящаяся, особливо и при томъ великою снабжена сжимательностію, коею славные мужи Винсловъ, Галлеръ и прочіе будучи обмануты, неправильно приписали ей свойство и силу, собственные мышцамъ.

§. 512. Подъ сею находятся (по многой и мягкой клѣпчатой плевъ)
про-

проеродныя влагалищныя , покойнымъ Невбаверомъ подробно раздѣленныя и изслѣдованныя (*), плевы (*tunicæ vaginalis*), то есть: внѣшняя, которая есть общая ядру и сѣменному канатику, и къ которой прирастаетъ подъемяющая оное мышца, посредствомъ волокъ, въ пучечки соединенныхъ.

Внутренняя же сущь общія какъ сѣменному канатику, такъ и самому ядру, изъ коихъ послѣдняя дномъ своимъ по большей части приростаетъ къ общей оболочкѣ, а внутри орошается слизкою влагою, (почти подобною шой, каковою орошается сердечный мѣшечикъ.)

§. 513. Происхожденіе сихъ влагалищныхъ оболочекъ, о коемъ столь разнообразно разсуждаемо было, естли не ошибаюсь, не трудно кажется изъяснить изъ того, что говорено было о образѣ низхожденія ядръ въ свою мощну.

То есть общая получаетъ начало свое отъ пузырьчатого мѣшенка, или въ низъ простирающагося пропяхенія брюшины (§. 502).

Соб-

(*) Neubauer de tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici. Gieß. 1787. 4.

Собственная же каждому ядру производимъ отъ того просяженія брюшины, которое, отъ цилиндра (ф. 503) подымаясь вверхъ, облекаетъ ядро съ самаго зачатія младенца.

Наконецъ одному сѣменному канатику свойственная плева начинается отъ вышепомянушаго згиба брюшины и цилиндра, въ которой превращается она, прежде нежели покроетъ самое ядро.

ф. 514. Къ самому же ядру (*) наподобіе нѣкой корки весьма крѣпко приростаетъ такъ называемая бѣлочная оболочка (*tunica albuginea*), изъ которой кровеносные сосуды въ существо ядра проникаютъ (**), которое все состоитъ изъ безчисленныхъ сосудовъ, въ рядъ почти длинныхъ и въ клубовидные шары свернутыхъ, какъ кровеносныхъ, такъ и отдѣлительныхъ (***), изъ
ко-

(*) Cl. Al. Monro fil. de testibus et de semine in variis animalibus. Edinb. 1755. 3.

(**) B. S. Albini annotat. Acad. L. II. tab. VII. fig. 1. 2. 3.

(***) Недавно случилось сл. Симмеррингу какъ всѣ сосуды, ядро составляющіе, такъ

конхѣ послѣдніе Галлеровымъ сосуди-
стымъ сѣшообразнымъ сплещеніемъ (*),
(rete vasculosum Halleri) и изчерпавшими
Графіевыми (**) сосудами опдѣленное
сѣмя переносятъ въ меньшія ядра, при-
бавочками называемыя (epididymides).

§. 515. Каждый таковый прибаво-
чекъ, съ боку ядра находящійся, со-
стоитъ изъ одного сосуда, почти до 30
футовъ длиннаго, который съ стороны,
называемой его головкою, раздѣляется
почти на 20 шариковъ или конусовъ
(***), а съ другой низшей и въ продолже-
нїи учиняющейся полснѣе (****), копо-
рую хвостомъ (cauda) называютъ, продол-
V жающ-

такъ и всю головку прибавочка его
наполнишь ртутью. Cf. EJ. über die
körperl. Versch. des Hegers vom Europäer
P. 38.

(*) Haller de viis feminis in philos. Transact.
No. 494. fig. 1. g. g.

(**) De Graaf de viror. generationi inferuenti-
bus Tab. IV. fig. 1. 2.

(***) V. cl. Monro fil. observations anatomical
and physiological Edinb. 1752. 8. Tab. I.
E. E. E. F. G. H.

(****) B. S. Albini annotat. acad. L. II. Tab.
III. fig. 1.

жаются въ относящій сосудъ (*vas deferens*).

§. 516. Оба же относящіе сѣмя со-
суды, воздымаясь около шейки мочевого
пузыря, сближаются одинъ къ другому
подъ предстоящею сердцеобразною сѣмен-
ною* железю, (*glandula prostatica*); по томъ
уклоняются назадъ и, разширившись, въ
сѣменные превращаются пузырьки: одна-
ко такъ, что какъ изъ сихъ пузырьковъ,
такъ равно и изъ относящихъ сосудовъ,
въ мочевый стволъ подлѣ пѣшущей голов-
ки (*sarct gallinaginis*) двумя общими про-
токами отверзаются (*).

§. 517. Наконецъ самые сѣменные
пузырьки (*vesiculæ seminales*), на задней и
нижней сторонѣ мочевого пузыря нахо-
дящіеся, и великимъ количествомъ шу-
ка покрытые, вообще представляющъ двѣ
кишечки, разнообразно извишья и много-
численными глухими прицѣпочками сво-
ими вѣшвисто расположенны (**).

Онѣ

(*) B. S. Albinus l. c. I. IV. Tab. III. fig.
1. 2. 3.

(**) V. icones Graafii, Halleri, Albini et cl.
Monroi fil. II. cc.

Онѣ составлены изъ двухъ плевъ, почти такихъ, изъ какихъ, какъ выше упомянуто, состоитъ желчный пузырь, то есть изъ одной плотной внѣшней, къ чувствительнымъ перепонкамъ принадлежащей; а другой нѣжной внутренней, заключающей въ себѣ много клѣпочекъ и ложвинокъ, копорая повсюду воздымающимися морщинами своими (подобными пѣмъ, каковыя усматриваются въ шей желчнаго пузыря) такъ какъ бы на нѣкопорыя пещерки раздѣляется.

§. 518. Изъ сихъ, доселѣ описываемыхъ, путей, съ начала юношескихъ лѣтъ, медленно и въ небольшемъ количествѣ отдѣляется и содержища сѣмя (semen), жидкость совсѣмъ опмѣннаго и достойнѣйшаго замѣчанія свойства, цвѣта избѣла-желтоватаго, запаху со всѣмъ особливаго, копорая при осязаніи оказывается клейкою и имѣютъ довольно великую тяжесть, копорою она всѣ прочія жидкости, отъ крови отдѣляющіяся, превышаетъ.

§. 519. Кромѣ сего она по наблюденіямъ, первымъ Гамомъ въ (*)

V 2

1677

(*) V. Fr. Schröder de Microscopior. usu in nat. sc. et anatome, Goetting 1681. 8. p. 34.

1677 году учиненнымъ, имѣетъ еще особенностъ, что содержишь въ себѣ безпредѣльное множесиво, въ одно шокмо увеличительное стекло усматриваемыхъ, животныхъ, принадлежащихъ къ порядку такъ называемыхъ насшойныхъ, въ настояхъ то есть зараждающихся животныхъ (*infusoria*), кошорыя въ разныхъ родахъ животныхъ разный видъ имѣють. Но въ чловѣкѣ равно какъ и въ ослѣ (*) сїи маленькія сѣменные животныя суть округлыя (*ovalia*), весьма тонкіе хвостики имѣющіе; про кошорыхъ утверждають, что онѣ находятся развѣ въ ослѣ и плодоносномъ мужескомъ сѣмени, такъ что кажется онѣ нѣкошорымъ образомъ составляють споронній признакъ его плодоносной зрѣлости: споронній, говорю, по тому, что въ нихъ не находится никакого начала плодоносїа, кольми паче не должно почитать животныхъ сихъ за будущіе зародыши; о чемъ, какъ кажется, послѣ множайшихъ и припомъ

много-

(*) Cf. W. Fr. v. Gleichen über die Saamen u. Infusionsthierchen. Norimb. 1778 Tab. I. fig. 1. collat. c. Tab. IV. fig. 1.

многоважныхъ (*) доказательствъ и наблюдений упоминать не нужно.

§. 520. Сія дѣшородная жидкость, собираясь мало по малу въ сѣменныхъ пузырькахъ, сохраняется въ оныхъ до благовременнаго изверженія, и, пребывая въ нихъ долгое время, претерпѣваетъ почти такія перемѣны, каковыя обыкновенно случаются съ желчью, содержиomoю въ своемъ пузырькѣ, по есть: по отдѣленіи изъ него водяности, больше и больше сгущается, и крѣпче и душистѣе учиняется.

§. 521. Ибо какъ ядра съ своими каналиками, на коихъ они висятъ, изобилуютъ удивительнымъ множественномъ пасочныхъ жилъ, выпрѣвающую изъ сѣмени влагу въ кровь относящихъ, и такимъ образомъ дальнѣйшему отдѣленію сѣмени выше помянутымъ образомъ (§. 476) споспѣшествующихъ; такъ и въ сѣменныхъ пузырькахъ таковоже порядка находятся сосуды, которые,

V 3

вби-

(*) Cf. cl. Spallanzani tam in opusculi di fisica animale e vegetabile. Mutin. 1776. 8. Vol. II.

Quam in Differtazioni &c. ib. 1780. 8. Vol. II.

вбирая въ себя внутреннюю водичу, прочее сѣмя учиняющѣ крѣпче и дѣйстви- тельнѣе.

§. 522. Что касается до того, вса- сывается ли когда либо въ кровь на- сняящее сѣмя изъ пузырьковъ въ здо- ровомъ человѣкѣ? по я о семъ премного сомнѣваюсь, а наипаче о томъ утвержде- ній, что якобы оно входитъ въ крово- возвращныя жилы, окрестъ сѣменныхъ хранилищъ лежащія; больше же всего о томъ, ~~что~~ ~~якобы~~ ~~такимъ~~ ~~всасывані-~~ емъ сѣмени (еслили какое бываетъ) предохраняется человѣкъ отъ неблаго- временныхъ побужденій къ совокупленію, когда (еслили посмотришь на явле- нія, случающіяся въ живошныхъ, въ уреченныя времена стремящихся къ совокупленію, сравнивая ихъ съ состоя- ніемъ Евнуховъ) весьма ясно оказы- вается, что всасываніе оное сѣмени въ кровь большею частію бываетъ причиною необузданной и почти неистовой оной похоти или любовожденія.

§. 523. На сей повидимому ко- нецъ дано человѣку совсѣмъ опимѣн- ное преимущество (каковаго, сколь- ко я знаю, ни одно изъ живош- ныхъ кромѣ его не имѣетъ), то есть:

нощ-

нощныя поползновенія или оскверненія (pollutiones), которыя причисляю я къ естественнымъ мужскимъ испражненіямъ, и которыя имѣетъ человѣкъ для того, чтобы посредствомъ оныхъ чаще или рѣже, судя по различію тѣлосложенія и состоянія времени, освобождался отъ излишняго количества сѣмени, скуку и побужденіе къ совокупленію причиняющаго.

§. 524. Самое однако жъ сѣмя по отдѣленіи своемъ никогда одно не извергается, но вмѣстѣ съ влагою сѣменной предстоящей железы, которая, судя по внѣшнему виду, кажется весьма много походитъ на яичной бѣлокъ и получаетъ имя отъ своего источника, то есть отъ тѣла, довольно величину и особенное весьма плотное строеніе имѣющаго, которое находится между сѣменными пузырьками и луковицею мочеиспускательнаго ствола (bulbus urethrae), и вообще называется предстоящею сердцеобразною железой (glandula prostatica). Пуши описываемой здѣсь жидкости еще не довольно извѣстны, исключая развѣ то, что можетъ быть онѣ имѣютъ сообщеніе съ пазухами сѣменнаго мяса, (caruncula feminalis), коего устѣй-

це, находящееся между двухъ протоковъ сѣменныхъ пузырьковъ (§. 516) отверзается въ мочевый стволъ (*).

§. 525. Мочеиспускательный мужескій стволъ, (urethra) есть общій испражнительный каналъ, для изверженія трехъ разнородныхъ жидкостей опредѣленный: но есть для мочи, дѣшороднаго сѣмени и мокроты предстоящей сѣменной железы. Внутри умащается слизью, изъ многочисленныхъ пазухъ, ~~разсѣянныхъ по всему его протоку,~~ исходящую (**). Окружается же онъ ноздреватогубчатымъ переплещеніемъ (frongiosus contextus), на которомъ лежатъ два другія гораздо толстѣйшія также губчатоноздреватые шѣла (***) (corpora frongiosa), составляющія большую часть дѣшороднаго мужескаго члена; который, оканчиваясь спереди головкою (glans), покрывается весьма нѣжною, не имѣющею жира и удобообразширяемою кожею,

(*) Morgagni aduerfar. anat. IV. fig. 1. 2.

(**) Jo. Ladmiral effigies penis humani LB. 1741. 4.

(***) Ruysch obseruat. anat. chirurg. Centur. pag. 99. fig. 75 - 82.

Ej. Ep. problemat. fig. 2. 4. 6. 7.

жею, которая съ самаго вѣнца головки (corona glandis) составляетъ крайнюю площъ, свободно движимую по головкѣ, подобно какъ двигающіяся вѣка по глазнымъ шарамъ. Внутреннее же крайней площи здвоеиіе по головкѣ дѣпороднаго члена (почти такъ какъ бѣлочная плева по главному шару), по перемененіи вида своего, уклоняется назадъ, и подлѣ вѣнчика оной усѣяно многими Липровыми (*), нѣкоторымъ образомъ сходствующими съ Мейбомовыми вѣковъ железами, особенное салное вещество испускающими (**).

V 5

§. 526.

(*) Morgagni aduersar. anat. I. Tab. IV. fig. 4. i. k.

(**) Всѣмъ извѣстно, что сіе жирное вещество у юношей, наипаче во время ихъ разгоряченія, удобно собирается и почти на подобіе шворага сгущается, причиняя оспрошю своею безпокойство и пр. каковому безпокойству наипаче подвержены народы теплыхъ странъ, и кажется, что главное намѣреніе обрѣзанія состояло въ томъ, чтобы отвратить скопление упомянутаго вещества. Посему вѣдаемъ мы, что въ жаркой Сенегамбіи даже Христіане обрѣзываютъ себѣ крайнюю площъ; напрошивъ шго Европейцы

ис-

§. 526. Такимъ образомъ составленный мужескій дѣшпородный членъ иногда воздымается такъ, что по умноженіи и скоромъ скопленіи и изліяніи крови въ ноздреватыхъ его шѣлахъ (ибо таковое изліяніе крови, ежели не есть единственная, то по крайней мѣрѣ главнѣйшая причина возстанія мужескаго члена) напрягается и швердѣетъ, а по всосаніи паки излишней крови въ крововозвратныя жилы опять увядаетъ и шончается.

§. 527. Пришедши въ такое состояніе дѣшпородный мужескій удѣ, подлѣ шеи мочевого пузыря, откуда онъ воспріемлетъ свое начало, изкривляется—

необрѣзанные, на востокѣ обитающіе, весьма часто упомянутое прешерпѣваютъ безпокойство. Посему давно уже утверждалъ славный своего времени руководящей врачевной науки возстановитель Гвидонъ де Коліакъ (сск. XIV medio), что обрѣзаніе кромѣ Жидовъ и Срациновъ есть полезно и для другихъ многихъ народовъ: для того, чтобы не собиралась нечистота у корня дѣшпороднаго члена, и не разтѣрячала онаго. Chirurgiae Tr. VI. doct. II. p. m. III.

ляется (*), каковое его положеніе бываетъ способно къ испражненію мочи, напрошивъ же того къ изверженію сѣмени совсѣмъ неспособно, потому что въ то время, начало мочеиспускательнаго ствола съ отверзшіями сѣменныхъ пузырьковъ сходятся подъ острѣйшимъ угломъ.

§. 528. При напряженіи и возстаніи дѣтороднаго члена обыкновенно сперва истекаетъ жидкость сердцеобразной сѣменной железы, которая часто одна, рѣдко же когда либо съ мочею истекаетъ; коея влаги первое употребленіе кажется есть то, чѣобы вкупѣ съ сѣменемъ извергаться либо для того, чѣобы слизкостію своею яичному бѣлку подобною разводитъ вязкость и густоту сѣмени, и шѣмъ пособствовать изверженію онаго; либо для того, чѣобы нѣкоторымъ образомъ споспѣшествовать и къ совершенію дѣтородія.

§. 529.

V. cl. Camperi demonstration. anat. pathologic. I. II. Tab. III. fig. 1.

(*) Gysb. Beundt de fabrica et vſu viscerum vropoieticorum LB. 1744. 4. — recurs. in Halleri collect. disput. anat. T. III. Tab. III.

§. 529. Самое же изверженіе сѣмени возбуждается, какъ великимъ количествомъ и собраніемъ въ своихъ хранилищахъ, такъ и побужденіемъ присутствующаго любимаго предмета; совершается же оно сперва самымъ большимъ щекопаніемъ (*tentigo*), пущь мочѣ заграждающимъ, сѣмени же напрошивъ того опшверзающимъ; а по томъ нѣкоторымъ судорожнымъ сжиманіемъ сѣменныхъ пузырьковъ, содроганіемъ подбемляющихъ задній проходъ и ускоряющихъ мочеизпеченіе мышцъ, и наконецъ попрясеніемъ всего чувстввенножильнаго состава, которое хотя есть крапковременное и легкое; однакоже всегда соединено бываетъ съ судорогами и умаленіемъ силъ.



ОТДѢЛЕНІЕ ХІІ.

О родотворныхъ дѣйствіяхъ женскаго пола вообще (*de functionibus genitalibus sexus sequioris*)

§. 530. Какъ съ одной стороны мужскіе дѣшродные члены опѣ природы способны пріугошовлять и извергать сѣмя, такъ съ другой стороны женскіе удобны воспринимать оное. Вообще же

же члены сїи суть премногоразличны между собою, исключая нѣкоторыя части, въ коихъ дѣтородныя обою пола орудїя великое имѣютъ сходство. Таки́мъ образомъ подъ лобковою или лунною костью (о строенїи копорыя въ (§. 26 упомянуто), въ верхнемъ здвоенїи губъ находящїйся язычекъ (clitoris) во многомъ сходствуетъ съ мужескимъ членомъ, исключая одно то, что онъ отдѣленъ отъ мочеиспускательнаго сшвола, не имѣетъ никакого отверзїя и находится очень малъ, будучи надлежаще устроенъ; ибо не рѣдко, какъ въ бытоописанїяхъ упоминается, и у взрослыхъ такую же имѣетъ величину, каковая бываетъ у зародыша женскаго пола (§. 492). Почему вѣроятнымъ (*) кажется, что таковой срамный недостатокъ (vitium) подалъ случай къ вымыслу баснословныхъ Гермафродитовъ или двуснасныхъ. Впрочемъ описываемый здѣсь язычекъ подобно мужескому дѣтород-

(*) V Halleri in Commentar. Soc. Scient. Goetting. Vol. I. pag. 12. fqq.

Exeplorum icones exhibet Gautier in observations. sur l'hist. nat. a. 1752. 4.

родному члену состоишѣ изѣ ноздреватыхѣ пѣлъ, имѣетѣ способность напрягаться, покрывается крайнею плотію и умащается жирнымѣ веществомѣ, Липровому подобнымѣ (*) (§. 525).

§. 531. Отѣ языка низпускающія меньшія дѣшороднаго женскаго члена губы (*pumphae*), иногда подобно язычку чрезвычайно великими (**) бывающія, каковой недоспашокѣ также подаѣ случай

(*) Та же самая жирная матерія (*sebum*), поелику вѣ теплыхѣ странахѣ у женщинѣ, равно какѣ и у мужчинѣ собирается и учиняется ѣдкою; для того и подаѣ случай обрѣзывать даже дѣвицѣ, что у премногихѣ жителей Африки и теплоу Азіи находится вѣ обыкновеніи. Изображеніе дѣшородныхѣ частей одной изъ лѣшней Арапской дѣвицы, весьма живо представленное, съ Востока привезѣ слав. Нибурнѣ (v. E. J. Beschreib. von Arabien. p. 77 fq.) и для представленія обществу мнѣ оное подарилѣ.

Которое я, вырѣзавши на мѣди, представилѣ вѣ К. о различіи рода человѣческаго *Tab. II. fig. 4.*

(**) *Quid quod et numero ludere aliquando vifae sunt. — Cf optimus Neubauer de triplici pumphae ordine, Jenae 1774. 4.*

чай (*) къ несправедливому о нихъ повѣствованію. Онѣ подобно языку имѣютъ весьма великую чувствительность, и кажется, что нѣкопорымъ образомъ направляющъ испускаемую мочу, потому что отверзтіе мочеиспускательнаго сѣвола, въ женскомъ полѣ весьма короткаго, и въ совершенно хорошемъ устройствѣ премногія складки имѣющаго, (**), какбы на днѣ, то есть въ верхнемъ ихъ соединеніи обрѣтается.

§. 532. Подъ симъ отверзтіемъ находится устье самаго маточнаго рукава (*os uterini vaginae*), окруженное пещерами
раз-

(*) De singulari nempe Hottentottarum cutaneo ventrali, quod vero pridem ad nymphas enormes pendulas retulit medicus autopsya Wilh. Ten Rhyne de promontorio b. spei pag. 33.

Simile quid de Kamtschadalicis feminis refert Steller Besch. v. d. Lande Kamtschatka pag. 300.

(**) Сіе мочеиспускательнаго сѣвола устье, прензачными паковыми складками усѣянное, видѣлъ я въ изображеніи дѣпородныхъ частей одной вѣтхой старухи, у которой какъ дѣвственная плева была цѣлая, такъ и прочія части весьма хорошо изображенныя, которое получилъ я отъ пріятеля своего, славнаго Медика Г. Біхнера

разнаго рода, куды на пр. принадлежащѣ
слизепочныя спволовыя Графѣвы (*) лу-
жицы (lasiпæ) и устья предстоятельныхъ
железъ, неправильно Касп. Баршולי-
номъ (**) такъ названныхъ, коихъ жир-
ною слизью срамныя сѣи части смазы-
ваются (***).

§. 533. У самого же входа мапоч-
наго рукава находится дѣвственная пле-
ва (hуmen) (****), составляющая знакъ не-
поврежденнаго дѣвства, которая, сколь-
ко мнѣ извѣстно, ни одному роду жи-
вотныхъ кромѣ человѣка не дана, и ко-
ея естественная польза и понынѣ еще
неизвѣстна.

По распорженіи плевы сея оштаточ-
ки оныя мало по малу превращаются въ
мирпообразныя мясца, числомъ неиз-
вѣщныя (carunculæ myrtiformes).

§. 534.

(*) V. Jo. Jac. Huberi icones vteri, inter Hal-
lerianas. fasc. I. Tab. II. fig. 1. g.

(**) Ibid. fig. 1. Tab. II. fig. 1. b. — fig. 5. d.

(***) Huc quoque referenda duo a Jo. Dryandro
in extremo vulvae viuientium mulierum sæpissime
visa. v. Nic. Massaе. epist. medicinal. T. I. p.
123. b.

(****) Huber. l. c. fig. 3. 4. 6.

It. B. S. Albini annotat. Acad. L. IV.
Tab. IV.

§. 534. Посемъ между мочевымъ пузыремъ и заднепроходною кишкою простирается въ верхъ влагалище или рукавъ матки, составленный изъ клѣтчешаго многососудистаго переплещенія, внизу окруженный сжимательною влагалищною (*) мышцею (sphincter cervi); а внутри покрытый весьма мягкою плевою, копорая раздѣлена двумя изящными морщиноватыми (**) сполпиками (rugosae columnae), переднимъ то есть и заднимъ (***), изъ коихъ морщинъ истекаетъ слизистая мокрота, внутренность онаго смазывающая.

§. 535. На верху окружности рукава находится матка (uterus), съ обѣихъ сторонъ на широкихъ связкахъ повѣшенная.

Цилиндрическая ея шея (****) окружается и какъ бы объемлется рукавомъ,

А а

и мѣя

(*) Eustachii Tab. XIV. fig. 1. X. X.

Santorini Tab. posth. XVII. I. I.

(**) Huber de vaginae vteri structura rugosa, nec non de hymene. Goetting. 1742. 4.

(***) V. Halleri icones anat. fasc. II. Tab. VI. fig. 1. 2.

(****) Jo. Gottfr. Weisse (praes. G. Rud. Boehmer) de structura vteri non musculoſa, sed celluloso-vasculoſa. Vitemb. 1784. 4.

имѣя шѣсное устье, которое подобно машочному рукаву опличается морщиноватымъ устроениемъ, то есть: такъ называемымъ древомъ жизни, и котораго оба опверзшя, а наипаче верхнее или внутреннее, по большей части вязкою слизью покрыты бывающъ.

§. 536. Существо машини есть со всѣмъ опмѣнно устроенное, состоящее изъ собственнаго весьма плотнаго сплешенія (*), снабженнаго великимъ множествомъ кровеносныхъ сосудовъ, удивительными змѣобразными извиваніями (*anfractus serpentine*) распросширающихся (**), изъ коихъ крововозвратныя жилы не имѣющъ заслоночекъ. Кромѣ сего машинка безъ сомнѣнія снабжена и пасочными сосудами (***); что же до чувствительныхъ жилъ; то машинка неисчетнымъ множествомъ оныхъ изобилуетъ (****), ради которыхъ имѣетъ она удивительное согласіе со множайшими частями шѣла.

§. 537.

(*) Cl. Walter de morbis peritonaei Tab. I. II.

(**) Cf. Morgagni aduers. anat. IV. p. 135.

(***) Cl. Walter Tab. nervor. thorac. et. abdom. Tab. I.

(****) Ferrein. in Mem. de l'Ac. des Sc. de Paris a. 1741. P. 375.

§. 537. Машка извнѣ покрывается брюшиною, малая же внутренняя ея полость, а особливо на днѣ, облекается мягкой и нѣжною ноздревашою перепонкою, о которой иные утверждаютъ, что она составлена изъ прозрачныхъ сосудовъ (§. 80); другіе говорятъ (*), что она состоитъ изъ всасывающихъ пасочныхъ жилъ.

§. 538. Что касается до мышечнаго устройства, которое въ машкѣ одни (**) поставляютъ, а другіе отвергаютъ (***); то я покрайней мѣрѣ смѣю сказать, что я во всѣхъ, сколько до сихъ поръ ни изслѣдовалъ, человѣческихъ какъ непраздныхъ, такъ и праздныхъ машкахъ, (коихъ я имѣлъ случай изслѣдовать не только въ прѣугошвленіяхъ оныхъ, но и въ самыхъ свѣжихъ трупахъ) ничего такого не примѣтилъ, чтобъ можно было почестъ за мышечныя волокна; кромѣ сего со дня на день больше и больше удословляюсь въ томъ,
А а 2 что

(*) Cl. Mascagni l. c. pag. 4.

(**) Cf. v. c. cl. Sue in mem. presentes Vol. V.

(***) V. argumenta cl. Walteri in Betracht. über die Geburtstheile des weibl. Geschl. p. 25 sq.

что въ маткѣ не находится никакой раздражительности (§. 306), однимъ мышковымъ волокнамъ свойственной; но вмѣсто оныя обрѣщается собственная жизнь, соопвѣствующая всѣмъ тѣмъ опмѣннымъ движеніямъ и дѣйствіямъ матки, копорыхъ ни отъ какой изъ жизненныхъ силъ, однороднымъ частямъ тѣла общихъ, производить не можно, и копорыя древнимъ Врачамъ и Философамъ казались столь особливыми и одной маткѣ свойственными, что по сему вообще называли матку животнымъ, въ животномъ содержимымъ.

§. 539. Изъ угловъ сводоподобнаго маточнаго дна съ обѣихъ сторонъ выходятъ Фаллопьевы трубы (*) (*tubæ Fallopianæ*), два оныя тѣсные и извитые протоки, простирающіеся въ верхнемъ здвоеніи пакъ называемыхъ широкихъ маточныхъ связокъ (*ligamenta lata*), имѣющіе устройство, составу маточнаго рукава подобное, исключая то, что онѣ, не имѣя внутри морщинъ, облечены весьма мягкой и нѣжною губчатою плевою.

§. 540.

(*) Fallopiæ observ. anat. p. 197.

§. 540. Находящіяся на конечностяхъ ихъ чревные устья (orificia abdominalia), кромѣ того, что онѣ другихъ въ матку отверзающихся обрѣтаются ширѣ, онѣ совсѣмъ еще особеннаго преизящнаго усроенія губчатыми и какъ бы перстамъ подобными окружаются сборами (fimbriae), кои немалое кажется имѣютъ дѣйствіе въ произведеніи зачатія; ибо онѣ, во время совокупленія, напрягаясь подобно самымъ трубамъ, кажется обмѣняютъ сѣменные яичники.

§. 541. Самые же яичники (ovaria) или, какъ ихъ до временъ Штеноновыхъ (*) обыкновенно называли, женскія ядра, кромѣ крѣпкихъ и почти сухожильныхъ оболочекъ, состоятъ еще изъ плотной клѣтчестой плевы, изъ коихъ въ каждомъ содержишься до 15 личекъ такъ называемыхъ Графіевыхъ, то есть круглыхъ пузырьковъ, или лучше сказать капелекъ бѣлочносѣдающагося желтоватаго соку, который подобно настоящему яичному бѣлку сгущается,

А а 3 еже-

(*) Steno enim primus mulierum testes ovario analogos dixit a. 1667. v. EJ. elementor. myologiae specimen pag. 117 sq.]

ежели свѣжій яичникъ положишь въ кипящую воду.

§. 542. Таковая бѣлочностьдающаяся капля кажется составляетъ первую влагу, которую женщина сообщаетъ къ зачатію; ибо вѣроятно, что въ печеніе возрастныхъ лѣтъ изъ оныхъ капелекъ одна за другою мало по малу приходитъ въ зрѣлость такъ, что сперва какъ будто проникаетъ сквозь покровъ, коимъ, какъ выше видѣли, облекается яичникъ, пока наконецъ будетъ въ состояніи когда либо распоргнуть оный и воспріять бытъ усъемъ брюшной Филлопѣевой трубы.

§. 543. Впрочемъ извѣстно, что кромѣ сего изъ яичника изпекающаго бѣлочнаго соку еще и другая влага, несправедливо опъ древнихъ женскимъ сѣменемъ называвшаяся, во время совокупленія изливается, о свойствѣ коея, испочникахъ и повсемственности также ничего подлиннаго опредѣлить не можно, какъ и о пользѣ и употребленіи оныя (*).

ОТ-

(*) О мокротѣ сей до сихъ поръ ничего лучшаго не вѣдаемъ мы, кромѣ того, что

ОТДѢЛЕНІЕ XLII.

О мѣсячномъ кровотеченіи (*de mensibus s. menstruis*).

§. 544. Самое частое и самое важное дѣйствіе матки состоишь въ томъ, чтобы придать почти лѣтъ ежемѣсячную воздавать дань природѣ, каковымъ закон-

коне-

Г. Галлеръ повѣствуетъ о ней: Exercit. de generat. animalium pag. 95. ed. Lond. 1651. 4. слова котораго здѣсь я прилагаю. Онъ говоритъ, что не всякихъ животныхъ самки, ниже всѣ женщины такую выпускаютъ мокроту, и ниже послѣдуетъ какая либо помѣха въ зачатіи безъ изліянія сея влаги. Ибо я многихъ зналъ женщинъ, говоритъ онъ, кои безъ испущенія таковой мокроты довольно дѣшродны были, и нѣкоторыхъ зналъ такихъ, которыя при изліяніи таковыя мокроты хотя во время совокупленія великое ощущали удовольствіе; однако въ обыкновенномъ плодородіи великую имѣли утрату. Кромѣ сего находясь безчисленные такія женщины, кои при совокупленіи хотя и чувствуютъ удовольствіе; однако таковой мокроты не проливаютъ, и однакожь зачинають въ утробѣ. Почему,

УДИ-

коненіемъ никакого другаго рода (*) жи-
вошныхъ не обязала оная природа, когда,
ска-

удивляюсь я, что поспавляющіе та-
ковое изліяніе мокроты необходимымъ
къ дѣшпоржденію, не могли примѣшнть,
что мокрота оная истекаетъ вонъ, и по
большей часпи около язычка и устья
пайнаго уда проливается, рѣдко же когда
либо въ оной, въ машку же никогда не
изливается, чтобы тамъ смѣшиваться
съ мужескимъ сѣменемъ. Она также есть
сукровичная или водяная какъ и моча,
а не густая и вязкая, какъ мужеское сѣмя,
что узнаваешь однимъ осязаніемъ.

(*) Вообще Писатели Естественной Исто-
ріи, и между ими Г. Бюфонъ кро-
мѣ человѣческаго рода и другимъ нѣкошо-
рымъ живошнымъ питающимъ грудью, а
наипаче обезьянамъ, приписываютъ тако-
вое уреченное кровотеченіе. Однакожъ ко-
гда я многихъ обезьянъ самокъ изъ того
опдѣленія оныхъ, о [коихъ] сіе повѣ-
ствуется, на пр. (сабакогрыза (*супомолгус*)
проспую обезьяну (*шиміа фулванус*) маймона,
(*парю мадрі*), чрезъ многіе годы раз-
смащривалъ, то припѣшилъ, что мни-
маго онаго кровотеченія у иныхъ вовсе
не было, а у другихъ того же вида
кровотеченіе было малое и непостоян-
ное, никакого уреченнаго порядка не
имѣвшее.

сказать съ Плиніемъ, одна только женщи-
на есть животное, мѣсячныя кровинося-
щее; и напрошивъ того никакого изъ из-
вѣстныхъ доселѣ народовъ не исключила
опѣ онаго (*), когда вообще пламяное

Б 6

при-

(*) Повѣствованіе о цѣлыхъ нѣкоторыхъ
народахъ, а наипаче Американскихъ,
не имѣющихъ мѣсячнаго кровопеченія, те-
перь почти никакого не требуетъ опровер-
женія. Что кажется опшуда произошло,
что Европейцы, ѣздившіе въ страны оныя,
хотя и видѣли безчисленныхъ тамошнихъ,
не совсѣмъ впрочемъ натихъ женщинъ; од-
нако не могли примѣтить у нихъ мѣсяч-
наго кровоочищенія; каковаго происше-
ствія двоякая повидимому была причи-
на; частію то есть, что у оныхъ Аме-
риканскихъ народовъ по ихъ щасливимъ
предразсудкамъ носящія пламяное жен-
щины почитаются за ядовитыхъ; а посе-
му и высылаются опѣ общежительства
въ опдаденныя хижины, гдѣ опѣ чрезъ
все время мѣсячнаго кровопеченія пребыва-
ютъ покойны: частію великая чистота
пѣла и хорошее положеніе ногъ у Американ-
скихъ женщинъ были причиною, что мѣсяч-
ныхъ кровей не лзя было примѣнить
Европейцамъ, о чемъ ясно пишетъ Андрей
фонъ Беркель in *Amerikanische voyagen na*
Rio de Berbice en Suriname pag. 21.

принадлежитъ къ тѣмъ необходи-
мымъ потребностямъ, коими женскій
полъ учиняется способнымъ къ распро-
страненію человѣческаго племени.

§. 545. Первая же явленія сего дѣй-
ствія въ нашемъ поясѣ по большей ча-
сти показывающся на пятнадцатомъ го-
ду, копорымъ предшествуютъ наиболѣе
припадки полнокровія, каковыя на пр.
суть: скопленіе крови въ груди, чув-
ствованіе напряженія и стягоспи въ чре-
слахъ, слабость въ ногахъ и прочая;
въ каковое время сперва изходитъ изъ
дѣтородныхъ частей красноватая влага,
за копорою потомъ слѣдуетъ нѣсколько
краснѣйшая и при томъ съ кровью смѣ-
шенная жидкость, перемѣняющаяся по-
томъ въ настоящую кровь, которая чрезъ
нѣсколько дней тихо истекаетъ съ
прекращеніемъ всѣхъ упомянутыхъ без-
покойствъ.

§. 546. Испеченіе оное крови съ са-
маго начала своего, по прошествіи каж-
дыхъ четырехъ недѣль, опять возвра-
щается, и продолжается по большей ча-
сти шесть дней, въ какое распояніе,
по утверженію Сочинителей, изъ здо-
ровой женщины вытекаетъ отъ осьми
унцій до цѣлаго фунта крови.

§. 547.

§. 547. Прерывающся же дѣйствіе сіе по большей части тогда, когда женщины либо беременны бывающъ, либо кормящъ грудью.

Совершенно же переспаетъ оно по прошествіи почти тридцати лѣтъ, что въ нашемъ климатѣ обыкновенно случается на сорокъ пятомъ году.

§. 548. Источники мѣсячныхъ кровей иные причисляющъ къ сосудамъ маточнаго рукава, иные и припомъ справедливе къ сосудамъ самой матки; ибо въ противную спорону представляемые примѣры такихъ женщинъ, кои хоща и беременны были, или не имѣли отверстія въ маткѣ, или спрадали выпаденіемъ оныя, однакожъ носили мѣсячныя крови, не иное что доказывающъ, какъ преизящныя усилія врачующей природы, копорая умѣетъ съ пользою употреблять и необычныя пуши, когда обыкновенная дорога преграждена. Кромѣ сего доказывающъ испинну сію многочисленныя матки, вынутыя изъ женщинъ, во время мѣсячнаго ихъ очищенія скончавшихся, коихъ полости изкапали (*)

Б 6 2

кровь,

(*) Cf. v. c. Morgagni aduers. anat. I. tab. M. M. M.

кровь, не упоминая о доказательствах; изъ началъ самаго разума почерпаемыхъ, по коимъ открывается, что самый конецъ мѣсячнаго очищенія есть потъ, чтобы матка такимъ уреченнымъ мѣсячнымъ кровотеченіемъ предуготовлялась къ зачатію плода, и учинилась способною къ вытанію онаго. По каковымъ самымъ причинамъ кажется должно приписывать такое же кровотеченіе болѣе бѣющимъ, нежели крововозвратнымъ маточнымъ жиламъ.

§. 549. Чтожъ до причинъ урочнаго сего и всегдашняго кровотечения; то источникъ и произхожденіе оныхъ многимъ подвержены затрудненіямъ, такъ что въ семъ случаѣ однѣ токмо правдоподобныя причины поставлять и не далѣе оныхъ простирается можно (*).

По

(*) Adeant, quorum interest, post alios Abr. D'orville (praes. Hallero) causae menstrui fluxus disquisitionem. Goetting. 1748. 4.

Gib. Verz. Muilman an ex celebrata hactenus opinione de plethora vniuersali vel particulari vera fluxus menstrui causa explicari possit? LB. 1772. 4.

По чему ближайшую причину ежемѣсячнаго очищенія полагаютъ въ нѣкоторомъ мѣсѣнномъ скопленіи крови, всему подлинно соотвѣтствующую какъ припадки наступающихъ мѣсячныхъ кровей, такъ многочисленность и свойство маточныхъ сосудовъ.

Къ дальнѣйшимъ же причинамъ можно причислять, какъ возвышенное положеніе шѣла, яко такое несравненное преимущество, которое отличаетъ человѣческій родъ отъ прочихъ животныхъ, такъ и особое матки устройство и собственную ея жизнь.

Чтожъ принадлежишь до причины урочнаго сего явленія, то лучше признать въ семъ случаѣ свое незнаніе, нежели заниматься тщетными умоположеніями: когда всѣ шѣ явленія, какъ въ здоровомъ такъ и больномъ животномъ случающіяся, коихъ предѣлы далѣе сужьются проспируются, кажется должно почищать таинствами природы.



Б 6 3

ОТ.

Jac. Fr. Martley de menibus. Edinb. 1773. 8.
Theod. Traug. Jaehkel (praes. Krause)
aetiologia fluxus menstrui. Lips. 1784. 4.

ОТДѢЛЕНІЕ XLIII.

О молокѣ (de lacte).

§. 550. Равному жребію подвержены съ машкою и груди (mamæ), сіи свя-
тѣйшіе источники, какъ ихъ симъ
именемъ называетъ у Геллія Фа-
воринъ, кои питаютъ весь родъ чело-
вѣческій. Ибо въ младенческомъ возра-
стѣ никакого почти не бываетъ дѣйствія
обоихъ сихъ орудій; начинается же и
открывается оное въ юношесствѣ такъ,
что какъ скоро начнутъ приходишь мѣ-
сячныя крови, въ то время начинаютъ
умножаться и груди; также съ сама-
го того времени либо вмѣстѣ съ машкою
претерпѣваютъ перемѣны; ибо въ про-
долженіи беременности груди надуваютъ-
ся и испочають молоко; либо въ разныя
времена; когда сколь долго питаетъ
грудью мать, столь долго мѣсячныхъ
кровей не бываетъ; а ежели мать не кор-
митъ грудью; то въ то время въ боль-
шемъ количествѣ бывають очищенія послѣ
родовъ (lochia) и такъ далѣе. Наконецъ при
наступленіи старости оба дѣйствія сіи
совсѣмъ прекращаются такъ, что когда
мѣсячныя крови больше не возвращаются;
то какъ машка, такъ и груди бываютъ
слабы

слабы и вялы, не упоминая уже о болѣзненныхъ явленіяхъ, въ непорядочныхъ мѣсячныхъ кровяхъ, бѣляхъ (fluor albus) и другихъ подобныхъ болѣзняхъ ясно усматриваемыхъ, кои описываемое здѣсь грудей съ маткою согласіе очевидно подтверждаютъ.

§. 551. И ежели вникнуть въ спольстѣсный союзъ матки съ грудями; то не покажется удивительнымъ, что всѣ оныя споль многоразличные согласія между частями шѣлесными виды, въ другомъ мѣстѣ (§. 54) въ особливости изчисленные, всѣ, говорю, до единого имѣютъ (*) происхожденіе свое отъ сходственнаго успроенія грудей съ брюшными женскими орудіями.

§. 552. За самое же важное почиталось нѣкогда взаимное сообщеніе внутрення грудныя съ подчеревною бѣющеюся жилою (**), коему хощя нѣкогда и чрезвычайно много приписывали

Б б 4

Еще.

(*) Cf. Jac. Avenae de mirabili, quae mammae inter et vterum intercedit, sympathia LB. 1784. 4.

(**) Eustachii tab. XXVII. fig. 12.

Halleri icon. anat. fasc. VI. tab. I.

Естествословы (*); однакожъ ежели кто приметъ въ разсужденіе ту перемѣну пространства, которая случается въ подчеревной жилѣ во время беременности и кормленія матери грудью, потѣмъ почтетъ за вѣроятное, что въ общеніи ономъ не малая находится важность.

§. 553. Кромѣ сего матка и ту еще имѣетъ общественность съ грудями, что оба сіи орудія имѣютъ великое средство съ питательнымъ сокомъ, который онѣ наипаче во время беременности къ себѣ прииягиваютъ, и въ особливое употребленіе обращаютъ.

§. 554. Грудь же или шишка (mamma) (**) женская состоитъ изъ пироогообразнаго соединенія клубовидныхъ железъ, многочисленными бороздочками на большія доли раздѣленнаго, и вообще какъ будто въ шучную глыбу погруженнаго, которая (грудь) наипаче спереди твердымъ напряже-

(*) Recte monente cl. G. Rud. Bochner de consensu uteri cum mammis causa lactis dubia. Lipf. 1750. 4.

(**) Cl. Kölpin de structura mammarum Gröphisw. 2765. 4. c. fig. aen.

жена туюкомъ, самонѣжнѣйшею кожею по-
крытымъ.

§. 555. Каждая изъ помянутыхъ долей по многоразличномъ раздѣленіи составляется изъ меньшихъ долей, а сіи вообще изъ такъ называемыхъ зернъ или шариковъ, въ коихъ находятся корни (*) млечныхъ протоковъ (*ductus lactiferi*), вбирающихъ въ себя питательный сокъ изъ крайнихъ вѣтвей внутренней пищеварительной бѣгущей жилы (*arteria mammaria interna*).

§. 556. Сіи послѣднія вѣтви, болѣе и болѣе соединяясь (**) между собою, превращаются наконецъ въ большіе главнѣйшіе пни, числу долей соотвѣтствующіе, такъ что въ каждой груди находится ихъ до пятнадцати или и болѣе, кои хотя вездѣ разпространяются въ большія пазухи, однако повидимому никакими взаимнообразными опроверженіями (*anastomoses*†) не соединяются (***) между собою.

Б 6 5

§. 557.

(*) Cf. с. a. Covolo binas tabulas ad calcem posthumarum Santorini.

(**) V. cl. Girardi tab. I. lisdem Santorini tabulis subiunctam.

(***) Cl. Walter observat. anat. pag. 33 sq.

§. 557. Оканчивающіяся же оныя пни самыми тончайшими изпращнишельными канальцами, которые въ средоточіи груди посредствомъ клѣпчешой плевы соединяются въ сосокъ (*) (papilla), который, будучи снабженъ тончайшими крононосными сосудами и чувствительными жилами, отъ прикосновенія къ нему какихъ либо внѣшнихъ поощреній особливымъ воздымается образомъ.

§. 558. Сосокъ окружается румянцомъ (areola) (**), которое равно какъ и самый сосокъ имѣетъ особенный цвѣтъ (***), Малпигіевою сѣточкою или влагою, подъ кожею находящеюся (****), производимый;
кромѣ

(*) Santorini tab. posth. VIII.

(**) Ruysch thes. I. tab. IV. fig. 4.

(***) У беременныхъ женщинъ, а наипаче въ первый разъ понесшихъ, соски по большей части желты бываютъ.

О Самойдскихъ же женщинахъ утверждаетъ самовидецъ Г. Клингшмедтъ in Mem. sur les Samojedes et les Lapons pag. 44. что у нихъ соски суть чрезвычайно черны даже тогда, когда онѣ бываютъ еще непорочны.

(****) B. S. Albini annotat. Acad. L. III. tab. IV. fig. 3.

кромѣ сего оно имѣетъ сальныя (*) железки, а иногда и самыя хотя впрочемъ и немногіе млечныя (**) протоки.

§. 559. Отдѣляемое въ описываемомъ здѣсь мѣстѣ молоко (час) есть извѣстнаго цвѣта сокъ, по существу своему водяной, пучковатый, сладковатый, и во всемъ подобный млечу домашнихъ сосущихъ животныхъ, исключая одно то, что оно отъ кислоты не свертывается, и не имѣетъ въ себѣ никакой лучшей щелочной соли (***).

§. 560 Будучи же свернуто отъ виннаго спирту, такія оказываетъ начала, изъ каковыхъ состоитъ молоко выше упомянутыхъ животныхъ; ибо кромѣ водянаго пару, который оно, будучи вновь выдоено и тепло, выпускаетъ его сыропорка (serum) отдѣляясь отъ твердой части, содержитъ (****) въ себѣ сальныя
харѣ

(*) Morgagni aduersar. anat. I. tab. IV. fig. 2.

(**) Id. aduersar. IV. fig. 3. et aduersar. V. pag. 148.

(***) Fl. Jac. Voltelen (praef. Hahnio) de lacte humano observationes chemicae. LB. 1775. 4.

(****) Marc. Lud. Velliamoz de sale lactis essentiali. LB. 1756. 4.

харѣ такъ называемый млечный (*lactum lactis*), состоящій изъ сахарной кислоты, соединенной съ извѣстковою землею и маслеными и слизистыми частями. Чтожъ до его смешаны или сливокъ, то про нихъ говорятъ (*), что онѣ состоятъ изъ шариковъ различной и неодинакой величины, такъ что поперечникъ оныхъ заключаетъ между $\frac{1}{200}$ и $\frac{1}{300}$ линій.

§. 561. Но сходство между питательнымъ сокомъ и кровію (§ 10. 453), также между обоими сими жидкостями и самымъ молокомъ примѣчаемое, довольно вѣроянымъ учиняетъ то, что описываемое здѣсь молоко есть видъ самаго питательнаго сока, изъ крови вынужденный, или лучше сказать, прежде совершеннаго въ кровь превращенія (*chylificatio*) отъ кровянаго потока, съ коимъ онъ недавно былъ смѣшанъ, яки отдѣленный; каковое мнѣніе кромѣ другихъ доказательствъ подтверждающъ какъ особливые качества принятыхъ внутрь смѣсей, не рѣдко примѣчаемые въ молокѣ кормилицъ, такъ и питательно-сочный видъ водянаго молока (*lact aquosum*),

ка-

(*) Senac Tr. du coeur. Vol. II. p. 276. ed. 2,

какое изпекаетъ изъ грудей во время беременности и скоро послѣ родовъ.

§. 562. Чтѣже до причины, для чего въ продолженіи питанія грудью молоко, сія нежнѣйшая пища младенца, часъ отъ часу дѣлается густѣе и шучнѣе; то кажется должно отнести ея по большей части къ пасочнымъ жиламъ, кои груди изобилуютъ, и копоры, чѣмъ болѣе и продолжительнѣе бываетъ испечение молока, тѣмъ болѣе всасываютъ въ себя сычороочныя части онаго и, возвращая ихъ кровяному попоку, способствуютъ отдѣленію молока и оное умножаютъ (§. 476).

§. 563. Ибо самое большее отдѣленіе молока бываетъ вскорѣ послѣ родовъ; далѣе же, когда мать сама кормитъ, поддерживается оно сосаніемъ младенца до трехъ мѣсяцевъ, пока мѣсячныя крои, коихъ въ время кормленія грудью не бываетъ (§. 547), опять возвращаясь. Однакожъ замѣчено, что молоко източали груди и у совершенно неурочныхъ дѣвицъ, новорожденныхъ младенцевъ обоего пола, и даже у мужчинъ (*),
рав-

(*) Rem. in Russiâ vulgarissimam esse asseritur in Commentar. Acad. Sc. Petropolit. Vol. III. p. 278. sq.

равно какъ и другихъ взрослыхъ сосце-
питающихъ мужескаго рода животныхъ.

§. 564. Изпеченіе молока произво-
дитъ его изобиліе, по причинѣ котора-
го не рѣдко оно само собою изтекаетъ;
болѣе же споспѣшествуетъ оному какъ
внѣшнее давленіе груди, такъ и сосаніе
младенца.



ОТДѢЛЕНІЕ XLIV.

*О зачатіи и беременности (de conceptione
et graviditate).*

§. 565. Теперь приступаемъ мы къ
шѣмъ дѣйсвіямъ, для которыхъ опи-
сываемые до сихъ поръ дѣшородные обо-
его пола члены устроены: то есть къ
зачатію и разпространенію человѣческаго
рода, въ изслѣдованіи коихъ такъ посту-
пить должно, чтобы сперва изложить
про-

(*) Я видѣлъ дѣвятилѣшняго козла
большаго и здороваго, у коего шесть
лѣтъ назадъ черезъ день по полуфунту
вкуснаго молока выдаивали, который
былъ очень сходенъ съ Лемнійскимъ коз-
ломъ, о которомъ тоже повѣствуетъ
Аристотель въ Естественной Исторіи,
L. III. p. 259. ed. Gu. Du Val.

простыя явленія, въ семь чудномъ и по-
чно божескомъ дѣйствіи примѣчаемыя;
а по томъ изъяснишь силы, коимъ ка-
жется должно приписывать происхожде-
ніе оныхъ явленій.

§. 566. И вопервыхъ заслуживаетъ
примѣчанія то, что для рода челове-
ческаго никакого, такъ какъ для множай-
шихъ изъ живошныхъ (а наипаче, есть-
ли не ошибаюсь, для пышающихъ
грудью, исключая человека,) никакого,
говорю, особеннаго неподожено времени
въ году для совокупленія (*); но всякое
время есть способно къ воспаленію въ
немъ любовной спраси.

§. 567. Почему, когда женщина
возмѣетъ совокупленіе съ мужчиною, и
оба равно внутреннимъ разгорячатся по-
бужденіемъ, матка какбы отъ воспали-
тельнаго (**), ежели не ошибаюсь,
нѣ-

(*) Nisi huc referre velis, quod primum in Sue-
cia observante Wargentino plurimi partus in
Septembrem incidere soleant, qui praecedenti
responderet Decembri. V. Swenslk. Vetensk. Acad.
Handlingar. a. 1767. Vol. XXVIII. p. 249 sq.

(**) Cf. bina Kuyschio visa exempla vterorum
muliebrium, post recentem impraegnationem dif-
fectorum.

нѣкоего разгораченія раздувшись и собственною жизнью (§. 538) возбуждвшись, поглощаетъ извергнутое въ нее мужское сѣмя (*), изливая при томъ и собственные свои мокроты (§. 543); причемъ вмѣстѣ и мажочныя трубы отвердѣваяшъ, и свои кружеву подобныя края къ смежнымъ яичникамъ присоединяющъ; изъ коихъ въ которомъ нибудь одно изъ

Alterum nempe aduersarior. anat. medico-chirug. Dec. I. tab. II. fig. 3. meretricis, a iuvene, statim post venereum cum ipsa complexum truckdatae.

Alterum thesauro anat. VI. p. 23 sq. tab. V. fig. 1. mulieris paucis horis gravidae et in adulterio a marito occisae.

(*) Разсуждая о стремленіи, съ каковымъ мужское сѣмя выбрасывается и машкою поглощается, и сколь малое онаго количество (что подниверждаютъ опыты, надъ живыми живописными чинимые) къ оплодороденію довольно, удобно можно разумѣть, что, что во многихъ преданіяхъ о женщинахъ повѣствуется, то естьъ что онѣ при неповрежденной дѣвственной плевѣ зачали, и что обыкновенно употребляется къ доказательству не знаю какого-то сѣменнаго пару (*aura feminalis*).

изъ Графѣевыхъ пузырьковъ, подобно созрѣвшему вереду, распрѣскивается, содержащая же въ немъ ссѣдающая прозрачная влага, будучи всосана чревнымъ усъемъ машочной трубы, переносится наконецъ въ самую полость матки.

§. 568. По изшествіи изъ яичника сея влаги, внѣшніе края распрѣснувшагося пузырька заключаются рубцемъ, а остающаяся послѣ шого сосудистая перепонка, заключавшая въ себѣ оное, превращается въ желтое шѣло (*) (*corpus luteum*), которое съ начала бываетъ также полымъ и, какъ кажется, наполненнымъ такъ называемою образовательною или ссѣдающеюся пасокою (*plastica lymphæ*), которая съ спеченіемъ времени перемѣняется въ мясистое ядро, окруженное толстою коркою, многими вѣтвями кровеносныхъ сосудовъ (**) снабженною.

В в

§. 569.

(*) Cf. Jo. Chph. Kuhlmanni observ. circa negot. generationis in ouibus factæ. Goetting. 1753. 7. c. f. æ.

(**) V. Gul. Hunter anat. uteri gravidi tab. XV. fig. 5. tab. XXIX. fig. 3. tab. XXXI. fig. 3.

§. 569. По учиненіи такимъ образомъ матки тяжелою, отверзшіе ея шей, а наипаче внутреннее, плотно замыкается (§. 535) такъ, что по природѣ никакого не остается мѣста вторичному въ оной зачатію (*superfoetatio*).

§. 570. Послѣ чего внутренность матки кажется обводится власно какъ бы воспалительною ссѣдающейсѣ пасоки коркою (§. 19), превращающеюся въ слабую и не состоящую Гунтерову (*) оболочку, копорую раздѣляющѣ на двѣ плевы (*membrana caduca*), то есть одну толстую, облекающую самую полость мат-

ки

(*) О произхожденіи сея перепонки, коея подробнѣйшимъ описаніемъ одолжены мы Г. Гунтеру, первый кажется хорошо говорилъ Арешей Конадокскій. *Vid de caus. et sign. morbor. diuturn. L. II. c. 11. p. 64 sq. ed. Boerh.*

Но послѣ возстановленія Анатоміи принялъ оную Фаллоній *observ. anat. p. 207.*

Est Chorion siue nude sic dictum, siue spongiosum, tomentosum, fungosum, filamentosum, reticulatum sequentis aevi auctorum inuolucrum membranaceum B. S. Albini &c..

Primam quantum noui eius iconem exhibuit Ruyschius thes. anat. V. tab. I. fig. 1. F. B. C. G.

ки, исключая устья маточныхъ трубъ и внутреннее отверстiе ея шеи (*): а другую, позже первой возражающуюся, которая по есть послѣ изображенiя яйца и вкорененiя его въ оппадающей оной перепонкѣ возражается и прочую поверхность яйца (- Таб. IV. фиг. 1. а - фиг. 2 -) облекаетъ, которую посему обыкновенно (**) называютъ восклоненною или завороченною Гунперовою перепонкою (*caduca reflexa Hunteri*).

§. 571. Самое же яичко (*ovulum*) хотя и прежде зародыша изображается, къ воспринятiю коего оно отъ природы определено ; однако жъ такъ, что едва начинается образованiе его прежде изшествiя двухъ недѣль по зачатiи плода (***).

В в 2

Ибо

(*) *Gul. Hunter l. c. tab. XXXIV. fig. 3-6.*

(**) *Cf. B. S. Albinus annotat. Acad. L. I. tab. III. fig. 1. e. Gul. Hunter l. c. tab. XXXIII. fig. 1-4.*

(***) Яичко, изображенное на 4 каршинѣ, я избралъ изъ множайшихъ такое, которое бы съ нѣжнымъ возрастомъ зародыша имѣло изящную красоту и неповрежденную цѣлость. По причинѣ же пространства цилиндрической банки, наполненной жидкостiю, въ которой оно

но-

Ибо я сомнѣваюсь, чтобы прежде сего времени были когда либо примѣ-

повѣшено, изображеніе онаго хопя въпрочемъ самое подробнѣйшее, однако большимъ преспавлено, нежели каковое есть самое яйцо, хопя внутрення его сорочка едва бо льшой горещинѣ равняется величиною. — Яичко сіе есть одной здоровой, при мѣсяца беременною бывшей, женщины, которая его по прекращеніи у нее въ первой разѣ мѣсячнаго кровосеченія нечаянно выкинула; почему кажется должно почищать оное перваго мѣсяца беременности.

По принесеніи его ко мнѣ съ великою осторожностію вскрылъ я оное, и какъ вѣшнюю сорочку прозрачною водицею, такъ и внутреннюю своею жидкостію исполненными примѣшилъ. Впрочемъ никакихъ слѣдовъ не нашелъ я ни пуповины, ни зародыша, пошому ли, что яичко оное не достигло еще времени составленія зародыша (да и сомнѣваюсь я, чтобы въ столь маломъ количествѣ уномянутой жидкости могло имѣть мѣсто изображеніе зародыша), или пошому, что оно было совершенно безплодное. Ибо думанъ, что находившійся въ немъ зародышекъ изчезъ отъ намоченія, не позволяющъ какъ цѣлостъ самаго яичка, такъ и неповрежденная и вездѣ гладкая внутренность его исподней сорочки.

мѣчены слѣды учинившагося зачатія.

§. 572. Состоитъ же яйцо оное, кромѣ внѣшняго покрова, взаимодействующаго имѣ опѣ слабой Гунтеровою плевы, изъ двухъ собственнѣхъ перепонокъ; по есть одной внѣшней, не имѣющей, какъ кажется, кровеносныхъ сосудовъ, которую нынѣшніе Сочинители внѣшнюю сорочкою (*) называютъ (chorion) (Таб. IV фиг. 1. с -), и которая внѣшняя поверхность сначала большею частію усѣяна бываетъ призрачными узловатыми волокнами (фиг. 1. в. - фиг. 2.), по каковой причинѣ и называли ее мшистою или вѣтвистоволонистою (chorion frondosum) сорочкою, коими волоконцами, составляющими нащипки имѣющаго быть зародышеваго мѣста, власно какъ бы нѣкоторыми корешками утверждается яйцо въ оппадающей, выше помянутой (§. 569),

В в 3

пле-

(*) Membrana media Rouhaulti, Halleri &c.

Cf. in uniuersum de variis oui tunicarum synonymis et homonymis Halleri elem. physiolog. Vol. VIII. P. I. p. 104 sq.

Et Tabarrani ep. ad Bartolinum in Atti di Siena T. VI. p. 224 sq.

плевѣ; а другой внутренней оболочки, водною внутреннею зародышевою плевою называемой (amnion фиг. 1. d.), лишенной также кровеносныхъ сосудовъ (ф. 5), которая хотя есть нѣжна и тонка; однако довольно плотна и крѣпка.

§. 573. Сии двѣ собственныя зародышеваго яйца оболочки, въ первыя недѣли послѣ его изображенія, въ разсужденіи ихъ величины весьма много различествуютъ между собою, такъ что внѣшняя плева представляетъ большой пузырь, съ коимъ внутренняя плева такъ какъ гораздо меньшій пузырекъ соединяется въ томъ только мѣстѣ, которое соотвѣтственно почти средопочію волокнистой поверхности внѣшней сорочки.

Прочее же между ими разстояніе наполняется кристаллоидною влагою, сомнительнаго происхожденія и недолгого пребыванія.

Ибо поелику внутренняя сорочка скорѣе получаетъ приращеніе свое, нежели верхняя, и въ первые мѣсяцы беременности (*) съ послѣднею нечувствитель-
тельно

(*) V. Hunteri figuras (imaginaras quidem) 1. c. tab. XXXIV. fig. 9. 8. 7.

шельно сближается; для того прозрачная влага она, по мѣрѣ таковаго плевѣ оныхъ сближенія, уничтожашься долженствуетъ.

§. 574. Внутренняя же перепонка яйца съ начала составленія своего (§. 570) даже до наступающихъ родовъ бываетъ наполнена влагою, то есть: водяною жидкостію желтоватаго цвѣта, почти никакого запаха не имѣющею, вкуса нѣжнаго и едва какую либо соленость имѣющею, которую вообще почищаютъ питательною влагою, яичному бѣлку подобною, съ которымъ однакожъ сколь много она не сходствуетъ, показываетъ испытаннѣйшее ея изслѣдованіе.

Источники жидкости сея и понынѣ подвержены сомнѣнію, коихъ не лзя относить ни къ зародышу, ни къ его пуповинѣ, пошому что она находится и въ неплодоносныхъ яйцахъ, (*ova subrupta*), которыя однакожъ ни одного изъ предупомянутыхъ существъ, то есть, ни зародыша, ни пуповины въ себѣ не содержатъ.

Количество оная содержишя въ соразмѣрности величины младенца: то
есть

есть шѣмѣ большее бываетъ, чѣмѣ менѣ находишь зародышѣ и на оборотѣ.

Что принявши въ разсужденіе, кажется легко можно догадываться о первѣйшей пользѣ сея жидкости, которая повидимому болѣе служишь къ охраненію нѣжнаго и какъ бы спудени подобнаго, и никакихъ наглостей внѣшнихъ не шерпящаго шѣла зародыша, нежели къ его питанію. Ибо что нѣкоторая часть влаги зародышевой внутренней сорочки, которую иногда (однакожѣ споль рѣдко, что по сему одному шаковое произшествіе противу природы случившимся почищать должно) видѣли вшедшею въ желудокѣ зародыша, никакѣ не опредѣлена къ его питанію, сіе легко усмотрѣшь можешѣ, кто шокмо предстаеншѣ себѣ, сколь недѣятельные, шощіе, къ пищепревращенію (chilificatio) неспособные, и зрѣнію почти не подлежащіе суть млеконосные сосуды даже въ зрѣлѣйшемѣ зародышѣ, не говоря уже о примѣрахъ (*) совершенно без-

(*) Миѣ кажется, что обыкновенныхъ оныхъ повѣствованій о такихъ зародышахъ, которые не имѣли никакихъ пуповинныхъ со-

безглавныхъ младенцевъ и другихъ такого же рода доказательствъ.

§. 575. Самый же зародышъ (embrio), висящій на пуповинѣ подобно какъ нѣкоторый плодъ на своемъ стебелькѣ, и плавающій въ описываемой до сихъ поръ жидкости, почти на четвертой недѣлѣ по зачатіи своемъ составляется начинаемъ (*); и впервыхъ показывается онъ подъ самопростишимъ кругловатымъ видомъ небольшой бобынки или почки, у коея мало по малу вырастаютъ конечности шѣла, по семъ изображается лице и такъ далѣ (**).

Г г

§. 576.

никакихъ пуповинныхъ сосудовъ, никто противопологать не станетъ, кто токмо приметъ ихъ хотя въ нѣкоторое разсужденіе.

(*) Выдуманныхъ оныхъ Г. Морыко, Керкринга и другихъ сочинителей преданій и изображеній одно - или нѣсколько - дневныхъ зародышей теперь отвергать не нужно.

(*) Adeant, quibus non ipsa eiusmodi humanae speciei fragilia primordia ad manus sunt, icones curatas in Ruyschii thesaur. anatom. VI tab. II. fig. 2. 3. 4. 5. 8. 10. thesaur. X tab. III. fig. 1.

It.

§. 576. Женщина по природѣ есть однородна (unipara) и зачинаетъ въ употребѣ по одному только плоду. Однакожъ не рѣдко рождаетъ она и двойни (gemelli), коихъ число къ оди-
накимъ родамъ, по выкладкѣ Г. Зишмиль-
хія, такъ содержишся, какъ 1 : 70 (*),
и изъ коихъ каждый по большей ча-
сти имѣетъ собственную внутреннюю
сорочку, внѣшняя же есть обоимъ общая (**).

§ 577.

It. B. S. Albinī annotat. anatom. L. I. tab
V. fig. 4. 5.

Trew in commerc. litter. Norico a. 1739.
tab. III. fig. 4. 5.

Abr. Vateri mus. anatom. propr. tab. VIII.
2. 4.

(*) Verum ut in vniuersum haec ratio non adeo
constans dicenda est; ita & gentilitia varietas
eandem intercedere videtur.

Raritatem gemellorum apud Grönlandos ex-
presse notat Eggede in descr. du Grönland p 112.

Memorabilis e contrario eorum apud Hibernos,
ubi ad singulorum partus se habent fere ut 1 :
53. v. (Rich. Twiss) tour in Ireland pag. 18.

(**) Весьма рѣдко случается, чтобы двойни
въ одной внутренней сорочкѣ содержа-
лись. V. Jac. de Puyl in Verhandl. der
Genoösch. te Vlissingen T. IX. [p. 423 sq. 4.

§. 577. Посредство , коимъ соблюдается взаимное между младенцемъ и матерью сообщеніе, есть пуповина и послѣдъ или мѣсто (placenta), на которое пуповина раздѣляется.

§. 578. Пуповина (funiculus umbilicalis), которая кажется быть современною (coævus) самому зародышу, премногоразлична бываетъ какъ въ разсужденіи длины, такъ и толщоты, равно какъ и соединенія съ мѣстомъ, своихъ жилонпряженій и проч. Вообще однакожъ состоитъ она изъ трехъ, кровеносныхъ сосудовъ, свитыхъ на подобіе улишки, то есть: изъ крововозвратной, къ печени проспирающей, и двухъ біющихъ жилъ, отъ внутреннихъ подвздошныхъ или подчревныхъ происходящихъ, которыя раздѣляются между клѣшечными различнаго направленія средостѣніями (septum) (*), а внутри повсюду соединяются узлами, или какъ бы нѣкими заслоночками, Гобокеніевыми именуемыми (**), (valvulae Hobokejanæ); въ пуповину же или

Г г 2

пу-

(*) Guil Noortwyk uteri hum. gravidi anat. Tab. III. fig. 5. 6. 7.

(**) Hoboken anat. secundinae hum. repetita 522 sq. fig. 38. 39. 40.

пупочный канатикъ сосуды сїи соединяются посредствомъ клѣпчатой плевы, которая, будучи наполнена особенно весьма прозрачною влагою, представляетъ видъ студени, и извнѣ облекается продолжающеюся внутреннею оболочкою яйца.

§. 579. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ соединяется пуповина съ зародышемъ, возникаетъ изъ дна мочевого пузыря (§. 486) такъ называемый мочевой зародышевый каналъ (*) (urachus), и проникаетъ въ средину пуповины между ея бѣющихъ жилъ, который въ человѣкѣ по крайней мѣрѣ не далеко проходимымъ бываетъ и вскорѣ весь исчезаетъ; въ другихъ же питающихъ грудью животныхъ простирается онъ къ похожей на кишку оболочкѣ (**) (allantois), между верхнею и
внут-

Eiusmodi fabricam ulterius in ipsis placentae ramis ornauit cl. Aug. Chr. Reuss. cf. Ej nov. observ. circa structur. vasor. in placenta hum. Tubing. 1784. 4.

(*) Jo. Noreen de uracho. Goetting. 1749 4.
Cl. Ph. Ad. Boehmer de eodem, ad calcem anatomes oui hum. foecund. sed deformis. Hal. 1763. 4.

(**) Cf. Fabr Ab Aquapendente de formato factu tab. XII. XIII. XIV. XVII. fig. 37. XXV.

внутреннюю плевами находящейся, котораго, какъ извѣстно, человѣческій зародышъ во все не имѣетъ; развѣ опнестн сюды оный сомнѣнїю подлежащїй и скоро исчезающїй пупочный пузырь (vesicula umbilicalis), въ человѣческихъ яйцахъ между нижнею и верхнею зародышевыми оболочками не однократно видѣнный, который, естли не ошибаюсь, первый еще за долго до Албина (*) и Зиннїя (**) примѣшилъ Избредъ Діемерброкъ (***). Въ недавнїя же времена часто и въ очень постоянномъ видѣ въ плодоносныхъ человѣческихъ яичкахъ даже на прѣшемъ мѣсяцѣ по зачатїи видѣнъ былъ, который, судя по его случайному устройству, можно принять либо за болѣзненное, либо уродливое явленїе.

б. 580. Кровоносные, вышепомянутые, пупочные сосуды вселяются въ младенческое мѣсто(****), о происхожденїи коего и въшвислой поверхности верхней

Г г 3

заро-

(*) Annotat. Acad. L. I. tab. I. fig. 12.

(**) Epist. ad Haller. scriptar. Vol. IV. p. 195.

(***) Anat. corp. hum. p. 263. ed. 1679.

(****) Eustachii tab. XIV. fig. 5. 6.

зародышевой оболочки, углубляющейся въ толстой опадающей оболочкѣ, выше сего упомянуто; откуда разумѣются и тѣ сугубыя существа, изъ коихъ, какъ извѣстно, составлено мѣсто; то есть одно маточное, отъ опадающей Гунтеровоѣ оболочки происходящее и составляющее губчатое его сплетеніе, а другое зародышевое, которое то есть происходитъ отъ пупочныхъ сосудовъ, раздѣленныхъ по верхней оболочкѣ зародышевой. Умноженіе же нѣжнаго яичка для того не скоро совершается, чтобы болѣе и скорѣе умножалась гладкая часть, нежели волокнистая внѣшней сорочки; а по сему и содержаніе младенческаго мѣста къ окружности яйца было тѣмъ большее, чѣмъ ближе зародышъ къ зачатію своему, и на оборотъ тѣмъ меньшее, чѣмъ ближе бываетъ младенецъ къ рожденію на свѣтъ. Но въ продолженіи беременности мѣсто сіе становится менѣе и плотнѣе; оно съ наружной стороны, обращенной къ маткѣ, бороздчато и мочковато или бугорбовато (*fulcata et lobata*), а съ внутренней къ младенцу, гдѣ оно облечено внутреннею зародышевою плевою, гладко. Великою, толщиною, видомъ и мѣстомъ соединенія съ маткою премного-раз-

различно, по большей однакожъ части бываетъ соединено съ дномъ матки, и вовсе лишено какъ чувствительности, (§. 204), такъ и наслоящей раздражительности (§. 306).

§. 581. А хотя всѣ въ томъ согласны, что мѣсто есть первое орудіе, помощію коего питается младенецъ; однакожъ о почномъ способѣ его дѣйствованія и взаимномъ отношеніи, какъ къ маткѣ, такъ и къ младенцу, въ нынѣшнія времена разнообразно разсуждаемо было. По испытнѣйшемъ же разсмотрѣніи всего дѣла кажется никакого взаимнаго соединенія между кровеносными сосудами матки и пуповины не находяща, но боевожильная матерняя кровь непрерывною стезею изъ матки въ ту часть мѣста, что опѣ Гунперовой плевы производящъ, проникаетъ, а потомъ крайними конечностями пупочныхъ сосудовъ, въ волокнистую часть верхней сорочки вселяющихся, опять вбирается и въ крововозвратную пупочную жилу относится: возвращаясь же изъ младенца чрезъ бѣущіяся пупочныя жилы, подобнымъ образомъ изливается въ нозревающее мѣста сплешеніе, вбирается возвра-

щательными жилами и сообщается
маткѣ.

Сему соотвѣствуютъ съ прееликою
осторожностію, однакожъ не безъ успѣ-
ха, учиненныя наливанія пупочныхъ со-
судовъ чрезъ пуповину; также и то,
что сказано о различіи, коимъ бѣенія
жилъ роженицы и младенца, еще отъ
нея не оприновеннаго, сличающ-
ся между собою; соотвѣствуетъ се-
му также и то, что говорено было
(§. 146) о различномъ свойствѣ матер-
ней и зародышевой крови, снесшись съ при-
мѣчаніемъ, на страницѣ 163 учиненномъ.
Кромѣ сего вѣроятно, что часть матер-
няго питательнаго сока съ кровію пере-
носится въ зародыша. Ибо кромѣ того,
что матерняя кровь не всегда бываетъ
цѣльна и одинакова, но спустя нѣсколь-
ко часовъ по принятіи пищи содержитъ
въ себѣ недавно соединившійся съ нею
и еще не превратившійся въ кровь пи-
тательный сокъ, и съ нимъ кругообра-
щается въ жилахъ. Еще выше доказано
(§. 550 и 553), что матка имѣетъ особли-
вое (affinitas) сродство съ питательнымъ со-
комъ и молокомъ; да и многочисленныя
находятся наблюденія, по коимъ усмо-
трѣн-

прѣнно неоднократное пребываніе млечнаго соку въ мѣстѣ мланденческомъ (*).

§. 582. Отсюда само по себѣ разумѣется, что въ печеніи беременности, когда по есть младенецъ и мѣсто его получающъ шолікое приращеніе, и самая матка должна претерпѣвать великія перемѣны; кошорыя кромѣ ея умноженія относяся до ея мѣстоположенія и вида, а наипаче до ея устройства; пошому что матка ошъ непрестаннаго и великаго въ ней скопленія влагъ, каковое обыкновенно претерпѣваетъ она по оплодородженіи, какъ относительно до кровеносныхъ сосудовъ, шакъ и ея ноздреватаго переплетенія (*textus spongiosus*), гесьма много перемѣняется. Ибо чѣмъ больше разумножается матка, шѣмъ болѣе ея сосуды изъ излучисныхъ прямыми (**), изъ узкихъ про-

Г г 5

спирак-

(*) Отсюда нѣкоторые сочинители заключающъ, что зародышъ питается больше млечнымъ питательнымъ сокомъ своей матери, нежели ея кровію. Cf. Abr. Brill. obs. de humore lacteo in placenta humana. Groning. 1768. 8.

(**) V. Gul. Hunter anat. uteri gravidi tab. XVI.

спранными учиняются; крововозвратныя же жилы въ продолженіи беременности учиняются такъ широкими (*), что нѣкоторые Анаптомики не справедливо почитали ихъ за нѣкія пазухи (sinus). — Самое же матки переплещеніе часъ отъ часу становившя рѣже и слабѣе (**). А наипаче со стороны, обращенной къ содержимому въ ней яйцу, такъ что хопя непраздная матка и толста бываетъ, а особливо въ днѣ, и въ живой и здоровой женщинѣ наполнена кровію, и снабжена жизненною силою; однакожъ вмѣстѣ и мягкою обрѣщается, и видомъ своимъ, а особливо въ мершвомъ тѣлѣ, гдѣ она, (какъ давно о семъ не несправедливо утверждалъ Аранцій) въ продолженіи беременности какъ бы изъ слоевъ или пластинокъ состоящее успроеніе (***) представляетъ, премою отличается отъ сжатого и плоскаго тѣла приздныя матки.

Про-

(*) Ibid. tab. XVIII.

(**) Cf. B. S. Albini annotat. Acad. L. II. tab. III. fig. 2.

(***) Arantii de humano foetu libellus p. 5. fq. ed. 1579. Cf. B. S. Albini tab. vteri gravidi. II.

Прочія важнѣйшія перемѣны непраздной матки купно съ тѣми, которыя случаются съ яйцомъ и содержимымъ въ немъ зародышемъ, можно кратко изъяснить изъ порядка девяти мѣсяцовъ лунныхъ, по коимъ нынѣ щипаютъ продолженіе беременности.

§. 583. Выше сего (§. 567) видѣли мы, что матка какъ въ скоромъ времени по зачатіи раздувается и возрастаетъ, такъ съ того же самого времени, учинившись болѣе и тяжелѣе, опускается нѣсколько глубже въ верхнюю часть влагалища своего, сохраняя впрочемъ въ первые три мѣсяца прежнее свое начертаніе, исключая то, что дно ея нѣсколько возвышеннѣе и выпуклѣе становится, а передняя стѣна ея тѣла отъ задней отдаляется, внутренность же оная, бывшая доселѣ весьма тѣсною и почти треугольною, въ сіе время учиняется круглою, очертаніе яйца имѣющею.

Самое же яйцо, которое въ концѣ перваго мѣсяца беременности бываетъ величиною съ голубиное яйцо, и обѣ опадающія оболочки, равно какъ и малую внутреннюю сорочку отъ большой верхней между собою отдаленными имѣетъ, при истеченіи претѣяго мѣсяца, равняется

ся величиною почти гусиному яйцу, и опадывающая восклоненная оболочка съ толстою, а внушренная водная со внѣшней оболочкою весьма много сближаются; самое же яйцо бываетъ наполнено великимъ количествомъ влаги, въ копорой нѣжнѣйшій и самомалѣйшій въ сравненіи съ оною влагою зародышъ (ибо онъ въ сіе время едва равняется величиною маленькой мышѣ), хопя по сихъ поръ спремглавъ (*) находится, однакожъ кажется не въ твердомъ и постоянномъ положеніи обрѣщается.

§. 584. Въ началѣ пятаго мѣсяца матка получаетъ видъ болѣе круглый, и по размягченіи и поспешенномъ укороченіи и какъ бы уничтоженіи, или лучше сказать, по растяженіи въ стороны своей шем, паки воздымается и изъ меньшаго шаза начинаетъ возникать въ большій. Въ каковое время и самыя трубы съ сводоподобнымъ дномъ матки вверхъ простираются, растягиваются и учиняются долѣе; ибо столь шѣсно совокуплены онѣ съ боками матки, что отъ

(*) Cf. v. Doevegen Specim. observat. Academ. p. 104 sq.

отъ нихъ уклоняющся только на срединѣ своей длины, и естли поверхностно на нихъ глядѣть, то кажется, что онѣ выходятъ изъ середины матки; что самое и подало случай къ погрѣшительнымъ мнѣніямъ о великомъ умноженіи дна маточнаго.

Съ того же самого времени младенецъ возрастаетъ до такой величины, которая бываетъ больше соразмѣрна вмѣстимости (*saracitas*) яйца, и тогда получаетъ онъ гораздо швердѣйшее и постояннѣйшее положеніе, которое соблюдаетъ даже до наступленія родинъ, то есть имѣя голову восклоненную, а лице обращенное къ матерней поясницѣ и при томъ, что и чаще случается, нѣсколько косвеннѣе къ лѣвому боку.

§. 585. Въ половинѣ беременности, что бываетъ въ концѣ пятаго мѣсяца, матка возрастаетъ до такой величины, что дно ея находится почти въ срединѣ между лунною костью и пупомъ, и самая беременность примѣчается уже по внѣшнему виду живота.

Съ того обыкновенно времени и младенецъ учиняется чувствительнѣе для матери движеніемъ своего шѣла; хотя впрочемъ и ничего точнаго не лзя положишь

о времени сего явленія. Однакожъ не взирая на то, младенецъ въ сіе время бываетъ крѣпче и дѣятельнѣе, такъ что по обыкновенному нарѣчію можно уже называть его живымъ (*vitalis*).

§. 586. Въ прочіе пять лунные мѣсяца матка съ содержимымъ въ ней младенцемъ, получая большее приращеніе, на шестомъ мѣсяцѣ дномъ своимъ почти пупа касается; съ осьматого же мѣсяца болѣе и болѣе воздымаясь, приближается къ самой ложинкѣ грудной, при чемъ ея шея отчасу болѣе изглаживается, уравнивается и утончается.

§. 587. Наконецъ на десятомъ мѣсяцѣ матка, будучи какъ бы обременена своею величиною (ибо въ то время ось ея длины до 11 унцій; а поперешникъ до 9 и больше простирается) паки опускается начинаетъ, и ея отверзтіе при наступленіи родовъ мало по малу открывается и кругловиднымъ своимъ зѣяетъ устьемъ.

Объ оппадающія перепонки, а наипаче восклоненная, съ верхнею сорочкою соединяющаяся, задолго назадъ будучи утончены, въ сіе время представляютъ какъ бы сѣшоподобный видъ, корот-

кими

жими бѣловатыми волокнами испещренный. (*)

Чшожъ до величины младенческаго мѣста; шо оно въ сіе время бываетъ таково, что большій его поперешникъ равняется 9 пи унціямъ, толщина 1 унціи, а шяжестъ до фунта и болѣе простирается; долготы по большей части пштовина имѣетъ 18 унцій и болѣе.

Зрѣлый здоровый младенецъ имѣетъ вѣсу почти 7 мъ фуншовъ, а длины по малой мѣрѣ 20 ть унцій.

Наконецъ количество жидкости зародышевыхъ сорочекъ бываетъ столь различно, что во все ничего опредѣленнаго въ разсужденіи онаго положить не можно; однакожъ чаще, когда шо есть младенецъ находится крѣпокъ, почти съ фунтъ оныя бываетъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XLV.

О образовательной силѣ (*de vi formativa*).

§. 583. Изъяснивши простымъ образомъ явленія, при зачатіи случающіяся.

(*) Cf. de vario habitu, quem decidua altero graviditatis dimidio prae se fert Gul. Hunter anat. vteri gravidi tab. XXIV. fig. 3. 4. tab. XXIX. fig. 4. 5, collata tab. XXIX fig. 2.

щіяся, также и все то, что по вѣрнѣйшимъ наблюденіямъ въ теченіи беременности случается какъ съ яйцомъ человѣческимъ, такъ и съ самымъ содержимымъ въ немъ зародышемъ; теперь приступаю къ изслѣдованію тѣхъ силъ, дѣйствіемъ которыхъ кажется все удивительное дѣйствіе родотворенія совершается.

§. 589. Нѣкоторые знатные мужи, а наипаче въ наши времена, въ изслѣдованіи дѣйствія онаго думали краткими изъясниться словами, то есть отрицая всякое родотвореніе, и напрошивъ того утверждая, что якобы весь родъ человѣческой въ дѣшродныхъ частяхъ одного изъ прародишелей въ видѣ предъизображенныхъ прозябеній или зародышей совокупно находился, и прозябенія оныя съ теченіемъ времени мало по малу шокмо развертываются (*evolvuntur modo*).

Въ томъ шокмо имѣя несогласіе, что одни изъ нихъ полагали прозябенія оныя или зародышей въ опеческихъ сѣменныхъ (*) животныхъ, (*animalcula spermatica*), другіе напро-

(*) Cf. W. v. Gleichen I. c.

напрощивъ того утверждали, что они находясь въ матернихъ яичникахъ (*).

§. 590. Последняго мнѣнія хотя нѣкогда и я самъ придерживался, какъ за недоспашкомъ другого, которое бы болѣе удовлетворяло любопытству моему,

Да

шакъ

(*) Такъ Г. Галлеръ откровенно утверждалъ, что всѣ внутренности и самыя кости будущаго зародыша, но почти жидкаго, а посему невидимыя, давно до зачатія онаго въ матернихъ прозябеніяхъ предъизображенными находились. —

Къ подтвержденію котораго положенія употреблялъ онъ продолженіе перепонки и кровеносныхъ сосудовъ между насиживаемымъ цыпленкомъ и желткомъ его яичка. Vid. Ej. opera minora T. II. p. 418. lq.

Однакожъ я, чѣмъ чаще изслѣдовалъ явленія насиженного яйца, тѣмъ больше узналъ, что доказательство оное не имѣетъ никакой швердости. Да и не могу я довольно надивиться, почему Г. Галлеръ свиваніе (*involutio*) сосудовъ цыпленковыхъ съ сосудами желтковыми, шакъ какъ несправедливое отринутьмогъ.

Когда однакожъ въ соединеніи яичка человѣческаго съ оплодородженною машкою совсѣмъ подобное свиваніе принялъ и подтвердилъ!

Cf. Ej. elementa physiol. (ed. Lauffer 1772) T. VIII. p. I. p. 95. collata. p. 257

такъ и потому, что я былъ убѣжденъ
знашностію и важностію его защитни-
ковъ; но теперь принужденнымъ себя на-
хожу оное оставить и признаться въ соб-
ственныхъ моихъ погрѣшностяхъ и оныя
исправить, когда по испытнѣйшемъ изслѣ-
дованіи явленій, въ родопвореніи происходя-
щихъ, самую убѣжденъ природою, что оное
со всѣмъ другимъ образомъ совершается.

§. 591. Ибо я со дня на день болѣе
и болѣе удостовѣряюсь въ томъ, что во
всѣхъ органическихъ или членосоставлен-
ныхъ тѣлахъ, жизнию одаренныхъ, на-
ходишся особенная сила, имъ врожден-
ная, и безпрестанно, доколѣ оныя живутъ,
дѣйствующая, опредѣленной имъ видъ
при первомъ дѣйствіи рожденія достав-
ляющая; по томъ дѣйствіемъ питанія
непрестанно оной сохраняющая, и еже-
ли по какому либо случаю получаютъ
ущербъ, сколько возможно помощію воз-
рожденія паки возстановляющая; копо-
рую силу, чтобы не смѣшать съ други-
ми родами жизненной силы, можно на-
звать (*) изобразительнымъ спремле-
ніемъ

(*) Adeant, quorum, interest differentiam nifus
formativi a vi plastica veterum, aut a vi essen-
tiali cl. Wolffii vno quasi conspectu intuendi,
scriptum über d. Bildungstrieb. p. 13-17.

нїемъ или силою образовательною (*plūs formativus*), каковымъ именемъ разсудилось (*) мнѣ называть не столько причину, сколько нѣкоторое непрерывное и всегда себѣ подобное дѣйствіе, изъ опытовъ, то есть постоянства и повсеместности явленій выводимое, въ такомъ же почти разумѣ, въ какомъ употребляемъ мы слово приращенія къ означенію нѣкоторыхъ силъ, коихъ однакожъ причины также непроницаемымъ покрыты мракомъ (*tenebræ cimmeriæ*).

§. 592. Почему самовѣроящійшимъ кажется для меня быть то, что разнымъ онимъ обоего пола внутреннимъ влагамъ (§. 518. 554. 542. 543.), о которыхъ извѣстно, что онѣ во время плодоноснаго совокупленія смѣшиваются въ полости матки, сперва потребно определенное время, въ которое бы онѣ внутреннѣе смѣшались, переработались и созрѣли; по прошествіи же времени онаго прѣуголовленія

Д д 2

въ

(*) Такимъ образомъ Невтонъ quæst. ad celsæ optices р. 380. — о приращеніи говоритъ; я желалъ бы, чтобы слово приращенія въ такомъ смыслѣ принималъ, дабы токмо чрезъ оное разумѣть нѣкоторую силу, по которой шѣла взаимно другъ къ другу стремятся, и которую бы силу почитать причиною сего явленія.

въ созрѣвшихъ уже и весьма хорошо смѣ-
шенныхъ между собою влагахъ оныхъ
необходимо образовательное стремленіе,
дѣйствіемъ котораго до сихъ поръ без-
образное сѣменное вещество частію въ пре-
красныя плевы вышепомянушаго яичка
(§. 571), частію въ видѣ содержимаго
въ нихъ зародыша превращалось бы и ожи-
влялось; и что таже самая причина
тому, для чего и съ помощію діоп-
трическихъ орудій (до тоголикаго превос-
ходства нынѣ доведенныхъ) въ первыя
недѣли беременности кромѣ безобразныхъ
влагъ, содержимыхъ въ маткѣ, ни
малѣйшаго слѣда уже изображеннаго за-
родыша распознать не можно, который
однакожъ зародышъ на прѣшей недѣлѣ
почти нечаянно и при томъ въ довольно-
величинѣ показывается.

§. 593. Дальнѣйшіе слѣды тако-
ваго образовательнаго стремленія ви-
димъ мы во всей природѣ, и даже въ са-
мыхъ простыхъ вещественныхъ нача-
лахъ, о существованіи въ коихъ предъ-
изображенныхъ зарожденій ниже помы-
слишь можно. Ибо и облака принима-
ющіе извѣстные виды (*), и электриче-
скій

(*) Cf. Müller in Göttingen. Magaz. I. p. I.
p. 38. sq.

скій огонь представляетъ опредѣленные изображенія (*). Далѣе и въ царствѣ ископаемыхъ находясь примѣры мешаллическихъ хрусталей, которыя, елики только воззрѣшь на ихъ видъ, жизни же не приписывать имъ, удивительнымъ образомъ походятъ на нѣкоторыя органическія тѣла; къ подтвержденію чего довольно представить расплюснкой и въ первой разъ въ хрустали приведенной желтой мѣди (*aureum*), либо топъ прекрасный видъ Перуанскаго серебра, которое по изображеніи его называютъ папоротничнымъ, то есть походящимъ на папоротнымъ (*aureum filicinum*).

§. 594. Далѣе оба царства органическихъ или членустроенныхъ тѣлъ, то есть животныхъ и растѣній, представляютъ примѣры тѣлъ такихъ, которыя съ довольно явственною величиною имѣютъ весьма ощутительную прозрачность и столь екорое распространеніе, что оное весьма ясно примѣшшь можно, и удостовѣриться о несуществованіи какихъ либо предвизо-

Д д 3

обра-

(**) Cl. Lichtenberg in nov. Commentar. Soc. Scientiar. Goetting. Vol. VIII. et Commentariou. eiusd. Societatis Vol. I.

ображенныхъ зарожденій. Изъ числа коихъ довольно представить изъ распенія поросль (*conferva fontinalis* (*)), а изъ животныхъ зеленую гидру (**) *hydra viridis*.

§. 595. Я бы преступилъ черту моихъ наставленій, естлибъ захотѣлъ обширнѣе представлять доводы, изъ самой природы почерпаемые, коими, естли не ошибаюсь, могущество образовательной силы въ дѣйстви родошворенія или рожденія, наивѣроятнѣе учиняется (***). Однакожъ за благо разсудилось мнѣ нѣкоторыя токмо изъ нихъ самократчайше предложить, коихъ сила изъ обстоятельнѣйшаго размышленія удобно откроется.

§. 596. Сюда числю я на пр. изъ повѣствованія о ублюдкахъ (*hybridorum historia*) шотъ достопамятный опытъ, по которому явствуетъ, что въ плодоносныхъ ублюдкахъ чрезъ многія рожденія частымъ оныхъ оплодородженіемъ, помощію мужескаго сѣмени того же вида, отъ первоначальнаго матерняго вида

НОВОЕ

(*) Göttingisch. Magaz. ann. II. p. I. pag. 80. tab. II. fig. II. III.

(**) Über den Bildungstrieb. p. 9 sq.

(***) Plura earum uberius exposui in Commentarior. Soc. Scientiar. Goettingenf. Vol. VIII.

новое начертаніе правнучатыхъ ублюдковъ мало по малу споль много уклоняется, что получаетъ образъ опца другаго вида, и такимъ наконецъ образомъ какъ бы самопроизвольнымъ превращеніемъ перемѣняется въ оный (*).

§. 597. Подобнымъ образомъ изъ замѣчаній объ уродахъ (*monstra*) достойно упомянуть о томъ извѣстномъ явленіи, по которому явствуетъ, что уроды, (которые по утвержденію защитниковъ развершыванія (*evolutio*) почти всѣ еще при первомъ мірозданіи въ самыхъ сѣменахъ подъ видомъ такого уродливаго устройства скрывались), между нѣкоторыми видами ручныхъ или домашнихъ животныхъ, а наипаче между свиньями, очень часто, напрошивъ того между дикими касателью ихъ первоначальной разности, весьма рѣдко случаются.

§. 598. Заслуживаетъ также примѣчанія и то, что не только природныя уродливости (*monstrositates*), но и случайныя лишенія членовъ (*mutilationes*) и другія обезображенія (*deformitates*), по случаю,

или

(*) Cl. Kölreuter dritte Fortsetz. der vorläuf. Nachr. p. 51 sq.

или съ намѣреніемъ шѣлу причиненныя, часто учиняющіяся наслѣдственными (*hereditariae*) такъ, что должно сказать (*), что то, что прежде было произведеніемъ искусства, наконецъ нечувствительнымъ образомъ какъ бы въ другую обращается природу.

§. 599. Что принадлежитъ до явленийъ возрожденія или новаго произращенія (*reproductio*); то вообще лучше можно отнести ихъ къ образовательному стремленію, нежели къ предсуществованію какихъ либо частныхъ зарожденій; такимъ образомъ, а особливо нѣкоторыя изъ нихъ, на пр. ногти, которые по лишеніи перваго ряду перстовъ на среднемъ къ нему ближайшемъ паки выросли (**), кажутся другимъ образомъ рѣшены быть не могутъ.

§. 600. Видимъ также, что и членосоставленныя или органическія части, совсѣмъ противъ порядка природы, при-
 КЛЮ-

(*) *Plura id genus exempla exhibui l. c. anfam phaebente celebri apud Hippocratem de aëre, aquis et locis relatione de macrocephalorum ad Pontum Euxinum craniorum forma quondam arte efficta, temporis vero progressu connata et hereditaria.*

(**) *V. Tulpii observat. medic. L. IV. c. 55.*

ключеніемъ нечаянной болѣзни и силою врачующей природы вырастаютъ тамъ; гдѣ о предсуществованіи первоначальныхъ сѣмянъ ниже помыслить можно; куды на пр. должно относить Ворміевы кисточки (*officula Wormiana*), которыя въ водяной головной болѣзни (*hydrocephalus*) для наполненія зѣяній, между костями черепными находящихся, вырастаютъ.

§. 601. Все же сіе съ обѣихъ сторонъ надлежаще сообразивши и безпристрастно разсмотрѣвши, удобно видѣть можно, что и сами защитники предзароденій мужескому сѣмени кромѣ возбудишельнаго могущества, которое они ему приписываютъ, должны также приписывать и образовательныя силы, и защищаемое ими ученіе о назначеніи зародышей должно почерпнуть пособія свои въ образовательномъ стремленіи, а сіе напротивъ того безъ всякой помощи назначенныхъ зародышей довольно быть къ исполкованію явленій произрожденія. И по сему не должно, безъ нужды какъ говорятъ, размножать существъ.



ОТДѢЛЕНІЕ XLVI.

О родахъ и ихъ слѣдствіяхъ (*de partu eiusque sequelis*).

§. 602. Плодъ или младенецъ по образованіи дѣйствіемъ до сихъ мѣстъ описываемыхъ силъ, по совершенномъ составленіи и устроеніи своемъ, достигнувъ предѣла своей зрѣлости, долженъ наконецъ посредствомъ родовъ (*) произойти на свѣтъ.

§. 603. Уреченное же оное время родовъ, по обыкновенному природы учрежденію, изслѣдованіемъ коего все Естествословіе занимается, приходитъ въ концѣ десятаго луннаго мѣсяца ш. е. почти на 39 или 40 недѣль по зачатіи.

§. 604. Каковаго времени достигнувъ беременная женщина, совершенною необходимостію понуждается къ родамъ, о которыхъ индѣ упомянуто, что они менѣ всякаго другаго направленія тѣла челоувѣческаго подлежатъ дѣйстію воли (*arbitrium voluntatis*) (§. 294).

§. 605.

(*) Jo. Jac. Römer *partus naturalis brevis expositio*. Goetting. 1786. 8.

§. 605. О причинахъ столь постоянной и незапной переменны разнообразно рассуждали Естествоисловы. Однако ежели все подробно разобрать, покажется, что побудительную причину родовъ должно опираться къ непреложному узаконенію природы, но которое столько же есть неудобно къ изъясненію, какъ и другія таковаго же рода множайшія урочныя явленія, каковыя на пр. суть: преобращеніе насѣкомыхъ (*metamorphosis*), печеніе временъ въ горячкахъ съ пятнами, переломы болѣзней (*crises*) и проч. почему не неблагоприсойно нѣкоторые сравнивали созрѣвшее яйцо человѣческое съ спѣлымъ плодомъ какого либо растенія, который, достигнувъ надлежащей зрѣлости, по сжатіи сосудовъ, его питавшихъ, наконецъ самъ собою спадаетъ съ древа. Притомъ замѣчено было, что младенческое человѣческое мѣсто при наступленіи родинъ мало по малу стягивается, и такимъ образомъ какъ бы прѣупотвляеися къ совершенному въ скоромъ времени отдѣленію отъ матки.

Ибо все, что токмо ни говорится о великомъ разширеніи матки и другихъ

гихъ побужденійхъ къ родамъ, кромѣ прочихъ доказательствъ, опровергается многжайшими примѣрами, а именно мапочныхъ зачатій, по естѣ въ Фаллоніевыхъ шрубкахъ и яичникахъ, по копорымъ примѣчено, (*) что и праздная машка, по прошествіи десяти мѣсяцевъ по чрезъестественномъ ономъ зачатіи обыкновенными, хопя впрочемъ и бездѣйствительными, напугами (dolores) была побуждаема къ разрѣшенію своему.

§. 606. Впрочемъ само по себѣ разумѣется, что кромѣ сея возбуждающія причины, судя по состоянію младенца и мапочнаго его вмѣстилища, потребны еще и другія сильнѣйшія дѣйствующія причины.

Касательно чего я твердо думаю, что ближайшую и единственную изъ нихъ причину должно относить къ собственной жизни машки (§. 447).

Изъ дальнѣйшихъ же кажется первое мѣсто имѣющъ по напряженія, про-

ИЗВО-

(*) Nuperum istiusmodi exemplum retuli in Commentar. Soc. Scient. Goettingens. Vol. VIII.

изводимыя дыханіемъ, по связь (*) междуреберной съ прочими чувствительными жилами.

§. 607. Чтожъ до явленій возбужденныхъ родовъ; то они, судя по наступленію и продолженію (**) оныхъ, обыкновенно сохраняютъ предуставленный порядокъ. Почему отъ повивальныхъ Врачей и раздѣлены на поприща (stadia), коихъ нынѣшніе Врачи пославляютъ четыре.

§. 608. Первое, въ которое напуги (dolores) или перехваты совсѣмъ особливаго свойства и постепеннаго направленія отъ поясницы къ нижнимъ частямъ матки, (хотя и все теченіе родовъ по разстояніямъ, но не съ одинакою силою и учащеніемъ сопровождающія) сперва легче понимаютъ родильницу; въ которое время называются онѣ предъшественными (praefigientes), коими устье матки разширяется начинаетъ. При чемъ вмѣстѣ опадаетъ животъ, беспокоитъ моча, и изпекаетъ немалое количество слиз-

Е е 3

кой

(*) V. cl. Camperi demonstrat. anat. patholog. L. II. pag. 9.

(**) Cf. Smellie's Set of anatomical Tables Tab. XI-XV.

кой мокроты изъ слабораздупныхъ дѣшородныхъ частей.

§. 609. Второе , въ которое умноженіемъ напугъ или болѣзней, пріуготовительными называемыхъ (*præparantes*), выпуклая часть яичныхъ плевъ изъ отверзтія матки вынуждается въ ея рукавъ.

§. 610. Въ третіе поприще умножающіяся мученія и болѣзни , въ которое время называются онѣ напугами при самыхъ родахъ (*dolores ad partum*), съ большою силою дѣйствуютъ надъ маткою и понуждаютъ ее внизъ , а матка дѣйствуетъ надъ младенцемъ такъ , что упомянутая она пузырю подобная часть яичныхъ оболочекъ , будучи опъ того чрезвычайно напянута , наконецъ разтрѣскивается.

§. 611. Напоследокъ въ четвертомъ разстояніи родовъ при жесточайшихъ мученіяхъ, сотрясающими называемыхъ (*convulsantes*) сильнымъ напряженіемъ родильницы (*), которое однакожъ не всегда сопр-

во-

(*) Премногіе Сочинители утверждали , что оное напряженіе и стремленіе понуждаемаго плода бываетъ столь сильное , что

воздаемо бываетъ содроганіемъ тѣла (horror), скрежетаніемъ зубовъ (stridor f. trismus), дрожаніемъ колѣнъ и проч. въ

Е е 4

ско-

что отъ того даже самыя пазовыя кости нѣсколько раздаются. Cf. *farraginem citatorum eo facientium* ap. Jan. Peterf. Michell de *synchondrotomia rubis* p. 52 sqq. ed. Amst. 1783. 8.

Но хотя я многими доводами, отъ самаго устройства пазовыхъ частей почерпнутыми, и многочисленными наблюденіями, надъ ними утиненными, удостовѣренъ въ томъ, что хрящевыя соединенія таза и ихъ связки во время беременности, а иначе подъ конецъ оныя, нѣсколько вздуваются, каковаго явленія причину полагаю можно частію въ долговременномъ скопленіи мокротъ, частію въ тяжеспи давящей матки и опшуда происходящемъ весьма слабомъ дѣйствіи пасочныхъ сосудовъ; однакожъ я премного сомнѣваюсь, чтобы таковая наглость костей могла ешоль скоро причинена быть въ родахъ. Что жъ до нѣкоторыхъ повѣствованій объ удобной подвижности костей лунныхъ, въ роженицахъ примѣченной; то кажется, что причину онаго лучше полагать въ ослабленности раздущаго хрящесоединенія пазовыхъ костей, отъ внезапно отнятой тяжести, давленіе производившей, нежели въ нагломъ какомъ либо разширеніи костей.

скоромъ времени имѣющій родитѣ-
ся младенецъ проникаетъ изъ матки го-
ловою, и по большей части упершись
маковкою оныя въ дугу лунныхъ костей,
прочю же головою, на маковкѣ своей,
такъ какъ бы на нѣкоторой оси обращаю-
щейся, будучи далѣе вынужденъ, сперва
показывается лицомъ, а по томъ съ из-
ліяніемъ кровей исходитъ на свѣтъ.

§. 612. За изшедшимъ благополучно
на свѣтъ младенцемъ по большей ча-
сти въ скоромъ времени послѣдуетъ
изверженіе его мѣста (*secundinae*), сопря-
женное также съ болѣзненными, однакожъ
прежнихъ гораздо меньшими напугами;
при чемъ опять изливаются крови изъ
той части полости маточной, (*) съ
косою мѣсто (**) соединено было посредст-
вомъ толстой оппадающей перепонки.

§. 613.

(*) В S Albinі annotat. Acad. I. V. tab. I.

Gul. Hunter anat. vteri gravidi tab. X. fig. 3.

(**) Часть оную полости непраздной или
недавно разрѣшившейся опъ бремени ма-
тки послѣ Ник. Массы повсюду называли
луночками или дуплами (*cotyledones*),
взявши подобіе опъ тяжелой матки двуко-
пы-

§. 613. По окончаніи сихъ сугубыхъ родовъ, матка мало по малу спягивашься начинаетъ до шѣхъ поръ, пока наконецъ приметъ прежній видъ, или и самую свою прежнюю малость (*parvitas*).

§. 614. Съ того же самага времени почти цѣлую недѣлю послѣ родовъ пекутъ крови, кровоочищеніемъ (*lochia*) называемыя, кои довольно сходствуютъ съ мѣсячными кровями, исключая то, что онѣ нѣсколько въ большемъ количествѣ изпекаютъ, особливо, когда мать не кормитъ грудью; коихъ багряной цвѣтъ перемѣняется почти на четвертый день послѣ родовъ въ нѣсколько красноватый, а по томъ въ бѣлый.

При чемъ купно и матка очищается отъ послѣднихъ часшей опадывающей перепонки, и такимъ образомъ исполнивъ должность свою, остается наконецъ праздною и спокой-

Е е 5

ною

пытныхъ, жвачку жующихъ, животныхъ, кои бугорки верхней зорышевой сорочки, соотвѣтствующіе человѣческому мѣсту, въ себя принимаютъ. Ибо Древніе все то луночнымъ или дуплистымъ называли, что имѣетъ въ себѣ впадины или ложбины. Cf. Joach. Camerarii Comm. virginis lingue, p. 256. 384.

ною до новаго либо мѣсячнаго крово-
меченія, либо понесенія плода.



ОТДѢЛЕНІЕ XLVII.

О разлитіи (*) рожденнаго и раждаемаго
теловѣка (*de hominis nati et nascendi
differentiis*).

§. 615. Изъ всего того, что ни го-
ворено было о состоянїи жизни младенца,
въ утробѣ матерней содержимаго и въ
теплыхъ водахъ погруженнаго, удоб-
но разумѣется, что должно находишь-
ся великое различіе между дѣйствіями
его тѣлоустройства въ сравненїи съ
дѣйствіями рожденнаго на свѣтъ и сво-
боду получившаго младенца; каковаго раз-

(*) Cf. ad hanc Sectionem praeter numerosos
alios, Trew de differ. quibusdam inter homi-
nem natum et nascend. intercedentibus. Norimb.
1736. 4.

Röderer de foetu perfecto. Argent. 1750. 4.

Andr. et Fr. Roffeleir (fratres) de diffe-
rentiis inter foetum et aduſtum ibid. 1783. 4.

Tum et Theod. Hoogeveen de foetus huma-
ni morbis. LB. 1784. 8. p. 28 fq.

Et Fr. Aug. Walter annotat. Academicae alias
iam citatae. p. 44 fq.

различія главнѣйшіе примѣры здѣсь представивъ за нужное почитаю.

§. 616. И сіе начинаю я съ кругообращенія той пурпуровой жидкости (*), копорой со всѣмъ другая отверзша дорога, когда младенецъ, содержимый въ утробѣ матерней, имѣетъ кругообратное оное обращеніе чрезъ посредство пуповины съ своимъ мѣстомъ, нежели каковая открыта бываетъ оной послѣ родовъ, когда по естѣ младенецъ, родившись на свѣтъ, черпаетъ въ себя воздухъ и чрезъ то пресѣкается сообщеніе его съ матерью.

§. 617. И въпервыхъ крововозвратная пупочная жила (*vena umbilicalis*), выходящая изъ пуповины, проходя сквозь такъ называемое пупочное зародышевое кольцо (*annulus umbilicalis*), вселяется въ
его

(*) Cf. Herm. Bernard de eo, quo differt circuitus sanguinis foetus ab illo hominis nati. recens. in Overkampii collect. T. I.

Jos. Wenc. Czikanek de actuosa hominis nascituræ vita s. circulat. foetus ab hominis nati diversitate. recens. in Wasserbergii collect. T. IV.

Sabatier sur les organes de la circulation du sang du foetus ad calcem EJ. Tr. complet d'Anat. Vol. III. p. 386 sq. ed 1781.

его печень, и содержащую въ себѣ кровь изливаетъ въ пазуху воротной жилы (*sinus venæ portæ*), которая опшуда частію раздѣляется по самымъ вѣшьямъ сей же замѣчательнѣйшей жилы, частію чрезъ крововозвратный Аранціевъ (*) прошокъ прямою спезею прошекаетъ въ нижнюю полу крововозвратную жилу (*cava*). Оба копорые прошока, то есть конецъ пупочной жилы, содержащий въ чревѣ зародыша, и прошокъ, возвращающій кровь (*ductus venosus*), по опрѣзаніи послѣ родовъ кровоснаго канатика или пуповины, смыкающія и, сросшися, превращающія въ круглую связку печени (*ligamentum teres*).

§. 618. Но крови, изъ нижней пространной крововозвратной жилы спре-
млящейся къ правой полоси сердца,
дорога чрезъ легкія побольшей части
бываетъ вослящена; почему должна она
прошекать другимъ путемъ, коимъ она
чрезъ посредство Евстахіевой заслоночки
(*valvula Eustachii*) и округлой дыры (*foramen ovale*) переходить въ лѣвый желу-
докъ сердца.

§. 619.

(*) V. Arantii de humano foetu libellus p. 97.

Cf. B. S. Albini explicatio Tabular. Eustachii p. 164 sq.

§. 619. У самого опшверзтія сей нижней пологой жилы, изъ живота возходящей, въ зародышѣ находится большая полумѣсячю подобная заслоночка (*), по имени изобрѣтателя Евстахіевою (**) (*valvula Eustachii*) называемая, копорая съ печеніемъ лѣшъ мало по малу уничтожается, въ зародышѣ же брюшную кровь къ нижеописываемому, въ средостѣніи сердечныхъ ушекъ находящемуся, опшверзтію спремляющуюся кажется направляешъ (***).

§. 620. Дыроу же округлоу (*foramen ovale*) (****) называется та, чрезъ копорую по справедливости превеликое количество крови изъ нижней пуспой возвращательной жилы, при каждомъ разширеніи сердечныхъ ушекъ въ лѣвое сер-

(*) Haller de *valvula Eustachii*. Goetting. 1738. 4.

(**) Eustachius de *vena sine pari*. pag. 289 opusculor. EJ. Tab. VIII. fig. 6. Tab. VVI. fig. 3.

(***) Lobstein de *valvula Eustachii*. Argent. 1771. 4.

(****) Haller de *foramine ovali et Eustachii valvula*. Goetting. 1748. fol. c. f. ac. — et *logge auctius inter EJ. opera minore T. I. p. 33. fqq.*

сердечное ушко переходитъ (*), коея возвращенію препятствуетъ находящаяся у отверстія онаго серпообразная заслонка, копорая, при послѣдующемъ сжиманіи ушковъ, кажется заграждаетъ оную дорогу.

Помощію сея заслонки въ первые по большей части годы младенчества, почти такимъ же образомъ округлая оная дыра замыкается и зарастаетъ, какимъ и соответствующая ей Евстахіева заслоночка мало по малу уменьшается, и какбы нечувствительно уничтожается (**).

§. 621. Входящая же купно въ правое ушко кровь, а наипаче изъ верхней крововозвратной полый жилы низливающаяся, въ весьма маломъ количествѣ входитъ въ не имѣющія еще движенія зародышевыя легкія, но помощію боево-

(*) De singulari cl. Wolffii sententia, qua foramen ovale pro ipsius venae cavae inferioris altero ostio habet, quod etidem in aurem sinistram, ac alterum vulgo notum in aurem dextram hiet, cf. Nov. Commentar. Acad. Scient. Petropolit. T. XX. pro a. 1775.

(**) Cl. Leveling de valvula Eustachii et foramine ovali. Angliopol. 1730. 8. c. f. 26.

боевожильнаго прошока (ductus arteriosus) (*) изъ самаго пня бѣющейся легочной жилы, коея онѣ есть какъ бы главная вѣшвь, изливается прямо въ самую дугу начальной бѣющейся жилы (arcus Aortae), не касаясь легкихъ; кошорый прошокъ въ младенцахъ по большей части въ первыя недѣли по рожденіи ихъ на свѣшъ заграждается и. обращается въ видъ сплошной сязки.

§. 622. Кровь, выброшенная сердцемъ въ пень начальной бѣющейся жилы, большею частію возвращается опять матери чрезъ боевыя пупочныя жилы (§. 578), съ обѣихъ споронъ мочепошнаго зародышева канала (urachus), сквозъ пупочное кольцо выходящія, и по рожденіи младенца на свѣшъ также въ непроходные канапики превращающіяся (**).

§. 623. Легкія въ зародышѣ какъ не имѣютъ почти никакого дѣйствія, такъ и видъ оныхъ очевидно опличается отъ того, каковъ имѣютъ онѣ въ младенцѣ
пог-

(*) B. S. Albini annotat. Acad. L. II Tab. VII. fig. 7.

(**) V. Halleri icones anat. fasc. IV. Tab. III. IV.

тогда , когда онъ начинаетъ пицаться воздухомъ. Ихъ величина въ соразмѣрности съ легкими рожденнаго младенца гораздо меньше, цвѣтъ темнѣе , существо, изъ коего онѣ составлены, плотнѣе; а посему и особенная ихъ тяжесть есть больше такъ , что свѣжія и неповрежденные легкiя , будучи погружены въ воду , погрязаютъ на дно , когда напрошивъ того , будучи вынушы изъ живаго рожденнаго младенца, почерпнувшего въ себя воздухъ , и опущены въ воду , плаваютъ на поверхности оныя (*). Правая же для легкаго кажется имѣетъ то преимущество , что при первомъ вдохновенiи сжимающагося въ него воздуха, нѣсколько прежде лѣвой разширяется (**). О прочихъ началахъ сего новаго дѣйствiя легкихъ

(*) *Conditiones, quibus hoc fiat et cautelae, quibus ideo in pulmonum sic dicta docimasia, eiusque in foro usu et auctoritate opus est, non sunt huius loci. Legant, quorum haec interfunt, post tot alios, gravissimum Gul. Hunteri scriptum posthumum in medical observat. and inquiries. Vol. VI. p. 284 sq.*

(**) *V. cl. Portal in Mem de l'Acad. des Sc. de Paris a. 1769. p. 555. sq.*

Cl. Metzger de pulmone dextro ante finium respirante. Regiom. 1783. 4.

кихъ выше сего упомянуто въ томъ мѣ-
спѣ, гдѣ нарочито говорено было о ды-
ханіи.

§. 624. Изъ того, что индѣ (§. 574. 581) сказано о питаніи зародыша, легко разумѣется, что пищепріемные его каналы и орудія, превращающія пищу въ питательный сокъ (*vasa chylopoëtica*), не имѣя никакого дѣйствія, въ другомъ находящаяся состояніи, нежели въ человѣкѣ, рожденномъ на свѣтъ: такъ на пр. въ нѣжномъ зародышѣ первыхъ мѣсяцевъ толстыя кишки видомъ своимъ премного подобны бывающъ тонкимъ, въ другую же половину беременности, будучи наполнены каломъ (*meconium*), по справедливости заслуживающъ то имя, коимъ ихъ вообще опличающъ отъ тонкихъ.

§. 625. Самой же зародышевъ калъ, первую порошею называемый (*meconium*), есть испражненіе цвѣта темнозеленаго, происшедшее безъ сомнѣнія отъ самыхъ его внутреннихъ влагъ, а наипаче отъ его желчи, что кажется подтверждаетъ какъ время, въ которое примѣчается въ первый разъ оное испражненіе, первому отдѣленію желчи въ зародышѣ соотвѣствующее, такъ и особливья наблюденія, по которымъ извѣстно, что у уро-

Ж ж

довѣ

довѣ, не имѣющихъ печени, вмѣсто онаго калу находится въ кишкахъ не много безцвѣтной слизи.

§. 626. Также слѣпая или непроходная кишка (*sacum intestinum*) въ новорожденномъ младенцѣ имѣетъ гораздо отличный видъ отъ будущаго начертанія своего, и съ червонодобнымъ прибавочкомъ своимъ (*appendix seu processus vermiformis*) находится прямо (*) соединенною и такъ далѣе.

§. 627. О другихъ таковаго рода различіяхъ уже на многихъ мѣстахъ упомянуто было, почему и не говорю здѣсь на пр. (§. 579) о мочеиспускательномъ каналѣ (*urachus*) и зѣвнической перепонкѣ (§. 259) (*membrana pupillaris*); также о низхожденіи ядръ въ зародышъ мужескаго пола (§. 501 и послѣд.).

О нѣкоторыхъ изъ оныхъ приличіе сказано будетъ въ слѣдующемъ Отдѣленіи; прочія же, какъ меньшую важность имѣющія, я нарочито пропускаю.

§. 628. Но кажется, что на семъ мѣстѣ не неприлично упомянуть прѣмъ еще

сло-

(*) B. S. Albini annotat. Acad. I. VI. Tab. II. fig. 7.

словами о нѣкоторыхъ сомнительныхъ и догадкамъ подлежащихъ частяхъ зародыша, кой въ немъ въ соразмѣрности своей бывающъ больше, и кажется въ соливости служащъ его шѣлоустройству (оссопотія), хотя настоящее ихъ употребленіе и польза (не взирая на шоль многія надъ ними чинимыя изслѣдованія Тѣлоразнимателей) доселѣ пребываютъ неизвѣстными. Ихъ обыкновенно называющъ железами, хотя впрочемъ переплешеніе и устройство оныхъ отъ железистой отлично и до сихъ поръ еще не найдено въ нихъ никакихъ слѣдовъ испражнительныхъ протоковъ. Части оныя суть: щитообразная железа (*glandula thyroidea*), зобная железа (*thymus*) и прибавочныя почки (*renes succenturiati*).

§. 629. Щитообразная железа лежитъ спереди щитообразнаго же хряща, подлѣ самой гортани. Она имѣетъ двѣ доли, а начертаніе полумѣсячю подобное (*), и въ зародышѣ находится наполненная пасочною жидкостію, учиняясь съ умноженіемъ лѣтъ безсочною.

§. 630. Зобная железа есть бѣловатое и весьма нѣжное мясо, которое

Ж ж 2

шак-

(*) Halleri icon. anat. fasc. III. tab. 8.

также изъ двухъ долей состарлено; железа сїа часто бываетъ раздѣлена на двѣ доли, а иногда имѣетъ въ себѣ довольно великую пустоту (*); лежитъ она въ верхней части грудины, и съ обѣихъ сторонъ воздымается (**) до самаго горла; которая въ зародышѣ по размерности своей бываетъ весьма велика, и содержишь внутри млекоподобный сокъ, въ опроческихъ же лѣпахъ мало по малу изсякаетъ, а при наспупленіи старости не рѣдко почти во все изчезаетъ (***).

§. 631. Чшо до прибавочныхъ почекъ (или надпочечныхъ железокъ, иначе еще черножелчными сумочками называемыхъ) (*capsulae atrabiliaria*); шо онѣ лежатъ подъ грудобрюшною преградою въ верху почекъ (****), кои и во взрослыхъ

Ж ж 3

лю-

(*) Aug. Lud. de Hugo de glandulis in genere et speciatim de thymo. Goetting. 1746. 4. fig. 2.

(**) V. Haller icon. anat. l. c.

(***) Hewson's experimental Inquiries P. III, passim.

(****) V. inuentoris Eustachii tab. I. II. III. it. Tab. XII. fig. 1. 10. 12.

Halleri icon. anat. fasc. III. tab. VI.

людяхъ обрѣтаюся какъ менѣе, такъ по большей части и отдѣленными отъ оныхъ, заключаая въ себѣ темноцвѣтный сокъ, который въ зародышѣ бываетъ красноватый (*rubellus liquor*).



ОТДѢЛЕНІЕ XLVIII.

О умноженіи, совершенствѣ и умаленіи
человѣка (*de incremento, statu, decre-
mento que hominis*).

§. 632. Теперь болѣе ничего не остается дѣлать, какъ только разсмотримъ человѣка, коего шѣлосложеніе по особливымъ отдѣленіямъ его дѣйствій до сихъ мѣстъ изслѣдываемо было, совершающаго поприще своей жизни, и крапко изслѣдовать всѣ главныя приключенія, отъ начала рожденія даже до послѣдняго предѣла его живота съ нимъ происходящія.

§. 633. Кажется, что первое образованіе зародыша случается почти на шрестей недѣлѣ послѣ его зачатія (§. 575): въ коемъ тогда самую малѣйшую (§. 57) и почти растительную жизнь имѣющемъ, по крайней мѣрѣ на четвертой недѣлѣ возраждается настоящая кровь (§. 13):

движеніе же сердца (ф. 89), рѣдко когда либо въ нѣжнѣйшемъ зародышѣ примѣченное (*), которое давно видѣлъ (**) Аристотель въ насиженномъ цыпленкѣ, съ того же самого времени учиняется примѣшнымъ подъ именемъ движущейся почки (punctum saliens).

ф. 634. Потомъ на седьмой или осьмой недѣлѣ, если не ошибаюсь, начинается человѣческое костесоставленіе (osteogenia) (***): всего же прежде костный сокъ начи-

(*) V. Jo. De Muralto in Ephem. N. C. Dec. II. ann. I. p. 305.

(**) Aristotelis hist. animal. L. VI. cap. 3 Oper. Vol. II. p. 326.

(***) Человѣческое, говорю, костесоставленіе. — Ибо оное въ насиженномъ цыпленкѣ гораздо позднѣе, по есть въ началѣ девятаго дня, начинается, которое время соотвѣпствуетъ 17 недѣли человѣческой беременности. Ибо природа, ежели здѣсь догадываться можно, въ человѣческомъ зародышѣ и другихъ живораждаемыхъ животныхъ кажется для того скорѣе поступаетъ въ составленіи костей, (оныхъ подпорѣ всего тѣлозданія человѣческаго), чтобы шѣмъ отвратить незапныя обезображенія, коимъ пшеницы ипичѣе, находясь въ черепныхъ скорлупахъ, го-
раз-

чинаетшѣ образоватѣ свои пещерки въ грудныхъ распоркахъ или ключикахъ (claviculæ), ребрахъ (costæ), позвонкахъ (vertebræ), большихъ круглыхъ костяхъ конечностей шѣла, въ нижней челюсти (maxilla inferior) и другихъ нѣкоторыхъ костяхъ лица и прочая; такъ же и шончайшія клѣпочки въ нѣкоторыхъ плоскихъ костяхъ головного черепа, то есть въ лобной и затылочной (offrontale et occipitale)

раздо меньше подвержны бывающѣ — Почему беречься должно, чтобы наблюдень, надѣ насиженымъ цыпленкомъ, учивенныхъ, не отнесшѣ къ образованію человѣческаго зародыша, каковой погрѣшности не могѣ избѣжать самъ Галлеръ, утверждая откровенно, что все то, что ни говорилъ онъ о костяхъ цыпленка, есть справедливо и о животныхъ другого, и наконецъ о самомъ человѣкѣ.

Какое предразсужденіе послѣ столь распространеннаго сшало, что нѣкоторые, будучи онымъ заняты, къ рѣшенію судебныхъ споровъ, о преждевременныхъ родахъ происходившихъ, для учиненія отвѣтовъ брали доказательства свои отъ шаковаго безразсуднаго сравненія временъ насиживанія со временемъ человѣческой беременности. Cf. v. c. Hug. Marreti consultation au sujet d' un enfant &c. Divion. 1763. 4.

talē); позднѣе же сего въ коспяхъ маковки и прочая. Вообще же умноженіе зародыша или просто человѣка какъ рожденнаго, такъ и имѣющаго родиться на свѣшѣ, шѣмъ скорѣе совершается, чѣмъ ближе находится онъ къ своему зачатію.

§. 635. Зародышъ на половинѣ беременности въ выше сего упомянутомъ смыслѣ по справедливости можетъ назваться жизненнымъ или долголѣтнымъ (*vitalis foetus*) (§. 585), въ какое время начинаются въ немъ отдѣленія нѣкопыхъ влагъ; какъ по жиру (§. 38) (*adeps*) и желчи (*bilis*).

§. 636. Далѣе у зародыша болѣе созрѣвшаго мало по малу вырастаютъ на головѣ тоненькіе волоски, рождаются ногти и исчезаетъ зѣничная перепонка, (*membrana pupillaris*) (§. 259), а у мальчика выпускаются ядра въ подлежащее мѣсто (§. 505. 1q).

§. 637. Но когда младенецъ по изпеченіи десятаго луннаго мѣсяца родится на свѣшѣ (§. 603); то кромѣ важнѣйшихъ, въ другомъ мѣспѣ пространнѣе описанныхъ, всего почти шѣлоустройства его преобразеній случаются съ нимъ различныя перемѣны и на поверхности шѣла, каковыя на пр. суть:
уса-

усаживающій лице его пухъ мало по малу пропадаетъ, морщинки (*ruga*) изглаживаются, и задній проходъ между ягодицами, мало по малу составляющимися, скрывается далѣе.

§. 638. Младенецъ также по немногу привыкаетъ употреблять способности душевныя (*), то есть навикаетъ понимать, вникать, воспоминаеть, желать и проч., отъ чего и бываетъ у него въ первые мѣсяцы по рожденіи на свѣтъ бессонница (*inſomnĭa*) и прочая.

§. 639. Орудія внѣшнихъ чувствъ болѣе и болѣе составляются и совершенствуются; какъ то: наружныя части уха и внутреннія ноздрей; также глазные покровы, то есть дуги, что надъ впадинами глазами (*arcus superciliaries*), брови (*supercilia*) и прочая.

§. 640. По семь кости, составляющія головной черепъ, крѣпче зашвердѣваютъ, промежутки оныхъ (*fonticuli*) по немногу смыкаются, на осьмомъ же мѣсяцѣ начинаютъ прорѣзываться и зубы.

З з

§. 641.

(*) Cf. cl. Tiedemann über die Entwicklung der Seelen Fähigkeiten bey Kindern, in Hefisch. Beytr. Vol. II. P. II. III.

§. 641. И въ то время младенецъ способенъ бываетъ къ оподоенію или оплученію своему отъ груди (ablastatio); ибо младенецъ снабженъ зубами къ раздробленію твердой пищи, а не къ причиненію вреда матернимъ грудямъ.

§. 642. Въ испеченіи перваго года учится онъ спановишься на ноги и стоять прямо; каковое стояніе самое большее преимущество шѣла человѣческаго составляетъ.

§. 643. Такимъ образомъ младенецъ, будучи опчужденъ отъ матернихъ груди и ушверженъ въ силахъ ходить на ногахъ, день отъ дня болѣе и болѣе возрастаетъ и учиняется вольнымъ и рѣзвымъ, а наипаче когда онъ по немногу начинаетъ снискивать другое величайшее преимущество рода человѣческаго, то есть способность говорить (usus loquelæ), въ которое время душа начинаетъ посредствомъ языка открывать извѣстныя ей понятія (§ 153).

§. 644. Съ седьмаго года за выпадываніемъ двадцати такъ называемыхъ млечныхъ зубовъ (dentes lactei) въ прочее ищеніе лѣтъ вторичнымъ прорѣзываніемъ послѣдующъ всегдашніе 32 зуба (dentes permanentes).

§. 645.

§. 645. Въ младенческомъ возрастѣ память (memoria) всѣ прочія душевныя способности превышаетъ, и бываетъ наименѣе способнѣйшею къ крѣпкому зашверживанію внѣшнихъ впечатлѣній; напротивъ того по изтѣченіи пятнадцати лѣтъ, умножается воображеніе (imaginatio, phantasia).

§. 646. Каковое всѣхъ прочихъ живѣйшее чувство обыкновенно случается въ юношескіе годы, въ кои человекъ разными достопамятными переменами шѣла мало по малу пріуготовляется къ опшравленію будущихъ дѣйствій, полу его свойственныхъ (*).

§. 647. Ибо какъ скоро начнутъ у дѣвицы умножаться груди, а у юноши показываться борода и другія симъ подобныя, въ оноемъ полѣ возмужалость (pubertas) изъясляющія, явленія; то дѣвица начинаетъ уже плащить свою мѣсячную дань, (mensuum tributum), то есть носить плащаное (§. 545), а юноша пріуготовляеть и опдѣляеть плодородное сѣмя (§. 518), съ которымъ опдѣленіемъ совокуплено бываетъ большее выхожденіе

З з 2

60-

(*) Th. Miller de pubertate. Edinb. 1781. 3.

бороды (*) и доспѣвая замѣзанія перемѣна нѣжнаго голоса въ грубой; въ сіе же самое время, какъ бы самопроизвольнымъ гласомъ природы начинающѣ въ обоемъ полѣ ощущаться внутреннія побужденія (§. 288) (*instinctus sexuales*); и человѣкъ, будучи въ цвѣтущемъ возрастѣ, учиняется способнымъ къ исполненію своихъ вождельній.

§. 648.

(*) Ложное повѣствованіе, и теперь отъ многихъ Сочинителей предлагаемое, объ Американскихъ народахъ безбородыхъ, премногими свидѣтелями опровергъ я in *Götting. Magaz. an. II. P. VI. p. 418 sq.*

Ибо я изъ всей Америки приводилъ примѣры народовъ, кои еще по крайней мѣрѣ отъ части растятъ бороды; также и другихъ, о коихъ заподлинно извѣстно, что они особливими нѣкошорыми орудіями сами себѣ выщипываютъ бороды и преная.

Но что съ теченіемъ времени чрезъ многія перерожденія продажаемое такое бороды выщипываніе можетъ какъ бы въ другую превращаться природу и быть подлинно тонкая наследственная борода (§. 598); сіе кажется быть несогласно съ разумомъ изъ того, что выше сказано о образовательной силѣ.

§. 648. Опреѣленнаго возмужалости (pubertas) времени хотя совершенно положишь не возможно ; пошому чшо она по различію снранъ и шѣлосложній различна бываетъ (*); вообще одна кожъ таковая возмужалость въ женскомъ полѣ скорѣе, нежели въ мужскомъ совершается, такъ чшо въ нашей снронѣ дѣвицъ на пятнадцатомъ уже году, а мужчинъ по крайней мѣрѣ на двадцатомъ возмужалыми почищать должно.

§. 649. Послѣ сего не много спустя времени, полагается онѣ природы и конецъ роженію или умноженію шѣла челоѣческаго, кошорое, не упоминая о различіи частныхъ людей или семействъ, по различію снранъ премного различно бываетъ (**).

З з з

§. 650.

(*) Nam et ex Heluetia infantilis puerperae novae historia a desideratissimo Gottl. Ern. Ab Haller mecum communicatum integri Bibl. medicae Vol. I. p. 558 sq.

(**) Ибо челоѣку не дано онѣ природы такого преимущества, чшобы подобно прочимъ членоустроеннымъ янѣамъ не прешерпѣвать влѣянія на него той снраны, гдѣ онѣ обитаетъ; а по сему всѣмъ извѣстно, чшо въ холодномъ
но-

§. 650. Тогда хрящи конечностей костныхъ, находившіеся до сихъ поръ отдѣленными (сиріфизе), сплошно съ ними срастаются и какбы въ одну кость превращаются.

§. 651. Въ мужескомъ возрастѣ (vigilis ætas), состоявшемъ большій и лучший кругъ жизни человѣческой, касательно дѣйствій тѣлесныхъ, самая большая жизнь (§. 57), то есть: самая большая крѣпость и постоянство оныхъ, касательно же способностей душевныхъ, самый зрѣлый существуетъ разумокъ.

§. 652. Наступающей старости (senium) предпечами бывають въ женщинахъ прекращеніе мѣсячныхъ кровей (§. 547), а въ мужчинахъ умаленіе похоти; въ обоихъ же приближающееся увяденіе тѣла, вѣтхою или сухою старостію (*)
(ис-

поясѣ позднѣе приходятъ въ возмужалость, нежели въ жаркомъ.

Почему теперь и ненужно напоминать, что какъ великорослыхъ Паша-гонцовъ, такъ и родъ Мадагаскарскихъ Карловъ легковѣрнаго Коммерсона, къ химерическимъ вымысламъ причисать должно.

(*) Joach. H. Gernet de fœcilitatis senilis effectibus. Lips. 1753. 4.

(*hiccitas*) называемое, и мало по малу ошущительнымъ учиняющееся жизненныхъ силъ умаленіе.

§. 653. Наконецъ послѣдуетъ хладная спарость (*gelida fenestus*), имѣющая сопутниками своими день опъ дня умножающуюся слабость въ чувствахъ внѣшнихъ и внутреннихъ, необходимость въ должайшемъ снѣ и изнеможеніе во всѣхъ дѣйствіяхъ тѣлоустроенія. Волосы на головѣ частію сѣдѣютъ, частію вылѣзаютъ. Выпадаютъ также и зубы, и какъ шея къ поддерживанію головы, такъ и ноги къ поддерживанію тѣла довольно служить не могутъ. Да и самыя кости, оныя всего зданія тѣлеснаго подпоры (*), изсыхаютъ и такъ далѣе.

§. 654. Изъяснивши сіе, кажется доспигли мы наконецъ послѣдней черты человѣческаго Естествословія, или безболѣзненной смерти (**) *Euthanasia*, то

З з 4

есть

(*) Non repeto, quae de memorabili eo decremento, quod ossibus fenum contingere solet, pluribus dicta sunt in opere osteologico p. 36 sq.

(**) E. Gottl. Richter de morte sine morbo. Gosting. 1736. 4.

есть блаженному упокоенію или успенію старости, которая всего врачебнаго искусства предѣль и первый и послѣдній составляетъ конецъ, и коея причины изъ сказаннаго до сихъ мѣстъ удобно разумѣются (*).

§. 655. Явленія смерти, въ самомъ умирающемъ человѣкѣ (**) примѣчаемыя, суть слѣдующія, какъ то: охлажденіе конечностей тѣла (*frigus extremorum*), исчезаніе блеску въ глазахъ, малое, тихое и часто прерывающееся бѣеніе въ жилахъ, и наконецъ рѣдкое дыханіе, которое на послѣдокъ оканчивается сильнымъ послѣднимъ издохновеніемъ.

Въ живоразниманіи же (*vivificatio*) другихъ грудью питающихъ животныхъ можно примѣтить емѣсть и послѣднее спра-
да-

(**) Io. Oosterdyk Schacht. *or. qua fenile fatum inevitabili necessitate ex hum. corp. mechanismo sequi demonstratum.* Ultraj. 1729. 4.

Matth. van Geuns de morte corporea et causis moriendi. LB. 1761. 4. recens. in Sandiforri thesaur. Vol. III.

(*) *Successivam mortis phaenomenorum progressionem ab ipso moriente (viro quodam mediae aetatis ex dysenteria extincto) attente observatam v. in cl. Moritz Magaz. zur Erfahrungs-Seelenkunde Vol. I. P. I. p. 63 sq.*

даніе сердца (агон), изъ коего открывається, что какъ правый желудокъ, такъ и правое ушко сердца долѣ лѣвыхъ дѣйствующихъ и позднѣ оныхъ зами-раютъ (§. 111).

§. 656. Мершвое (exanimе corpus) шѣло показывають соединенное съ охлажденіемъ его оцѣпенѣніе, прупный или смрадный запахъ (odor cadaverosus), болѣ же всего ослабшая роговая глазная плева и раскрытый задній проходъ. Еслили всѣ сїи признаки находятся въ мершвомъ шѣлѣ; то едва остається мѣсто жалобѣ Плиніевой, чшобы касательна жизни челошѣка не полагагаться даже на самую воспослѣдовавшую его смерть (*).

§. 657. Хотя естественнаго жизни предѣла, (которой бы то есть можно почестъ за частѣйшую и какъ бы узаконенную черту глубокой старости) положить не возможно (**); однако то досто-

З з 5

па-

(*) Cf. Jo. Jac Bruhier sur l'incertitude des signes de la mort. Par. 1749. II Vol. 8.

It. van Svieten or. (posthuma) de morte dubia. Vienn. 1778. 8.

(**) Cf. praeter alios notissimos de eo argumento fontes Jo. Gessner v. cl. de termino vitae Tigur. 1748. 4. recens. in Excerpto italicae et helvet. litterat. ann. 1759. T. IV.

памятно, что по обстоятельному сравненію многихъ перечней умершихъ людей узналъ я, что въ Европѣ многіе спарики доживающъ до восьмидесять четвертаго году, но не многіе напрошивъ того переживающъ оный.

§. 658. Вообще же хотя кромѣ другихъ множайшихъ причинъ паче всего слабость молодыхъ лѣтъ, по семъ невоздержность многихъ возрастныхъ людей, также жестокость болѣзней и нечаянныя пагубныя приключенія бывающъ причиною, что изъ тысячи рожденныхъ челоѣкъ почти только седмдесять восемь умирающъ безболѣзненною, здѣсь описываемою смертію; однако жъ ежели разсудить о долговѣчности челоѣческой, (*) и сравнить оную съ предѣлами жизни прочихъ млекоѣ питающихъ животныхъ, легко увидѣть можно, что изъ всѣхъ жалобъ Софистовъ на бѣдность жизни челоѣческой нѣтъ несправедливѣе той, которую обыкновенно произносятъ они на краткость оныя.

К о н е ц ъ.

ИЗ-

(*) Bacon de Verulamio hist. vitae et mortis Operum Vol. II. p. 121 sq. 128 sq. ed. Lond. 1740. fol.

ИЗЪЯСНЕНІЕ КАРТИНЪ.

К а р т. I.

Сердце младенческое, заднею спорною представленное, коего основаніе изображено нѣсколько возвышеніе, и опниашъ воздухоносный каналъ, чѣобы чрезъ то явственнѣе были прочія части. Смощри спран. 71 и слѣд. также спран. 60 и 68.

- a. Верхняя начальственная полая крововозвратная жила.
- b. Нижняя такая же жила.
- c. Передняя или правая пазуха сердца.
- d. Ушко, соединенное съ нею.
- e. Желудокъ, пусшрь или полосъ той же спороны.
- f. Пенъ легочной бѣющейся жилы.
- g. Той же жилы лѣвая и
- h. Правая вѣтви.
- i. Четыре крововозвратныя легочныя жилы.
- k. Задняя или лѣвая пазуха сердца.
- l. Ушко, соединенное съ нею.
- m. Желудокъ той же спороны.
- n. Дуга начальственной бѣющейся жилы.
- o. Общій ея пенъ, раздѣляющійся на

- р. Правую подключевую и
 қ. Сонную или шейную того же бока
 жилы.
 г. Лѣвая сонная жила.
 ф. Подключевая того же бока.
 г. Общая бѣгущая жила духодвижнаго
 канала (ибо таковая она была въ
 семъ прупѣ) и междуреберная, отъ
 начальственной боевой жилы проис-
 ходящія.
 и. Безпарная крововозвратная жила.
 w. Лѣвая вѣночная крововозвратная жи-
 жа, и
 х. Правая такая же жила.

К а р т. II.

Изобр. 1.

Правый глазъ возрастнаго человека, представленный нѣсколько большимъ, у коего опияна верхняя половина роговой и швердой оболочекъ, и отпрѣзанъ край радужной плевы отъ рѣсничнаго кружка, и нѣсколько поднятъ, чтобъ видны были обѣ полосы глаза.

См. спран. 116 и послѣд.

- а. Машерая или швердая глазная плева.
 б. Роговая плева.
 с. Ликосоставная плева.

- d. Рѣсничной кружекѣ.
- e. Радужная плева или раіокѣ.
- f. Рѣсничное шѣло.
- g. Сумочка зрачковая.
- h. Зрительная чувствительная жила съ своею средоточною бѣющеюся жилою.

И з о б р. 2.

Передняя половина глаза осьмимѣсячнаго зародыша, также съ увеличеннымъ зрачкомъ представленная.

См. стран. 218.

- a. Твердая плева.
- b. Рѣсничныя мышечныя волокна.
- c. Ягодная плева.
- d. Зѣничная перепонка, такъ представленная, какъ уже въ сіе время начинается она исчезать въ средоточіи своемъ.

К а р т. III,

Показывающая низхожденіе ядръ изъ чрева у младенца мужескаго пола.

См. стран. 400.

И з о б р. 1,

Показывающее почти созрѣлыя двойни, но не одинакой величины, у коихъ лѣвое ядро уже вышло изъ чревной полости; а правое захвачено почти въ ту самую мину-
шу,

ту, въ которую начало было оно проходить сквозь брюшное кольцо.

- а. Правое ядро съ прибавочкомъ своимъ, содержимое въ вверхъ проспирающемся и свернувшемся пропяхеніи брюшины.
- б. Слѣды сѣменныхъ сосудовъ той же стороны и
- с. Сѣменоотносящаго канала.
- д. Низпускающееся пропяхеніе брюшины, представляющее мѣшечекъ, видъ луковидны имѣющей.
- е. Устѣйце брюшины, ведущее оной мѣшечекъ сквозь брюшное кольцо, въ которомъ уже содержится лѣвое ядро.
- ё. Слѣды сѣменныхъ сосудовъ того же бока, и
- г. Относящаго сѣмя канала.
- h. Мочевой пузырь, дномъ своимъ оканчивающійся въ мочепочномъ зародышевомъ каналѣ, и съ обѣихъ сторонъ соединенный съ пуповинными бѣгущими жилами.

Изобр. 2,

Изъ четверомѣсячнаго зародыша взятое съ шѣмъ, чтобы видны были ядра, еще содержимыя въ чревной полости, и воздымающееся продолженіе брю-

шины,

шины, въ то время большею частію представляющее только продолговатую складку, также и устійце брюшины, у нижней и передней части складки оныя находящееся.

К а р т. IV,

Представляющая выкинутое яичко перзаго, какъ кажется, мѣсяца беременности; которое разрѣзано и нѣсколько въ большемъ видѣ представлено.

См. стран. 450.

И з о б р. 1.

- a. Слабая или опадывающая завороченная перепонка.
- b. Верхней сорочки мышисныя волокна, коими яичко утврждается въ опадывающей толстой перепонкѣ.
- c. Внутренность верхней зародышевой сорочки, которая въ то время наполнена бываетъ прозрачною жидкостію.
- d. Вскрытая внутренняя оболочка или сорочка зародышева.

И з о б р. 2.

Внѣшній видѣ того же самага яйца.



О П Е Ч А Т К И.

Напечатано.

быть должно

Стр. строк.

43	4	limitate	fanitate
48	29	Флегматическое или мокрое	мокрое или флегматическое однажды
55	10	въ ровень	вровень
58		arteriae	de arteriis
66	10	железы	железы вездѣ
71	17	отверстїе	отверстїе вездѣ
77	1	учинвыя	учиненныя
108	13	близкости	близости
384	24	Граафѣвыхъ	Графѣвыхъ
